

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

XXV

A


24

NAPOLI,

111

111

111



ANTONII
SAPORTÆ,
CONSIL. MEDICI,
& Profess. Regij, celeberrimæque
Vniuersitatis Medicæ Mon-
spel. olim Cancellarij
Amplissimi,
DE TVMORIBVS
præter naturam,

LIBRI QVINQVE.

*Ex instructissima Bibliotheca RANCHINIANA
eruti, & publici iuris facti, cura, & studio
HENRICI GRAS, Philosophi & Medici,
Doctõris Monspeliensis & Practici
Lugdunensis Aggregati.*

Accessit IOANNIS SAPORTÆ
Tractatus de Lue venerea.




LUGDVNI,

Sumptibus PETRI RAVAUD,
via Mercatoria sub signo S. Petri.

M. DC. XXIV.

Cum Priuilegio Regis.





Viro vere Viro
D.D. FRANCISCO
RANCHINO, Consi-
liario Medico & Profes-
sori Regio; celeberrimæque
Vniuersitatis
Medicæ Monspeliensis
Cancellario Amplissi-
mo, S.



IBRI, æterna vi-
gentis animi sedu-
lique monumenta,
pari fato penitus
entur; quo liberi magna re-
iscentis identidem familie
* 2 pignora

pignora seminantur. Vtrosque
tenellos adhuc & nouellos, pa-
terna cura; nouercali Mortis
umbra, legumue seueritate
sæpius anticipata destituit. Sic
apud Lacones olim partus nu-
triendi ius genitori non erat:
sed eum in Leschen deportare
cogebatur, ibi ex Tribulibus
sedentes Maiores explora-
bant, num corpus foret εὐπαγὲς
& ῥωμαλέον, tunc educari cura-
bant; sin minus ad Apothe-
tas, locum secus Taygetum
præruptum ac præcipitem haud
grauatim ablegabant: rati,
vitam eius, cui statim ab ini-
zio concinnam atque decoram
compo

compositionem natura dene-
gauisset , neque sibi utilem,
neque Reipublicæ commodam
esse posse. Iste verò fætus, qui
iam beneuolentiæ tuæ singula-
ris illecebris allectus , tibi se
totum emācipat (RANCHINE
CELEBERRIME) utramque
fortunam expertus est : vix
dum enim perfectus atque
maturus , orbatus est parente;
mox in tuam clientelam re-
ceptus , acre tuum iudicium
subiit ; Verum non exclusus,
sed in familiam Medicam
suffragio tuo honorificentissimè
ascitus est. Non potuit felicio-
ribus unquam auspiciis ad-

*

3

optari

optari : proindeque nec debuit
ab invidentium venenatis
morsibus, vindicis alterius pa-
trocinio se tutari. Comiter igitur
eum excipe & protege;
mequetui studiosissimum ama-
re perge. Vale. Datum
Lugduni Francorum, Kal.
Aug. 1624.

T. A. T. C. A.

HENRICVS GRAS,
Philosophia & Medicina
Doctor.



SYLLABVS CAPITVM QVÆ IN HIS QVIN- que libris continentur.

CAP. I. **D**E Tumoribus præter naturam.
pag. I

I I. De Tumorum differentiis. 5

II I. De Tumorum causis. 10

IV. De Tumorum temporibus & indiciis. 12

V. De vniuersali tumorum curatione. 16

VI. De Phlegmone. 24

VII. De Phlegmones causis. 28

VIII. De Phlegmones indiciis. 30

IX. De Phlegmones curatione. 31

X. De Dothiene, seu Furunculo. 56

XI. De Bubone. 59

XII. De Bubonis pestilentis causis, & indiciis.

61

XIII. Bubonis pestilentis curatio. 63

XIV. De Carbunculo, quem Græci ἀσπῆρα vo-
cant. 74

XV. De Carbunculi causis. 78

XVI. De Carbunculi indiciis. 82

XVII. De Carbunculi curatione. 83

XVIII. De Bubone venereo. 87

XIX. De Bubonis venerei curatione. 88

XX. De

XX.	De Phymate & Phygethlo.	92
XXI.	De Phymatis ac Phygethli causis.	94
XXII.	De Phymatis & Phygethli curatione.	94
XXIII.	De Gangræna & Sphacelo.	97
XXIV.	De Gangræna & Sphaceli causis & indi- citiis.	99
XXV.	De Gangræna & Sphaceli curatione.	102
XXVI.	De Ophthalmia.	109
XXVII.	De Lippitudinis causis.	110
XXVIII.	De Lippitudinis indicatiis.	111
XXIX.	De Lippitudinis curatione.	112
XXX.	De Vuæ & Columellæ inflammatione.	120
XXXI.	De Tumoris vuæ & columellæ causis & indicatiis.	121
XXXII.	De Tumoris vuæ & columellæ cura- tione.	123
XXXIII.	De Paristhmiis, siue Tonsillis.	132
XXXIV.	De causis & indicatiis inflammationis paristhmiorum & tonsillarum.	133
XXXV.	De Paristhmiorum & Tonsillarum phlegmones curatione.	135
XXXVI.	De Exanthematis & Ecthymatis.	138
XXXVII.	De Exanthematum & Ecthymatum causis.	141
XXXVIII.	De Exanthematum & Ecthymatum indiciis.	155
XXXIX.	De Exanthematum & Ecthymatum curatione.	159
XL.	De Epinyctide & Termintho.	164
	XL I. De	

XL I.	De causis & curatione Epinyctidis & Terminthi.	163
XL II.	De Aneurismate.	167
XL III.	De Aneurismatis causis.	168
XL IV.	De Aneurismatis indicis.	180
XL V.	De Aneurismatis curatione.	181
XL VI.	De Batracho siue Ranula.	182
XL VII.	De Parulide & Epulide.	184
XL VIII.	De Parulidis & Epulidis causis, indicis & curatione.	185
XL IX.	De Thymo & condylomatis.	187
L.	De Thymi & condylomatum causis & curatione.	188
L I.	De Tumoribus indiscriminatis omnes corporis partes obsidentibus, quos Auicennas Essere vocat.	191
L II.	De Esserarum causis & indicis.	192
L III.	De Esserarum curatione.	194

LIBER SECVNDVS.

CAP. I.	DE inflammationibus à bilioso humore excitatis.	197
II.	De Erysipelatum causis.	199
III.	De Erysipelatis indicis.	200
IV.	De Erysipelatis exquisiti curatione.	201
V.	De Herpete.	209
VI.	De Herpetis causis & indicis.	219
VII.	De Herpetis curatione.	212
	†	VIII. Her

VIII.	<i>Herpetis miliaris curatio.</i>	219
IX.	<i>De Phlyctenis.</i>	221
X.	<i>De Phlyctenarum causis.</i>	222
XI.	<i>De Phlyctenarum curatione.</i>	223
XII.	<i>De Impetigine.</i>	225
XIII.	<i>De Lichenum causis & curatione.</i>	227
XIV.	<i>De Sudaminibus à Græcis idem vocatis.</i>	231
XV.	<i>De Sudaminum causis.</i>	232
XVI.	<i>De Sudaminum curatione.</i>	233
XVII.	<i>De Epinyctide.</i>	237
XVIII.	<i>De Epinyctidū causis & indiciis.</i>	239
XIX.	<i>De Epinyctidis curatione.</i>	240
XX.	<i>De Angina.</i>	242
XXI.	<i>De Anginae causis.</i>	244
XXII.	<i>De Angina indiciis.</i>	245
XXIII.	<i>De Anginae cura.</i>	245

LIBER TERTIVS.

CAP. I.	D E Oedemate.	256
II.	De Oedematis causis.	259
III.	De Oedematis indiciis.	260
IV.	De Oedematis curatione.	261
V.	De Oedemate illegitimo, phlegmonode, erysipelatode, & scirrhode.	276
VI.	De Oedemate flatulento, vel de inflatione.	277
VII.	De flatulenti oedematis causis.	278
VIII.	De tumoris flatulenti indiciis.	280
	IX. De	

IX.	De tumoris flatulenti curatione.	287
X.	De Tumore aquoso.	290
XI.	De Tumoris aquosi causis.	291
XII.	De Tumoris aquosi signis.	293
XIII.	De Tumoris aquosi curatione.	294
XIV.	De Strumis.	299
XV.	De Strumarum causis.	301
XVI.	De Strumarum indiciis.	302
XVII.	De Strumarum curatione.	303
XVIII.	De Gangliis & aliis pituitosis tu- moribus.	315
XIX.	De Ganglij & aliorum tumorum à pituita procreatorum curatione.	319
XX.	De Varis.	323
XXI.	De Varorum curatione.	323
XXII.	De Hydrocephalo, siue capitis aquoso tumore.	325
XXIII.	De Hydrocephali causis & indiciis.	326
XXIV.	De Hydrocephali curatione.	328
XXV.	De Hydrope.	330
XXVI.	De Anasarca.	331
XXVII.	De Anasarca causis.	333
XXVIII.	De Anasarca indiciis.	335
XXIX.	De Anasarca curatione.	337
XXX.	De Ascite.	353
XXXI.	De Ascitis causis.	354
XXXII.	De Ascitis curatione.	359
XXXIII.	De ventoso Hydrope.	373
XXXIV.	De Tympania causis & indiciis.	373.
	† 2. XXXV.	

XXXV.	De Tympania curatione.	374
XXXVI.	De Ramicibus.	381
XXXVII.	De Hernia causis.	381
XXXVIII.	De Ramicis indiciis.	383
XXXIX.	De Ramicum curatione.	385
XL.	De Priapismo & Satyriasi.	391
XLI.	De causis Priapismi & Satyriasis.	392
XLII.	De signis Priapismi & Satyriasis.	393
XLIII.	De Priapismi & Satyriasis curatione.	394.
XLIV.	De Arthritide, & eius speciebus.	397
XLV.	De eorum affectuum causis.	398
XLVI.	De Arthridis, Podagra, Chiragra & Ischiadis signis.	402
XLVII.	De Arthritidis, & aliarum specierum curatione.	404
XLVIII.	De Coxendicis morbi curatione.	420
XLIX.	De morbo Parthonopeo, siue Hispanica lue.	431
L.	De Luis venerea causis.	436
LI.	De Luis venerea notis.	444
LII.	De Luis venerea curatione.	445

LIBER QVARTVS.

CAP. I.	DE Tumoribus à melancholico humore excitatis.	505
II.	De Scirrho.	507
III.	De causis Scirrhi.	509
IV.	De vtriusque Scirrhi notis.	511
	V. De	

V.	De Scirrhi illegitimi curatione.	512
VI.	De Cancro.	522
VII.	De Cancri causis.	524
VIII.	De Cancri indiciis.	529
IX.	De cancri curatione.	526
X.	De varicibus.	538
XI.	De varicum causis & signis.	532
XII.	De varicum curatione.	540
XIII.	De Hemorrhoidibus.	542
XIV.	De Hemorrhoidum causis.	543
XV.	De Hemorrhoidum notis.	544
XVI.	De Hemorrhoidum curatione.	545
XVII.	De psora & lepra.	552
XVIII.	De psoræ & lepræ causis.	553
XIX.	De psoræ & lepræ notis.	554
XX.	De psoræ & lepræ curatione.	556
XXI.	De Elephantiasi.	561
XXII.	De Elephantiasis causis.	563
XXIII.	De Elephantiasis indiciis.	566
XXIV.	De Elephantiasis curatione.	569
XXV.	De Chiragra, quam Elephantiam Mauritani Medici vocant.	581
XXVI.	De Chiragræ causis.	582
XXVII.	De Elephantiæ notis.	584
XXVIII.	De Elephantiæ curatione.	585

LIBER QUINTVS.

CAP. I.	DE Abscessibus.	590
II.	De Abscessuum differentis.	593
	† 3	III. De

III.	De Abscessuum signis.	593
IV.	De Apostematum causis,	594
V.	De Apostematum curatione.	595
VI.	De aliis Abscessuum speciebus.	599
VII.	De horum Abscessuum causis.	600
VIII.	De horum Abscessuum signis.	601
IX.	De curatione horum abscessuum.	602

SYLLABVS CAPITVM
TRACTATVS DE LVE
VENEREA.

CAP. I. **D**E origine & nominibus Luis
venereæ. 607

II. Quid sit Lues venerea, & ad quod
genus affectuum præter naturam
reducenda sit. 610

III. In quo exponitur natura excrementi
venerei, & prior definitionis pars
examinatur. 619

IV. Quomodo excrementum venereum sit
principium omniū affectuum præ-
ter naturam in corpore. 626

V. Quæ Luis venerea in corpore sit as-
signanda sedes. 630

VI. De causis Luis venereæ. 634

VII. Luis venerea species & differentie.
638

VIII. Diagnostica Luis venereæ genera-
lia

I X.	<i>Prognostica Luis venerea signa.</i>	647
X.	<i>De prasagiis Luis venerea.</i>	653
XI.	<i>Luis venerea indicationes curatoria.</i>	657
XII.	<i>Luis venerea therapia.</i>	661
XIII.	<i>Symptomatum venereorum particularis therapia.</i>	688
XIV.	<i>De congrua sex rerum non naturalium administratione in Lue venerea.</i>	706
XV.	<i>De prophylaxi à Lue venerea.</i>	709

Privilegio

Privilege du Roy.

LO V I S par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre. A nos amez & feaulx les gens tenans nos Cours de Parlement de Paris, Thoulouze, Rouen, Bourdeaux, Dijon, Aix, Grenoble & Bretaigne, Baillifs, Prenosts & Seneschaux desdits lieux, & à tous autres Officiers, Salut. Receu auons l'humble supplication de nostre bien amé P I E R R E R A V A V D, Marchand Libraire de nostre ville de Lyon, disant qu'il a recouuert plusieurs Traictez en Medecine, asçauoir *Francisci Ranchini Iusurandum Hippocratis. Pathologia vniuersalis. Tractatus de Crisibus. Tractatus de morbis puerorum. De morbis virginum. De senum conseruatione, & senilium morborum curatione. De morbis subitaneis. Antonij Saporita de tumoribus prater naturam.* Et encores, les leçons en Pharmacie dudit Ranchin, où se void en suite les Commentaires sur les Canons de Mesué, le Traicté des simples medicamens, le Traicté des venins, & metaux. Tous lesquels Traictez le suppliant desireroit imprimer ou faire imprimer tant en langue Latine, comme l'auteur les a composez, que par versions qu'il en pourroit faire faire par personnes capables: mais il doute que autres Libraires & Imprimeurs que luy, ne luy voulussent faire le sem

le semblable, & le frustrer par ce moyen de ses labours, frais & despens, sous ombre de quelque particuliere addition, version & traduction, ou autre couleur dont ils pourroyent prendre pretexte, au grand preiudice dudit exposant, si par nous ne luy estoit pourueu, & permis imprimer iceux Traictez. Pour ces causes desirant iceluy exposant n'estre frustré de ses labours, frais & despens, luy auons par ces presentes permis & permettons pouuoir imprimer ou faire imprimer, & mettre en lumiere, vendre & distribuer par tout nostre Royaume & terroir de nostre obeissance, tous les susdits Traictez en Medecine, & version d'iceux en François, en toutes les formes & manges qu'il verra bon estre, faisans tres-expreses inhibitions & defenses à tous autres de quelque qualité ou condition qu'ils soyent, ou puissent estre, d'imprimer ou faire imprimer, vendre & distribuer lesdits Traictez & liures, ny mesme sous pretexte de quelque version & traduction, addition, changement, ou quelque autre forme, & desguisement que l'on voudroit prendre, & y apporter en quelque maniere que ce soit ny en Latin, ny en François, sinon de ceux qui auront esté imprimez & feront faits par ledit Rauaud, & de son consentement, pour le temps & espace de six ans entiers, à compter du iour que lesdits liures & Traictez auront esté acheuez d'imprimer en Latin & en François. De-
clarant

clarant dès à present comme pour lors,
tous les autres exemplaires de quelque
maniere qu'ils soyent, ou puissent estre,
acquis & confisque audit Rauaud, qu'il
pourra faire saisir par les Officiers de Ju-
stice en quelques lieux qu'ils puissent estre
trouuez, nonobstant oppositions ou ap-
pellations quelconques, & sans preiudice
d'icelles. Voulons en outre que les con-
treuenans soyent condamnez aux despens,
dommages, & interets dudit Rauaud, &
de deux mille liures d'amende, moitié à
nous applicable, & l'autre audit exposant,
comme contreuenans & infracteurs de
nostre vouloir & intention. Si vous man-
dons, & à chacun de vous commettons
endroi& soy, si comme à luy appartiendra,
que de nostre present priuilege & de tout
le contenu en iceluy vous faites & souf-
friez iceluy suppliant iouir & vser plain-
ement & paisiblement, ensemble ceux qui
auront charge de luy, & à ce faire, souf-
frir & obeyr contraignez tous ceux qui
pour ce seront à contraindre par toutes
voyes deües & raisonnables. Et en met-
tant par ledit suppliant au commence-
ment ou à la fin desdits liures & Traictez
le contenu ou extraict du present Priui-
lege, voulons qu'il soit deüement signi-
fié. Et à la charge qu'iceluy Rauaud
mettra deux exemplaires desdits liures
& Traictez en nostre Bibliotheque, à
peine de descheance du frui& du present
Priuilege. Car tel est nostre plaisir. Donné
à Paris

à Paris le 26. iour de Mars, l'an de grace
mil six cens & vingt quatre, & de nostre
regne le quatorzième.

Par le Roy en son Conseil,

PERROCHEL.

Acheué d'imprimer le 17. iour d'Aoust
1624.

DE

THROUGHT

CG



DE
AGNOSCENDIS
CVRANDISVE
TVMORIBVS PRÆTER
naturam.

A V T O R E

ANTONIO SAPORTA *Doctore
Medico Cancellario Academia
Medicorum Monspessuli, &
Professore Regio.*

LIBER PRIMVS.

C A P. I.

MOrbi humanum corpus ob-
sidentes (quod est medica-
tiuæ artis subiectum) aut
sunt intemperaturæ similariû par-
tium, aut vitiatæ cõpositiones dis-
similariû & organicarum, aut so-
lutæ continuatès vtrisque com-
A munes.

2 *De Tumorib. præter naturam,*
munes. De intemperatura & eius
differentiis dicere primum non est
nostri instituti, neque de continui
solutione, (de iis enim nonnulla
seorsum scribere instituimus,) sed
de tumore præter naturam exter-
nas partes diuexante, à quo vitiata
compositio sensibus sese offert. Hic
autem non à carnis copia, quam
Græci πολυσαρκίαν, vel πολυσωματίαν
vocant, qualis contigit Nicoma-
cho Smirnæo (quem ab Æsculapio
curatum fuisse traditur,) neque à
pinguedinis mole, aut ossium elu-
xationibus, sed ab humore, aut à
substantia humori congenere no-
men magis proprium desumpsit.
Nam in carnoso genere ipsius pro-
fectò carnis tumor alius est, alius
humorum: carne scilicet humidi-
tate superflua, lanæ cuiusdam, aut
spongiæ instar impleta. In eo igitur
de quo agimus tumore succus
aliquis subsistit, cuius tradenda est
nobis definitio. Nam à definitio-
ne eius ipsius de quo disputatur,
iuxta Philosophi sententiam, rectè
auspi

auspicabimur. Mox quod definitione erit explicatum, in suas differentias diuidemus. Tandem causas, notas, & prognostica subiiciemus. Denique singulis capitibus particularem curandi rationem aperiemus, non solum ex antiquorum monumentis, sed nostris experimentis decerptam.


Tumor igitur præter naturam, siue moles ea quam Græci *ὄγκος* vocant, ubi partes à naturali habitu in quantitate recesserunt, non solum in longum, latum & profundum, dimensio est, sed morbus ex triplici morborum genere compositus, intemperie scilicet, vitiosa compositione, & soluta continuitate. Cum enim in aliquam corporis partem vitiosus decubuit humor, sua intemperatura similes partes labefactans, illarumque spatia replens atque distendens, triplex genus morbi excitat, nō separatum, sed ita coniunctum, ut unico curationis scopo, nempe euacuatione ipsa, tollatur. Quæ tria morbo-

4 *De Tumorib. præter naturam,*
rum genera, magnitudine æqualia,
tumoris præter naturam partium
functiones sensibilibiter lædentis, ef-
sentiam constituunt.

Mauritanorum Medicorum In-
terpretes, & qui horum vestigia
sunt secuti, id quod Græci *Ἀπὸστημα*,
Latini abscessum vocant, cum tu-
more perperam confuderunt, cum
luce meridiana clarius sit, apo-
stema speciem, tumorem verò ge-
nus esse: quod vberius in sermo-
nis discursu explicabitur. Apo-
stema illi in sequentem definie-
runt modum. Est tumor præter
naturam, in quo aliqua materia
membrum replens & distendens,
est aggregata. Quæ certè definitio
ut satis crassè tradita est, ita tumori
præter naturam potius quàm apo-
stemati est ascribenda. Nam apo-
stema maximam partium quæ prius
se inuicem contingebant, distan-
tiam & spatium, à flatuosæ, aut pu-
tridæ materiæ concursu factum,
nobis indicat; quod medicarum
definitionum autor his verbis scri-
ptum

Liber primus, Cap. II. 5

ptum reliquit. Est apostema mutatio corporis ex inflammatione in pus. Sed fit & ἀποσκημα, quando humores loco quem prius infestabant relicto, in alium confluunt, tumorem præter naturam facientes. At in omni tumore, humorem qui illius est causa, computrescere minimè oportet. Quod facile videre est in ea phlegmone, cuius tumor digesto humore evanescit.



De Tumorum differentiis.

C A P. II.

TRadita tumoris præter naturam definitione, nunc tempestivum est ut tumores in suas differentias secemus. Horum igitur triplex est differentia. Tumores à priscis οἰδύματα vocati, vel cum dolore sunt, quos recentiores Medici inflammationes nominant, vel doloris sunt expertes & duri, σκίρρως Græci dicunt; vel molles, qui οἰδύματα propriè

A 3 dicun

6 *De Tumorib. præter naturam,*
dicuntur. Cùmque differentiarum
nonnullæ à membris, à symptoma-
tis, à rei substantia, vel à materia
petantur: magis tamen propriæ
sunt quæ ab efficiente causa desu-
muntur, vt de febrium differentiis
loquens fecit manifestum Gal. Er-
go quemadmodum quatuor esse
humores constat: ita quatuor pri-
mæ ac generales tumorum diffe-
rentiæ rectè constituentur, quarum
cùm prima sit phlegmone, ex flu-
xione sanguinea obortus tumor,
huius & omnium suarum specîe-
rum definitionem, causas, indicia,
curatiuam methodum hoc libro
trademus. Quæ sub phlegmone
continètur species, sunt phlegmo-
ne erysipelatodes ex sanguine &
bile, phlegmone œdematodes ex
sanguine & pituita, phlegmone
scirrholes ex sanguine & melan-
cholia constans. Ad phlegmonas
quoque spectant Dothienes siue
furunculi, bubones, phygetla, phy-
mata, therminti, carbunculi, gan-
grenæ, sphaceli, siue syderationes,
vux

Liber primus, Cap. II. 7

vix gurgulionis, tonsillæ, glandularum ac faucium paristimia, & partium quæ in pharynge consistunt inflammationes, parulides, thymi, condylomata, epulides, ecchymata, βάρσυχⓄ siue Ranula, quam Paulus phlegmonodem tumorem vocat, Aneurisma; de quibus suo loco differemus.

Ex biliosa defluxione alter præter naturam tumor originem trahit, ἐρυσίπelas Græcis, ignis facer Latinis, Dino Florentino Auicennæ Interpreti spina dictus. In erysipelatis genere sunt, Erysipelas phlegmonosum, œdematosum & scirrhusum, herpes nomen generis obtinens, herpes exedens, herpes miliaris, phlyctenæ, morbilli, siue exanthemata, ὑδρῶα, id est, sudamina ex biliosi humoris feruore, papulæ, iniucundissima affectio lichen, siue mentagra, & pruriginosa tubercula.

Tertiam tumoris speciem committit œdema, quod morbus est, non autem tabis, cachexiæ, aut hy-

8 *De Tumorib. præter naturam,*
dropis symptoma. Huius verò origo duplex, vel ex sola & tenui pituita, vel ex hac, aliis humoribus permixta, vt modò œdema phlegmonodes, œdema erysipelatodes, œdema scirrholes dicatur. Referuntur quoque ad œdemata hydrocephalos, aquosus tumor, hydrocele, tympanias, ascites, leucophlegmatias, achores, pituitæ falsæ & aluminosæ soboles, phlyctenæ, strumæ, ganglia, calli cornua, priapismus & satyriasmus, tametsi ultimæ species propriè inflationes esse censeantur.

Quartam atque ultimam tumoris speciem complet scirrhus exquisitus, durus & doloris expers tumor. Illegitimus scirrhus ex atrabile alteri humori permixta, scirrhus phlegmonodes, erysipelatodes, œdematodes, & is qui ex phlegmone, erysipelate, œdemate, impendio refrigeratis, prouenit. Ad hanc spectant Cancer, Polypus, Pfora, Lepra, Satyriasmus, Elephas, & malum à neotericis vocatum
mor

Liber primus, Cap. 11. 9

mortuum, ipsaque Hispanica lues.

Porro scirrhus sunt vicina echymomata, melasmata, varices, mariscæ, ionti siue vari, myrmecia, acrochordones, ganglia, ptydraces, polypi, scirrhus insuper albus, à resiccata pituita originem trahens. Sunt & aliæ tumorum differentia, non ab humoribus, sed à rebus aliis desumptæ, vt Epiplocele, Enteroccele, Enteropiplocele, Cystoccele, Bubonoccele, & omnes³¹ restium tumores (quos celas vocant) Exomphalos, Sarcoccele, Thymi. Abscessus præterea sunt ex tumorum genere, vt ἀσπερώματα, σκαδάρματα, & mellicerides, de quibus quinto præsentis operis libro agemus. Sunt præter hos alij perniciosi ulceribus copulati, quales sunt qui phagedinica, χερσάνια Thelepharia ulcera comitantur, de quibus (cum ulceribus profligatis, profligantur & ipsi) hic à nobis nulla fiet mentio.

*De Tumorum causis.*

C A P. III.

Causam eam esse ad quam aliquid sequitur, ab Aristotele lib. de Physica auscultatione secundo traditum est, & ab omnibus Philosophis confirmatum. Et quamvis in quatuor genera causam Philosophi diuidant, efficientis tamen potissimum ratio Medicis est habenda. Causa autem omnium tumorum præter naturam efficiens, duplex statuitur: humorum scilicet ad aliquam corporis partem defluxus; aut illorum successiva in parte coarceruatio. Ad πρῶτα siue defluxionem concurrit propellentis partis robur, fluentis materie copia, meatuum, venarum & arteriarum, per quos fluxura est materia, laxitas & amplitudo, expellentium angustia, & loci fluxionem excipientis situs inferior. Cum enim sanguis ad aliquam corporis sedem

sedem defluit, primò per arterias & maiores venas delabitur, quo ipsæ replentur & extenduntur, post quas & mediocres & minores repleri contingit; tandem capillares quæ prius nostris sensibus erant occultæ, ita replentur, ut humor ex venarum osculis egressus, & se in membri poros insinuans, tumorem præter naturam pariat. Cuius rei testis locupletissimus est Galenus. Tumores itaque à calido humore profecti ab humoris fiunt confluxu, & aliis frequentius accidunt. Qui à frigido pendent, coaceruata sensim in poris materia, ab altricis, vel alteratricis facultatis, aut excretoriæ imbecillitate scaturiunt. Nam quando alteratrix partis facultas labefactata, non potest totum quod attraxit alimentum conficere, & expultrix quod onerosum est expellere, tumorem contrarium ei qui per defluxionem fit, generationem habentem relinquit. Vterque à causis procatarcticis, aut evidentibus, non debetè no-

12 *De Tumorib. præter naturam,*
 fitro corpori occurrantibus, contu-
 sione scilicet, ruptione, vulnere, lu-
 xatione, & omnibus his quæ calo-
 ris aut doloris vi fluxionem exci-
 tant, scaturit. Corporeas quoque
 antecedentes vocant, quæ in alias
 corporeas, morbisque immediatas,
 continentes appellatas, degenerat.
 Quamdiu. n. præsentis sunt in par-
 tibus aggregati, atque infarcti hu-
 mores, tamdiu tumores perseverant,
 quibus evanescentibus & ij finiun-
 tur. Quippe sic à Gal. est definita
 continens causa. Quæ cum præ-
 sens est, eius quoque adest morbus,
 cum verò tollitur, etiam morbus
 evanescit.

x. de
 locis
 affectis
 cap. x.



*De Tumorum temporibus &
 indiciis.*

C A P. IV.

SI quis tumorum tempora,
 τειροί à Græcis vocata (quæ
 duplicia, sunt morborum
 scilicet & remediorum) negligat,
 non

Liber primus, Cap. IV. 13

non poterit vera methodo tumores ipsos profligare. Sunt autem temporum siue causarum motionis, p̄sertim tumoris salubris differentiae quatuor, initium videlicet, incrementum, vigor summus & declinatio. Rursus hæc latitudinem obrinentia, in vniuersalia, totam morbi constitutionem, & in peculiaria, particulares accessiones metientia, diuiduntur. Tumorum præter naturam vniuersalia tempora, à tribus potissimum rebus designantur. A tumoris scilicet essetia, materia, dispositione, & symptomatis, curandi rationem maxime immutantibus. Tunc tumoris principium iudicabis, quando fluere humor & pars distendi incipit cum dolore exiguo. Ad aucta tumoris moles, affectique loci repletio, ac symptomatum quæ tumorem sequi solent augmentum, incrementi est nota. Cum omnia ad summum vigorem peruenere, neque amplius crescere possunt, status est indicium. Declinationem
tunc

14 *De Tumorib. præter naturam,*

*lib. de
in a-
quas
insep.*

tunc adesse agnoscimus, quando omnia symptomata cum tumoris mole imminuuntur, vel tumorem faciens humor in aliam substantiã mutari incipit. Solent enim tumores humoris digestionem, vel suppurationem, aut ad scirrhosum tumorem conuersionem, vel laborantis particulæ corruptionem (quæ omnium pessima est terminatio) finire: quæ Galeni est sententia. Cæterum tumores naturam, motumque eorum humorum à quibus scaturiunt, sequuntur. Phlegmone ipsa cum à sanguine, quantitate omnes humores excedente gignatur, ægrotantem æqualiter diuexat; quoto quoque die & certis ipsius horis œdema à pituita profectum: alternis verò diebus erysipelas à biliofa fluxione ortum: quarto quoque die scirrhus à melancholico succo originem trahens, exacerbatur.

*lib. de
differe-
tiis feb.
1. sen.
4. cano.*

Horum autem humorum motus, & recursus causam abundè demonstrauit Galenus & Arabs Auicenn. Dissoluitur tumor si leuius, deficiente

Liber primus, Cap. IV. 15

ciente pulsatione, sentiatur membrum. Hunc in suppurationem verti existimabis, calore, pulsatione, & dolore adauctis. Nā circa puris generationem, scribente in Aphorismo Hipp. dolores & febres, &c. ^{2. Aph.} Tumorem in scirrhosam duritiem abire pollicetur, huius diminutio, remanente duritia particulæ laborantis. Corruptionem testantur lividus nigerque color, & fœtor insignis, qui magnæ putredinis soboles existit. Porro vniuersales tumorum summa corporis occupantium notæ, à partis præstantia & sensibus ipsis sunt petendæ. Cùm enim in trinam dimensionem naturalem statum excedentem attollitur membrum, cui humor, aut aliqua quæ ad humorem reduci potest substantia, ansam suppeditat, tale tumore præter naturam diuexari nemo ibit inficias.

Sed vt tumoris species exactè possint deprehendi, aliis particularebus notis (de quibus in priuatis capitibus differemus) erit vtendū.

Vniuer

I 6 De Tum rib.præter naturam,

*Arist.
1. Phys.*

Vniuersalia enim (vt disciplinarum ordo efflagitat) cùm particularibus sint communiora, primo loco tractari debent. Et quamuis rarò tumores à sinceris humoribus dependeant (nam qui in venis continentur simul sunt commixti) curationem tamen simplicium & sincerorum persequemur, ex qua compositorum atque implexorum curatio facilè perspicietur.



De vniuersali tumorum curatione.

C A P. V.

IN medendis præter naturam tumoribus, sicuti & in aliis omnibus morbis necessarias esse indicationes, à Gal. in tota medendi methodo est traditum. Est enim indicatio, vt de præstantissima Medicorum secta ad Thrasib. scriptum reliquit, auxilij comprehensio, vnà cum noxij perceptione, siue obseruatione, vel ratiocinatione incidēs. Vel, indicatio est agendorum insinuatio.

*3. meth.
meden-
di.*

nuatio. Præcipua igitur rustico ac plebeio cognita indicatio, (quæ est veluti totius curationis carcer & principium) à tumoris essentia, quæ quid sit agendum nobis ostendit, est desumenda. Et cum omnis tumor à plenitudine proficiscatur, & quicunque à plenitudine facti sunt affectus euacuatione (docente in Aph. Hipp.) sanentur: vt illum profligemus, erit euacuatione utendum. 2. Aph.

Iam verò quibus præsiidiis euacuationē moliamur, accersēdæ nobis sunt aliæ indicationes soli rationali Medico cognitæ. Sed prius ne methodum curatiuam confundamus, tumorem per defluxum, ab eo qui per successiuam coaceruationem fit, separabimus, ac prioris, frequentiusque accidentis remedia scribemus. Tres itaque nobis in curandis tumoribus qui per influxum fiunt, proponuntur scopi, quorum primus prophylacticen, siue præcautionem comprehendit. Nā cum isti tumores fiunt defluente in locum

18 *De Tumor. præter naturam*,
cum materia, hanc auertemus venæ
sectione, ex distante & contraria
parte (quam antispasticā vocant) fa-
cta, præsertim si corpus plethoricū
sit. Quod si cacochymia illud infe-
stauerit, purgatoriū medicamentū
(quod nō solū euacuando, sed re-
uellēdo humori est aptissimū præ-
sidiū) præscribemus. Reuellit quo-
que mensiū & hæmorrhoidū pro-
uocatio. Sanguinis missionē emol-
liens, intestinaque eluens cly-
ster, aut eccoproticum aliquod me-
dicamentum (quale est ex cassiæ fi-
stularis medulla aut catholico pa-
ratum) præcedere debet: extrahen-
di sanguinis quantitatem ex viriū
robore (quas in omni euacuatione
cōsulere debemus) æstimabimus. A
plethora hominem vindicabis cum
frequenti balneo, exercitatione,
multaque frictione, cum inedia
probaque instituta victus ratione.
Si labētibus viribus sanguinis mis-
sionem reformides, curbitularum
vſus, vel grauis vinculorum in ex-
tremis partibus nexus erit saluber-
rimus.

rimus. At meminisse semper oportet Hippocratis dogmatis, ut κατ' ἴξιν auersio fiat.

*lib. A.
de rati-
one. vi-
ctus in
acutis.*

Non solum itaque phlegmonum quæ in generatione sunt, fluxionem iam dictis modis auertemus: sed repellentibus medicamentis illam intercipientes. Sunt autem ἀποκρουστικά siue repellentia medicamenta ἐμπασσίνου, hoc est, attrahentibus contraria. Quæ cum frigida sint ac crassam consistentiam habeant fluentem in locum phlegmone tentatum, humorem ad partes altas impellunt. Sed danda est opera ne his ante plethoræ (si qua sit) solutionem utaris. Repellentia non solum phlegmones generationem & incrementum, sed abscessus, maligna ulcera, febres, dolores, multaque corporis vitia compescunt: qualia sunt oxycratum, lactucæ, adstringentiumque herbarum succus, bolus armenia, sanguis draconis, & alia permulta, de quibus suis locis fusiùs agemus. Hæc
fluxio

*Gal. 5.
de fac-
cul. S.
hic.*

13.
meth.
med.

20 *De Tumorib. præter naturam,*
fluxionem inhibent, & incipienti tumori sunt admouenda. Cumque in eo, de quo agimus tumore, fiens & factum reperiatur, medentis consilium duplex esse debet. Aliud, quod tumorem fieri prohibet, quodque quamuis non curet, ipsam tamen fieri præpedit: aliud, quod iam factum confirmatumque curat, & discutit. Est enim rei præsentis curatio, futuræ verò præcautio.

Hac igitur methodo tumori qui in generatione est, medebimur, ut quamdiu in locum fluit humor, tamdiu repellentibus utamur: defluxum verò & parti impactum humorem, qui illius continens est causa, insensibiliter vel perspicuè euacuemus. Fluit autem per initia & incrementa humor. Erit igitur his temporibus repellentiū vsus salutaris. Hæc verò antequam admoueamus, erit accuratè animaduertendum ne tumor laxas & adenibus obsessas partes (quas emūctoria vocāt) occupet: vel

à pestilenti venenatôque humore scaturiat, vel denique ex illarum sit inflammationû numero, quæ morbos iudicare sunt solitæ. Tunc certè his tumoribus repellentia medicamenta aduersissima sunt, quæ initio aliorum tumorum sincera admoueri debent, præsertim si hos per defluxum fieri contingat. Digerentia (sed inæqualiter apocrousticis mixta) quando ad tumoris incrementum ventum erit, sunt ex usu. In summo vigore æqualiter misceri debent. In ipsa declinatione diaphoretica sola à repellētium sodalitiô priuata sunt adhibenda, potissimùm si digestionî pareat humor. Quod si discuti non possit, ad vsum pus mouentium transcendendum erit, vt vberius quinto præsentis operis libro ostendemus.

Porro ad secundum scopum properandum est, qui anodynorum, id est, dolorem sedantium, & intemperiem profligātium, usu completur. Accedunt ad hæc naturales
mea


22 *De Tumorib. præter naturam,*
meatus relaxantia, per quos pars
expurgari solebat. Sunt autem ἀνό-
δυνα ἀσφαγμενά vel ἀπαύλινα duo-
rum generum. Nam quædam reue-
ra talia sunt, quæ cum tenui sub-
stantia primo ordine calfaciunt, &
non multò calidiora quàm quæ
symmetra sunt, euacuant, rarefa-
ciunt, extenuant, concoquunt, ni-
hil adstrictionis habentia. Et quam-
uis dolorem leniant, affectum ta-
men non curant, id enim commu-
ne esse omnium quæ curant, docet
Galenus, quibus quodammodo si-
milia sunt ἀκροα, id est, lassitudi-
nem auferentia. Dolores igitur ane-
thino, chamæmelino, oleo dulci, &
ætate medio, è lini & althææ semi-
ne leniuntur. Sunt & alia quæ do-
lorem sedant, quia causæ repugnât,
ex quorum numero est oleum ro-
faceum, vbi à calore commotus
est dolor, oleum susinum & lauri-
num, vbi à frigore. Aliud est ge-
nus illorum quæ ὑπερωτικά & ὑπνω-
τικά vocantur, eaque stupefacto
sensu dolorem conquiescere fa-
ciunt.

ciunt. Hæc nisi magna exposcente necessitate, & aliorum usu præcedente, admouenda non sunt: ut mandragoræ, & alterci oleum, vel papaueris lacryma.

Tertium verò scopum absolues, humorem tumorem excitantem à loco euacuando. Quod digerentibus & diaphoreticis præstabis, nōnunquam repellentibus, præsertim si humorē tenuem & paucum, & in paruis vasis adhuc contineri existimes. Tumori à calido & tenui humore excitato diaphoretica initia, ἀραιωτικά vocata, adhiberi debent. Suspecta habentur acria, nisi à frigido succo genitus sit præter naturam tumor. Quippe quæ humoris parte tenuiori euacuata, remanentem lapidescere faciunt, & scirrhum excitant. Diaphoretica sunt, chamæmelinum oleum, è lini semine, aqua calida, butyrū, oleum dulce. His fortiora oleum sicyonium, ricininum, & nucum, de quibus in priuatis capitibus fusiùs differemus. Tumores facti ab humore

*Gal.
13. Me-
thod.*

24 *De Tumorib. præter naturam,*
more sensim coaceruato in parte
qui in principio sunt; apocrousticis
humorem ad altas partes trans-
mittentibus iuuantur: quæ adstrin-
gentem & exiccantem facultatem
habeant oportet, vt non solum tu-
moris præpediatur incrementum,
sed humor parti impactus (hac va-
lidiorè effecta) discutiatur: quo-
rum syluam tertio libro trade-
mus.



De Phlegmone.

C A P. VI.

Posteaquam sermonem vni-
uersalem de tumoribus præ-
ter naturam absoluimus, tē-
pestiuum est, vt de singulis eorum
differentiis particulatim dissera-
mus, principium à phlegmone fa-
cientes, quod frequenter (docente
Gal.) ob humoris à quo gignitur,
copiam accidat, & vehementissi-
ma atque periculosissima sympto-
mata excitet: cuius significatum
duplex

13. Me-
th. 2. ad
Glauc.

duplex est. Nam quandoque effervescentiam, & partis insignem caliditatem, veluti membri febrem nobis repræsentat, (vnde solebant veteres, docente Paulo Ægineta, omnes inflammationes phlegmonas appellare) de qua hoc loco agere minimè decreuimus, sed de ea quæ à sanguine, mediocrem subsistentiam nacta, & quantitate à naturali habitu deflectente, generisque nomen obtinente, nascitur. Non enim ab intercluso duntaxat spiritu fit, quod illius sectio ostendit: minusque à sola sanguinis fusione, rarefactione, aut feruore: vt in aqua aliisque humoribus effervescentibus. Ergo à recenti & noua influente substantia, à laborante membro suscepta fit. Neque carnis multitudo (quam polysarciam vocant) phlegmones est causa. Nam si maior carnis copia in corpore constituitur, maior tumor euadit. Color tamen corporis, aut partis in sanitatis terminis remanet. Polysarciam aliquando in cor-

B

pore

26 *De Tumorib. præter naturam,*
pore gigni sensus ipse indicat,
Gal. 2. de morborum causis ostenden-
dente. Partium magnitudo auge-
tur facultate valente & materie
utilis multitudine. Caro verò à
causis contrariis minuitur. Quod
in virginum mamillis & multorum
hominum testibus experimur: præ-
sertim quando vires naturâ validæ
sunt, & adest materiei laudatæ co-
pia. Atque hic affectus (quamvis
tumor maior quàm pro naturali
constitutione euadat) nō est phleg-
mone, eo quod in phlegmone non
solum est mutatio secundum quan-
tatem, sed secundum qualitatem,
quia pars cū tensione & pulsatorio
dolore multo est, calidior quàm an-
tea esset, & magis rubra efficitur.
Vbi autem solius est substantiæ in-
crementum, nec ullus apparet do-
lor, nec pristinus membri color
mutatur, polysarcia est, non autem
phlegmone, quia substantiæ incre-
mentum, non est coloris mutatio-
nis causa, vt luculenter lib. de tu-
moribus præter naturam Galenus,
de

Liber primus; Cap. VI. 27

de pice & niue loquens, ostendit.

*lib. de
bubone
pestilē-
ti.*

Quare constat Phlegmonem ipsā ex solo carnis incremento fieri nō posse, & eam à polysarcia differre. Phlegmonem itaque in legitimam & illegitimam diuidemus. Legitimę naturam iam aperuimus; illegitima autem à sanguine vitioso, ac ob putredinem κακόνδεσιν adepto oritur, vt Anthrax, siue carbo (quē falsò cum Auicenna Guido Cauliacensis sacrum ignem nominauit) & magna illa inflammatio gangræna vocata.

Ex sanguine igitur quatuor tumorum differentiæ nascuntur: aut ex sincero & sola quantitate à iusta naturæ lege deficiente, fit vera atque legitima phlegmone, vt iam dictum est. Et quauis tumores rarò ab vnico humore nascantur; (nam qui in vasis continentur succi simul sunt mixti;) nihilominus vt dilucidior sit doctrina, à simplicibus auspicanda erit methodus curatiua: qua cognita, illorum qui à composito humore trahunt ori-

28 *De Tumorib. præter naturam,*
ginem, facile notitiam nobis para-
bimus. Ex sanguine aliis humori-
bus permixto fiunt tres species, vt
phlegmone erysipelatodes, si san-
guini mixta sit bilis: phlegmone
œdematodes, si pituita: scirrholes,
si melancholia: ex phlegmone &
erysipellate mixtus affectus erit, si
horum humorum par sit quan-
titas.

Gal. 2.
a. 14
ad
Glauc.
co.



De Phlegmones causis.

C A P. VII.

QUæ phlegmonas veras atque
legitimas excitare possunt,
causæ duæ sunt, procacarticae &
internæ. Procacarticae, vt casus,
vulnus, lassitudo, quam magna at-
tulit exercitatio, luxatio, catagma
siue fractura. Alimenta calida, san-
guinemque adaugentia, ac omnia
quæ partem aliquam debilitant &
calfaciunt, externæ causæ habentur:
quæ quamuis sanguineam inflammationem
immediatè non pariant,

riant, ad illius nihilominus generationem corporeas causas irritando, atque mouendo, magnam vim habent. Sed corpoream vnicam, nempe fluxionem ipsam, Gal. statuit. Internas duas Guido Cauliacensis ponit, quem dilucidioris doctrinæ gratia hoc loco sequi decreuimus, alias antecedentes vocitans, alias coniunctas, & ita morbo copulatas, vt quamdiu præsentibus sint, tamdiu is & permaneat & præsens sit. Quod à Francisco Valeriola doctissimo Medico, scitè ac luculenter fuit demonstratum. Sanguinis probi & inculpati exuperantia venas replentis, & distédentis, ad dolore tentatam & debilitatam partem vel plus iusto excafactam fluentis, causa est antecedens: vbi tandem compingitur atque impactus manet, tumorem excitans, eius continens est causa. Phlegmones generatio ex Gal. est perspicua.

2. ad
Glauc.

traet.
2. doct.
2.

lib. Medic.
dic. obserua.

*De Phlegmones indicis.*

C A P. VIII.

Phlegmonē nonnunquam latētes atque abditas corporis partes occupat, continentes febres adferens, quæ cū obscuras notas habeat, acri iudicio prædito, ac in anatome probè exercitato Medico eget. Sæpe in sūma parte exoritur, conspicuam illius partem diuexās, musculi inæqualis intemperies existens, quæ cū sensibus subdita sit, facile deprehenditur. Nam partium externarum affectus (scribente Mauritano Auerrhoë) se ipsos & suas causas produnt; Internarum verò morbi notis indicantibus egent.

*Gal. 1.
de loc.
affectu.*

*De in-
eq. in-
temp.
Gal.*

Veræ ac legitimæ phlegmones notæ sunt, tumor, vel partis incrementum supra naturalem habitum, vehemens calor, adeò ut membrum comburi videatur, rubor, qualis est qui à balneis, vel igne

igne excitatur, dolor pulsatiuus ab arteriarum diastole partem inflammamam feriente, scaturiens, in parte eximio sensu prædita tensio, non solum à Medico, sed ægrotante deprehensa cum renitentia. Corpora puerorum, adolescentiumque, sanguineum temperamentum nacta, plethorica, assuetos labores assuetasque euacuationes negligentia, calidas insuper & humidas regiones incolentia, huic affectui sunt maximè obnoxia. Phlegmone quatuor habet tempora, quorum notæ ex quarto capite sunt requirendæ.



De Phlegmones curatione.

C A P. IX.

SI quispiam vera methodo curare proponat phlegmonas incipientes, quæ in genere tumorum præter naturam sunt, necessum est vt indicationem sumat non solum à morbo, sed
B 4 etiam

32 *De Tumorib. præter naturam*,
etiam à laborante particula, mul-
tas priuatas indicationes comple-
ctente: quales sunt illæ quæ à par-
tis natura, viribus, situ, conforma-
tione, aëris constitutione, consue-
tudine sumuntur, de quibus fusissi-
mè disseruit Gal. lib. 2. ad Glauc.

13. Me-
tho. me-
de.

Curationem itaque sic aggre-
diemur. In primis capienda est in-
dicatio ab eo quod defluit, & iam
fluxum est. Hoc curatione, illud
præcautione eget. Vt autem hoc
exequamur, vtendum erit quatuor
scopis, quorum primus nos monet,
optimam victus rationem ægroto
præscribendam. Secundus, vt hu-
mor fluens reuocetur ac retraha-
tur. Tertius, vt quod parti iam est
impactum digeratur & euacuetur.
Quartus, vt ratio symptomatum,
quæ sæpe phlegmone copulantur,
habeatur. Nam hæc nonnunquam
eius curandi rationem interpel-
lant atque immutant, Galeno au-
tore.

2. ad
Glauc.

Vt autem primum scopum ab-
soluamus, à nobis monendus erit
agro

ægrotus, ut in aëre puro, frigido ad
siccum inclinante, tali natura, vel
arte reddito, versetur, quem posca,
vitiū, cannarum, salicum foliis,
rosis, nymphaeæ floribus, violis, &
id genus similibus refrigerabimus.
Admonendus etiam erit, ut à cibis
corpus apprimè nutrientibus ge-
nerosi ac meracioris vini potu ab-
stineat: sed cibis medicamentosa
atque infrigidante facultate præ-
ditis utatur, qui sanguinem mo-
dicum, & eundem frigidum gi-
gnere possunt. Vini oligophori,
præsertim albi (si viribus sit de-
iectis) & gallinarum, parvarum-
que auicularum, cum omphacio,
oxalide, atque lactuca, vsus con-
cedetur, & aliorum olerum quæ
sanguinem frigidum gignunt, ad-
ministratio erit salubris. Immo-
derata plenitudo cibi ac potus,
cum pomeridiano somno fugien-
da. Ad recrementorum excretio-
nem sollicitanda natura, supposi-
tis mollibus clasmatis, vel bala-
nis ex melle cocto paratis. Labo-

34 *Dè Tumorib. præter naturam,*
res & corporis motus cibos præcedant, non tamen exercenda aut calfacienda pars phlegmone laborans. Frictiones; oppositarumque partium ligaturæ, modò has totius corporis euacuatio præcedat, vtilis habentur. Sit nulla, aut admodum moderata Venus. Furori, iræ, cæterisque animi pathematis, quæ sanguinem inflammant, parcendum.

401 *Secundum scopum sic exequemur.* Si videamus corpus esse plethoricum, & præsentis sint mittendi sanguinis scopi: vel si corpore nequaquam plethorico existente; à casu, percussione, vel alia procatarctica causa excitata sit phlegmone, partis oppositæ venam tundemus; ipsa præsertim inflammatione nondum urgente. Quod si vrgeat, ad propinqua revocare oportebit: quemadmodum in angina, ophthalmia, pleuritide, & aliis inflammationibus, quæ præceps remedium efflagitant videro est.

Pro

Procuranda igitur erit illa venæ
 sectio, quam Gal. ἀντιστασινὴν ἀπ- De cu-
ran, va-
re, per
venæ
sect.
 pellauit, membrorum semper re-
 ctitudine seruata; vt, si fluxio ad
 genu feratur, atque id plurimum
 attollatur, totumque corpus san-
 guine plenum appareat, consul-
 tis prius viribus, cubiti interio-
 rem aut mediam venam incidere
 oportet, semper fluxionis motum
 ad contraria reuellendo. Si verò
 dextrum brachium tentetur, secan-
 da erit dextri cruris vena: si alte-
 rum crus inflammatione labo-
 ret, secandum erit reliquum. Nam
 cum venæ sectionis triplex dicatur
 esse differentia: quædam enim est
 euacuatiua, quæ humori quieto
 huc vel illud minimè vaganti de-
 betur: reuulsiua altera, quæ fie-
 ri debet quando humor ex vna
 parte in aliam transfertur, ex op-
 posita atque distante parte: ter-
 tia, quam ἀποχέρευσιν Græci vo-
 cant, nos deriuatiuam, vbi phleg-
 mone summam corporis partem
 occupat, & comitem non ha-

36 *De Tumorib. præter naturam,*
bet vehementem dolorem ex di-
stante atque opposita parte , ser-
uata semper rectitudine , eua-
cuare nihil prohibet. At vbi
phlegmone internam partem, can-
démque cordi proximam diuexat,
comitemque doloré acerbum ha-
bet , vt in pleuritide , reuulsio ex
maximè distante parte , vt quæ sta-
tim neque euacuare , neque dolo-
rem lenire possit , non est tentan-
da : multò minus deriuatio , quæ
ex proxima fieri debet : sed ex lo-
co medio , nam tunc reuellimus
atque deriuamus.

Hoc in iam nobis proposito af-
fectu facile est videre, in quo pro-
pter succingentis inflammatae mē-
branæ cum corde viscere præci-
puo viciniam , feбри, dolore, sæuis-
que pathematis ægrotus distor-
quetur. Tunc enim non tali , aut
poplitis venam secamus , (nam
nullus aut admodum exiguus ex
ea vsus oriretur , sed cubiti ieco-
rariam , aut mediam : tunc enim
quia quæ secatur pars inflammata
est,

Liber primus, Cap. 1X. 37

est, opposita reuellimus; & quia huic est proxima, deriuamus. Est igitur in tali affectu, cum vrget, secanda ex mediis partibus vena. Nunquā enim incōmodē fluxionis impetus in contrarium retrahitur.

2. ad
Glauc.

Sed ante sectionem supponendus erit clyster, aut dāda medicata potio, vt illorum remediorum ope fæces & recrementa, quæ in primis viis continentur, euacuentur. Clysterem medicatāque portionem in sequentem modum præscribemus.

℞. Malu. viol. achantidis, altheæ, mercur. sing. M. j. quatuor sem. frig. ma. sing. 3. ij. seminis anisi 3. j. prunorum dulcium par. xvij. sem. lini 3. j. flor. viol. bugloss. nimpheæ sing. p. j. fiat decoct. De colatura cape quart. vel lb. j. β. in qua dissolue medullæ cass. fist. 3. j. diaprun. simp. 3. β. olei viol. 3. iij. mel. viol. & sacch. rub. an. quart. β. sali scommunis modicum. Misce, fiat clyster, supponatur ante sanguinis missionem.

℞. Me

38 *De Tumorib. præter naturam,*

24. Medullæ siliquæ Ægyptiacæ recenter à canna euulsæ ʒ.j. vel ʒ.x. cum sacch. fiat bolus, quem per horam ante prandie transglutiant, vel in hordei decocto dissoluet, si sorbere malit. Supposito clysmate, aut medicata potione propinata, tundenda erit sequenti die vena partis oppositæ & distantis. Quod si vires illam non ferant, nimisque anilis, aut puerilis ætas fuerit, ad motis cucurbitulis vel ligaturis, vel frictionibus, vel calfactis partibus contrariis directè affecto loco respondentibus humorem reuellimus.

Ad tertium scopum transeuntes, pro topicis remediis apocroustica medicamenta vsurpabimus: ante quorum vsu diligenter erit animaduertendum, ne tumor laxas & adonibus præditas partes distorqueat, aut quas principum membrorum emunctoria vocant, neue à venenato scaturiat humore, ne etiã à viscida & lenta sit materia procreatus; denique ne ex criticarum inflam.

Liber primus, Cap. IX. 39

inflammationum contubernio sit, ut fuit superius traditum. Varianda autem sunt iuxta morbi tempora præsidia. Nam si morbus sit in principio, puris & sinceris est utendum; si in incremento repellentibus & digerentibus inæqualiter: in summo vigore æqualiter mixtis: in declinatione puris discutientibus. Sunt autem repellentia paulo supra patientem particulam applicanda. Quod si humor digeri non possit, ad usum pus mouentium transeundum est. Commodè itaque in principio inflammationis cataplasmate à Gal. descripto utemur, quod recipit aizoon, siue semperuium maius, malicorium, rhu & polentam in vino decoctam. Hoc enim medicamentum repellit quod influit, & quod iam continetur exiccat, partesque circumstantes confirmat. Polentam, quam Græci ἀλφιλον vocant, probatissimam ex mediocriter tosto hordeo parabimus. Hæc mansa alit, sed modicè, ideoque otiosis,

2. ad
Glauc.

40 *De Tumorib. præter naturam,*
otiosis, sedentariamque vitam du-
centibus hominibus, non militi-
bus, & his qui corpus maxime
exercent dari debet; frigid. autem
& sicca est primo gradu. Hoc certe
remedium probatissimum atque
utilissimum est phlegmone dolori
vehementi nequaquam coulatæ.
Erit & sequentium præstiorum
usus salutaris.

℞. aquæ font. ℥. iij. aceti for-
tiss. ℥. j. misceantur & agitentur
fortissime, admoueatur spongia
infecta hoc liquore, vel panniculus
lineus duplus madidus loco phle-
gmone tentato.

Aliud.

℞. succi semperuiui, lactucæ, so-
lani sing. ʒ. iiij. fantali albi & ru-
bri sing. ʒ. ij. boli armeniacæ, sangui-
nis draconis sing. ʒ. iiij. misce, illina-
tur pars affecta.

Aliud.

℞. folior. populi, polygoni siue
corrigiolæ sing. M. ss. terantur dili-
genter, & cum oleo myrtillorum
fiat in modum cataplasmaris.

Aliud..

Aliud.

℞. albuminis ouor. iij. numero,
olei ros. omphacini ℥. iij. misceā-
tur simul , fiat linimentum quod
parti admoueto.

Aliud validius repellens.

℞. farinae hordei ℥. iij. succi
plantag. aceti fortiss. sing. ℥. iij. suc-
ci lenticulae aquat. ℔. b. succi sola-
ni ℔. j. decoquantur simul ad con-
sumptionem vsque succorum, fiat
in modum cataplasomatis, quod re-
pellit, astringit & abstergit.

Aliud non minus efficax.

℞. Succi parietariae ℥. iij. succi
bechij seu tussilaginis (vngulam
caballinam vocant) ℥. ij. olei ros. ℥.
iij. misce , fiat linimentum. Ani-
maduertendum hoc praesidij genus
de quo proximè verba fecimus, non
solum in principio, sed & in incre-
mento tutò admoueri posse. Quan-
do phlegmone est in incremen-
to , quod ex propriis & à Gal. tra-
ditis notis cognoscemus, vten-
dum erit praesidiis facultatem mix-
tam , nempe digerentem & repel-
lentem.

42 *De Tumorib. præter naturam,*
lentem habentibus. Describendum
nunc medicamentum digerens &
repellens.

℥. sem. lini ʒ. j. β. farinæ hord. ʒ.
ij. flor. chamæmeli ʒ. ij. ros. rub.
ʒ. iij. folior. & baccarū myrti sing.
ʒ. β. Decoquantur omnia diligen-
ter in aceto fortissimo & aqua ro-
sarū, vsque ad horū liquorū con-
sumptionem. Deinde terantur dili-
genter; misce postea pinguedinis
gallinæ ʒ. iij. ol. chamæm. & ros.
an. ʒ. ij. fiat cataplasma aut linimen-
tum. Possumus etiam vti sequenti
medicamento.

℥. folior. altheæ, maluæ sing. M. j.
fol. absynthij M. β. ros. rub. p. j. flor.
anethi & sambuci sing. ʒ. ij. farinæ
sem. lini ʒ. j. β. farinæ hordei ʒ. iij.
coquantur in aqua & pauco aceto,
& per colum medicū transfundan-
tur: adde postea olei ros. ʒ. iij. olei
chamæm. ʒ. ij. pinguedinis gallinæ
recentis ʒ. ij. β. misce, fiat cataplas-
ma. Quod si phlegmone sit in sū-
mo vigore, quæ repellunt digerent-
ibus erunt æqualiter miscenda.

Neque

Neque à Gal. traditum præsidium
erit negligendum, quod in sequen-
tem modum parari potest.

2. avis
cura.
ad Gl.

℞. medullæ panis frumentacei
℔. j. mittatur in aquam feruentem,
& facta expressione, misce mellis ℥.
iij. olei ros. ℥. iij. fiat cataplasma.
Vtile etiam erit sequēs præsidium.

℞. furfuris tritici, farinæ triticeæ
sing. ℥. iij. folior. maluæ parietariæ
sing. M. j. chamom. ℔. β. vini ℥. iij.
coquantur diligenter, terantur &
per colum medicum transfundan-
tur, & cum ceræ quantitate con-
grua fiat emplastrum, quod loco
affecto adinoueatur.

Apparentibus declinantis phle-
gmones notis sola digerentia affe-
cto loco (si digeri possit humor)
erunt apponenda. Quod si per-
seuerante dolore & calore, febre
& pulsatione adauctis, digestioni
sit contumax humor, quæ pus
mouent medicamenta caloris sub-
stantiam & non gradum adaugen-
tia, ex usu erunt. Et cum inter om-
nes tumorum præter naturam
cura

44 *De Tumorib. præter naturam,*
curationes melior sit ea quæ sit per
digestionem, quod minus naturam
infestet, hanc in sequentem mo-
dum aggrediemur.

℥. cinerum buccinarum ℥. j. β.
mellis optimi ℥. j. ol. chamom. ℥. iij.
ceræ quantum sufficit, fiat vnguen-
tum. Huic negotio utilis est lana
hyssopora.

Vtile est & sequens præsidium.

℥. Farinæ fœnugræci, farinæ
sem. lini an. ℥. ij. farinæ erui ℥. j. flo-
rum chamom. meliloti, sambuci
an. ℥. j. ros. rub. ℥. iij. pulueris iridis
Florentiæ ℥. β. decoquantur in suc-
co apij & œnomelite vsque ad li-
quorum consumptionem. Quibus
præparatis adde fæcis olei de lilio
℥. iij. ol. chamom. ℥. ij. fiat cataplas-
ma, vel addita ceræ debita quanti-
tate fiat emplastrum.

Probatum etiam à Gal. empla-
strum diachalciteos, quod Auicen-
nas colcotar appellauit. Hoc enim
in declinatione phlegmones utile
est, quia citra dolorem exiccat.
Multi emplastrum diachylonis mi-
noris

noris ireati commendant. Si iam præscriptis medicamentis phlegmones humor digestionem minimè pareat, properandum erit ad pus mouētium medicamentorū vsum, quæ quamuis phlegmonem propriè non profligent, symptomatis nihilominus maximè conferunt: quod à Gal. luculenter fuit demonstratum. Gignitur enim pus vel ex sanguine, vel contusa carne. Quæ igitur vtilia sunt medicamenta, in sequentem modum sunt præscribenda.

℞. picis naualis, ceræ citrinæ, sæui hircini & olei an. partes æquales, decoquantur donec vnguenti consistentiam adipiscantur. Hoc medicamentum ab Auicenna & Guidone Cauliacensi chirurgo præstantissimo basilicum fuit vocatum, ab aliis tetrapharmacum à quatuor medicamentorum generibus. Paulus Ægineta colophoniam & thus addens tetrapharmacum Macedonicum vocat. Non minus vtile censetur Galeni præsidium in metho

4. Metho.
metho.

46 De Tumorib. prater naturam,
methodo curatiua ad Glauco. præ-
scriptum, vbi ab ipso monemur vt
τασ υδρελαιο, hoc est, aqua & oleo
pingui simul mixtis inflammatam
partem perfundamus, vel tetra-
pharmaco molli in sequentem mo-
dum parato vtamur.

℥. Farinæ frument. lb. j. olei
communis, aquæ fontanæ sing.
partes æquales, coquantur medio-
criter. Nā coctio mediocris phleg-
mone à feruenti humore profectæ
prodest, maior verò illi quæ à mi-
nus calido succo emergit. Quod si
croci quod est pepticum medica-
mentum & leuis adstrictionis par-
ticeps ʒ. j. misceas, vtilius medica-
mentum experieris.

Aliud.

℥. radicum liliorum alborum,
rad. altheæ mundatarum sing. ʒ.
iiij. foliorum maluæ, senecionis,
violarum achanti sing. M. ʒ. carica-
rum pinguium, passularum à gi-
gartis mund. sing. pa. x. Quod si
qui phlegmonem committit hu-
mor crassior & concoctu difficilis
appa

appareat , huic medicamento adde
rad. bryoniæ \mathfrak{z} . ij. coquantur opti-
mè , terantur & per colum medi-
cum transfundantur, addendo fa-
rinæ frumenti (quæ hordeacea ma-
gis concoquit) farinæ seminis lini
sing. \mathfrak{z} . j. β . adipis suilli & gallinæ
sing. \mathfrak{z} . iiij. olei liliorum , chamom.
sing. \mathfrak{z} . iiij. misce, fiat cataplasma,
& parti dolenti admoueto. Con-
uerso iam in puris naturam humo-
re , non statim aperiendus erit tu-
mor scalpello , ignito ferro , aut
pyrotico medicamento , sed dige-
rentibus medicamētis curationem
moliemur,quam cum minimè pro-
desse conspiciemus , secanda erit
tumoris mollior & prementibus
digitis magis cedens pars , mucro-
natam & acutam figuram nobis re-
præsentans. Valido ægroto diffici-
lia & fortia remedia contemnente,
ferrum candens parti affectæ adi-
gemus. Morosi atque imbecillioris
hominis membro & ea remedia
pertimescentis , pyroticum medi-
camentum, quod *καυτήριον* potentia-
le

48 *De Tumorib. præter naturam,*
le appellant quale est illud rupto-
rium quod à Iohanne de Vigo non
contemnendo chirurgo traditum
fuit, adhibebimus, vel huius loco
calcem viuam saponi & salinæ ie-
iunæ permixtam. Sunt & alia py-
rotica medicamenta à Gal. variis
locis tradita de quibus fusiùs cap.
de curatione Anthracis differe-
mus. Sed ante horum omnium
vsum ipsiusque tumoris apertio-
nem, præsertim per sectionem, con-
templandus erit musculorum situs,
ne per transversum tendonem aut
neruum secemus. Hæc omnia tibi
magis perspicua reddent partis fi-
gura, flexus, & illius rugæ. Decli-
uiore loco vt fiat noxij humoris
melior expurgatio, moliri debes
apertionem, cuius figura oblonga
& folij myrti speciem referens: ro-
tunda coagmentum difficilius re-
cipit. Quod si rutilante ferro vel
~~cautelia~~ potentiali apertionem ag-
grediamur, cum ob insignem cali-
ditatem dolores excitari soleant; vt
phlegmones incrementum & no-
uam

uam humoris defluxionem impediamus, superiores membri partes per quas potissimum defluere solet humor, illinemus apocroustico medicamento, ex oleo; rosato & ouorum albo, oxycrato, vel vnguento ex bolo armenica parato, quod nostri chirurgi defensuum vocant. Secta iam parte per adustionem procurandus escharæ casus, butyro recenti non salito, basilicone, vel medicamento ex ouorum luteo & oleo, digestium chirurgi vocant. Post eius casum ab aqua & oleo erit abstinendum. Quod si vulnus abluere conuenit, hoc mulsa, posca vel vino mulso agendum. A pingui medicamento, quale est Macedonicum, quod tetrapharmacum appellant, omnino abstinere oportet, tunc detergendum & siccandum est vulnus sequentibus præsiidiis, præsertim si *ῥύπαρον*, id est, sordidum sit.

℥. Vnguenti apostolorum descrip. Auicennæ ℥. iiij. linamento retorto excipe & vttere. Solidioribus

50 *De Tumorib. præter naturam*
bus siccioribusque naturis, vnguentum quod ex ærugine rasili, alune, melle, aceto fortissimo ad firmitatem coctis conficitur (Ægyptiacum vocant) est vtile. Mollioribus proderit id quod ex duabus partibus basiliconis & vna apostolorum paratur.

Aliud.

℥. Succum apij mellis rosati cocti sing. ℥. iij. farinæ tragij siue siliæ, farinæ hordei an. ℥. ij. coquantur donec lentam consistentiam acquirant, addes terebinthinam purissimum si vlceris nervosam partem tentet) quantum sufficit. Iuuant quoque partis robori non inutiletur absynthij succus. Si ex vomitu genito vlceri copulata sit caliditas intemperies, succum plantaginis præcedentibus medicamentis miscere oportebit. Si gangrænæ magnæ corruptionis aduentum formides, myrrham trogloticam præcedentibus præsidiis miscere. Post humoris sordidi deterfione ab ea quæ remanet cavitatem capi

da est indicatio, adiectionem & similis quæ periit substantiæ generationem exposcente. Quam sarcoticis semper in primo limite siccis respectu partis cui admoventur absoluemus. De quibus cum à Gal. doctè & amplè sit disputatum, & à nobis alio loco sint tradita, ne nostri instituti cancellos egredi videamur, hoc loco minimè differeamus. Quod si genitum ab abscessu vlcus inflammationis non sit particeps, quæ exiccant & cicatricem inducunt, Epulotica vocata sunt apponenda. Deligendum ex calcite emplastrum, cui duplam calcitidis quantitatem miscebis, quod durum esse non debet, sed adstringente oleo mollius factum. Nam quæ dura sunt emplastra phlegmonon reliquias contrahunt, & rursus phlegmonas in ægra parte excitant.

2. ad
Glauc.

Ad quartum scopum properantes, necessum est vt quæ inflammationi copulata sunt symptomata, quæ legitimum curationis scopum

52 De Tumorib. præter naturam

2. ad
Glauc.

præuertunt, docente Gal. sopiari
& mitigemus. Ex horum num
sunt, febris, quæ frigida & hum
victus ratione profligatur: d
vehemens inflammationem ad
gens, ægrotum miserè distorqu
& corporis vires conuellens.
igitur grauiori cum dolore de
xio affligit chalasticis partem
laxantibus, pusque mouenti
medicamentis, vt aqua calida, ol
cataplasmate ex triticea, farina
rato non erit vtendum. Nam
metu leuamentum quoddam
templo adferre videantur, de
xionem nihilominus adaugēt. I
loris itaque vehementiam ex p
rosaceo & pauca cera cum his
quata confecto medicamento v
mur, aut lana succida plurim
& si pi habente, frigida æstate,
pida hyeme. Huic etiam neg
vtilis erit cataplasma de arnog
so, ex lenticula, pane & rosaceo
ratur & supra affectum locum
mouenda erit spongia vino ace
imbuta: aut aqua frigida cui a
mor

momentum miscere non erit inutile. Phlegmonem verò vehementi dolori copulatam, & à causa procatarctica genitam calfacere & humectare modicè, & humorem ad suppurationem ducere sequentibus præfidiis ex usu erit.

℥. vitellorum ouorum recentium num. ij. olei rosati quantum sufficit, ducantur simul & probe misceantur, fiat linimentum.

℥. medullæ panis siliginei ℥. j. infundatur in aquam feruentem, & parum decoquatur, & facta forti expressione misce vitellos ouorum recentium ij. num. lactis caprini ℥. iiij. croci ℥. j.

℥. rad. altheæ ℥. j. malu. violar. sing. M. s. florum chamom. ros. rub. sing. p. s. decoquantur optimè, pistentur diligenter & per colum medicum transfundantur. Addes butyri recentis sine sale ℥. iiij. olei ros. vel viol. sing. ℥. iiij. fiat cataplasma. Quod si horum præfidiorum opera dolor non conquiescat, transeundum erit iuxta Galeni sententiam

C 3

54 *De Tumorib. præter naturam*
tiam ad narcoticorum medicamen-
torum vsum, quæ quamuis pa-
sensum stupefaciendo dolorem
propriè mitigent, his nihilominus
vt ægroti viribus consulamus
doloribus confectum mori non
tiamur, vti cogimur. Sed cum
sint admodum frigida calfacie
medicamenti sodalities, quale
vinum, chamæmelum, crocus
storcum, spica nardi, nunquam
uari debent. In sequentem igi-
tatem modum narcoticum medicamen-
tum dolorem leniens & ab omni
bus chirurgis commendatum
faciemus.

℥. fol. hyoschiami albi M. ʒ. i.
coquantur obuoluta stupis m-
factis sub prunis, postea pisten-
& axungia suillæ sine sale mi-
tur adiecto croci momento,
enim medicamentum doloris vi-
mentiam retundit & pus mo-
pus enim mouentia duorum
generum, alia modicè calida &
mida, tenacem consistentiam
bentia per se, alia frigida stup-

Liber primus , Cap. I X. 55

inducentia & affectæ partis calorem retundentia, per accidens pugnunt : quod sanè ab Arnaldo Villanouano fuit diligenter obseruatum : ait enim lactucam coctam & parti tumore præter naturam calido tentatæ superpositam , saniem facere. Cogimur nonnunquam ante humoris perfectam maturitatem scalpello partem phlegmone obsessam scarificare , præsertim cum membro ita impactum & copiosum cernimus , vt oborto iam subnigro colore, periculum considerationis immineat. Scalpello igitur vitiosus sanguis euacuatur , & humoris copia oppressus calor respirationem habet. Lauandæ postea scarificationes aqua salita , & admouendum emplastrum ex farina fabacea , aut eruina cum oxymelite cocta. Hæc omnia fusius capite de gangrenæ curatione trademus.

C A P. X.

Est & parua phlegmone,
nec locum affectum,
causâ quæ illam excita
tam apertè repræsentat, & dicitur
Græci, Latini furunculum app
lant. Qui Arabum sunt vestigia
quiti, aldem enil vel clauum no
nant. Non enim furunculi s
χοιράδαι siue strumæ, vt aliqui fa
existimarunt. Huius duplex
genus statuit Galenus, aliud fur
culorum, aliud varorum. Ex sir
humore, nempe sanguine eimer
& per vniuersum corpus grass
tur, sed aliqui duri, callosi & æ
concoctiles sunt: aliqui infla
mati: in quibus etiam aliquan
febres & graua symptomata co
sistunt, ipseque tumor in magni
dinem excrescit, & in pus transi
tatur. Mitis furunculus in sola
te apparet, peruicax autem n
lignus

lignusque concretis in carne radicibus in superficiem erumpit. Dignosces id cum tactu, tum visu, locum circumquaque & furunculum tractans.

Celsus furunculum tuberculum lib. 3.
ca. 28. acutum esse cum inflammatione & dolore, maximeque ubi iam in pus vertitur, scribit: qui ubi apertus est & exiit, superapparet pars carnis in pus versa, & pars corrupta subalbida, aut subrubra, quam ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum est periculum, etiamsi nulla adhibeatur curatio. Sed dolor efficit ut potior medicina sit quæ maturius liberet. A sanguine crasso, at non admodum calido originem trahit: & cum genito & expresso pure nulla alia curatio necessaria sit, magnum negotium Medico facessere non potest. Solet enim natura à Medico minimè adiuta exiguos morbos vincere, quæ non est medicaminibus infestanda, nisi cum morbo Gal. de
de loc.
affict. nimium atroci dominari nequit.


C 5 Ita

58 *De Tumorib. præter naturam*

*1. primi
fen.*

Itaque in phlegmonoso furunculo, vbi in corpore subest plenus, à venæ sectione, modò mittendi sanguinis præsentés sint satisfatius est ordiri, & vinum modò bibere. Si impurum & cacochymum sit corpus pro noxijs humoris natura catharticum medicamentum propinabimus. Pro topicis remedijs Auicennas triticum à ieiunio homine diligenter masticatum superpositum, furunculos maturum tradidit. Cùm enim hic tumor abscessum sapiat, emollientia concoquentibus & discutientibus profligatur. Maturari solet emulstro diachilonis, mollior efficitur medicamento ex melle cocto sarcocolla confecto. Vuæ pingues quibus acini sunt exempti, curantur le tritæ ac illitæ furunculum cutiunt ac rumpunt. Hoc præstant ficus pingues dissectæ fermentum cum nitro, vel limen cum melle, & in vehemēte dolore, alterci folia trita curant tyro. A futuro furunculo & à

tis aliis morbis à sanguine melan-
cholico excitatis, hamorrhoidum
prouocatio liberat. De exiguis tu-
berculis, cum sint morbi mites,
qui ab ipsa natura facilè vincun-
tur & curantur, sine Medici opera,
hoc loco non differemus. Ad alios
itaque tumores transeundum erit,
à bubone incipiendo.



De Bubone.

C A P. XI.

Bubones, phymata, phyge-
thla, adenum esse inflam-
mationes à Gal. traditum
est. Bubo pro vera phlegmone
vsurpatur, principum partium
emunctoria diuexans, quæ adeni-
bus fluentem humorem facile re-
tinentibus, & propultricem facul-
tatem imbecillam habentibus con-
stant, sunt enim præstantium par-
tium velut cloacæ. Pessimi sunt
qui assiduas febres comites habet:
mites qui ephemeræ. Est enim

2. ad
Glanc.

2. Aph.
Hipp.

60 *De Tumorib. præter naturam*
adenum natura spongiosa,
& pinguis, neque illorum caro
liquo corpori similis, sed sunt fi-
biles, venas multas habentes: æ-
rant sæpe vna cum corpore
quo, interdum proprio morbo
uexantur. Adenes multiplices sunt
quidam in internis corporis par-
tibus, vt mesaræo, & insignium
narum & arteriarum diuisi
veluti stabilimenta quædam
fitti: quidam in externis corp-
partibus, vt sub mento, alis,
guinibus. Glandularum quædam
pilis munitæ, qui ex mediocri
morum in eis redundantia fi-
quædam pilis priuatæ propter
ximam humoris redundantiam
Quæ sanè res ab Hipp. pul-
paradeigmate luculenter fuit
monstrata. Quemadmodum
in terra humidissima atque vi-
nosa nasci minimè possunt, sed
tincta & putrida iacent: ita cor-
sa humiditas ab internis parti-
in aliquas glandulas redundans
los gigni non finit. Bubones qu-

ib. de
gland-
ulis.

venerei à procatarctica causa oriū-
tur, vt ab articulorum vel capitis
vulneribus, scabieue, quorum cura-
tio facilis est. Quidam pestilentiae
tempore grassantur, à venenato
humore scaturientes, pessimaque
symptomata multo carbonibus de-
teriora habentes. Sunt enim ho-
rum carbones asseclæ.



*De Bubonis pestilentis causis,
& indicis.*

C A P. XII.

Quo modo aliquis à peste aut
à pestilenti bubone sibi præ-
cauere possit, docere in præ-
sentia non est nostri instituti, cum
hoc à Galeno & Cornelio Celso, &
Laurentio Iouberto acutissimo
Medico, & Regio Professore, li-
bro de peste exactè sit demonstra-
tum: hic tantum de iis quæ ad chi-
rurgiam pertinent agemus. Pesti-
lenti itaque bubonis causæ sunt
duplices: procatarctica alia, alia
cor

*lib. de
differē-
tiis feb.
1.
lib. 1.
cap. 2.*

62 *De Tumorib. præter naturam*

corporeæ. Externæ sunt, malorum
& venenatorum eduliorum usus,
dauerum aërem inficientium
pia, austrina, pluuiosa & venen
aëris constitutio, corporum aff
tæ purgationes prætermittæ, ast
rum maleficorum concursus, &
rum in hæc inferiora influx
fructuum aquis à mortua & c
rupta Salamandra infectis irriga
rum, vt Theophrasto placet, e

Causæ corporeæ sunt humo
rum venenatorum & corruptorum
ad emunctoria deriuatio, qui a
nolis partibus impacti dolorifi
tumores, febres inclementissimæ
à partium internarum affecti
scaturientes, animi deliquia,
gidos sudores, delitescentes
thraces, deliria, nauseas, vomit
fopores, nigricantem aridam
linguam, sudores olidos, ægr
respirationem, vehementem ca
tis dolorem, nonnunquam
ges vigilias excitant. Pueri a
lescentes, & qui calidum & hu
dum temperamentum nacti su
adu

Liber primus, Cap. XIII. 63
adultis senibus huic morbo sunt
magis obnoxij.



Bubonis pestilentis curatio.

C A P. XIII.

Pestilentis bubonis, venenati
morbi curatio quatuor sco-
pis perficitur. Primus nos
monet, vt tenuem, in frigidantem,
& veneno aduersantem victus ra-
tionem præscribamus. Secundus,
vt humorem quem antecedentem
causam vocant (cū rheumaticus sit
affectus) totius corporis rationem
habentes, reuellamus. Tertius, vt
principibus partibus robur adda-
mus, prohibeamusque ne venena-
tos vapores recipiant. Quartus, vt
topicis congruisque morbo præsi-
diis utamur.

Primò itaque aërem purum &
frigidum deligemus, & iuniperi,
cupressi, pinus fumo siccum redde-
mus: ac thalamum acri aceto in-
spergemus, violis, santalis, nym-
pheæ

64 *De Tumorib. præter naturam,*
phecæ floribus siccandi & refrige-
randi vi præditis ornabimus, ac ali-
mentis modicè alentibus frigida
qualitate præditis, saporemque aci-
dum habentibus corpus nutrie-
mus. Administranda igitur oxalis
aut ipsius succus agrotò, lactuca,
intybus, vel buglossum, & cætera
quæ cordi robur addunt, venena-
tosque vapores profigant. Prisanæ
hordeaceæ vsus salubris, ipsiusque
cremor. A multis quoque lac amy-
gdalinum aqua rosacea & saccharo
mixtum probatur.

9. Nitt. Quod si vires sint deiectæ, à qui-
bus desumendam præcipuam indi-
cationem docet Galenus, iure gal-
linarum, aut caponum, paulò supe-
riùs recensitis herbis alterato, erit
vtendum. Vino interdicendum,
quo si abstinere non possit, album
& oligophorum biber: & quo hic
morbus carbone est acutior, eo
si vires suffecerint, tenuior victus
ratio erit ex vsu. Acidis edulijs ves-
cetur, vt malis punicis, limoni-
bus. Motibus laboriosis & sanguinẽ
cal

Liber primus, Cap. XIII. 65
calfacientibus non erit exercendū
corpus, neque immoderatæ pleni-
tudini indulgendum. Crebra clyst-
matum iniectione emollienda erit
alius, & quemadmodum assiduæ
vigiliæ efficiunt: ita & longus som-
nus. Quare si nimio somno agro-
tum detineri videamus, ipsum stre-
pitu magnisque vociferationibus
excitabimus.

Secundus scopus sic perficitur; si
ægtoti sint validæ vires, & cæte-
ra omnia consentiant, supposito
prius clystere aluum emollien-
te venam tundamus, quæ par-
ti affectæ è directo opposita est,
servandō semper illam rectitudinē,
cujus Hipp. & Gal. meminere. A
nullo præfecto præsidio plus emo-
lumentum consequēris quàm ex ve-
næ sectione ad animi deliquium
vsque facta. Nec hoc loco mea sē-
tentia audiendus est Fallopius, qui
pumice leuioribus rationibus con-
tendit in hoc morbo nullo pacto
secandam esse venam. Quam si vi-
res vel ætas perferre nequeant,
affi

*Contra
Fallo-
piū l. de
tumor.
præter
natu-
ram.*

66 *De Tumorib. prater naturam,*
affigendæ erunt appositæ parti cucurbitulæ cum scarificatione, vel sine ea pro virium ratione.

Porro cùm hic morbus à turgēte succo trahat originem, purgandus erit medicamento aliū subducente, interponendique duo dies à venæ sectione ad catharticum, quod mite sit oportet. Nam cùm ea quæ immodicè purgant, sint calida, huic morbo parum vtilia censentur. In sequentem modum purgatorium medicamentum præscribemus.

℞. rhabar. electi ʒ. j. β. cinamomi ḡ. vij. macerentur in aq. endiuizæ ʒ. iij. facta expressione dissolue medullæ cassiæ à canna nuperrimè extractæ ʒ. vj. syr. rosati solutiui ʒ. j. β. misce, fiat potio : porest & alia sic parari.

℞. pulpæ acidarum balanorum recerium (quas thamarindos Mauritani Medici appellant) ʒ. vj. prunorum dulcium, vuarum passarum à gigartis repurgatarum sing. p. x. trium flor. cordalium com. sing. p. j.

Liber primus, Cap. XIII. 67

p. j. sem. melonum, citri, acetosæ
sing. 3. ij. fiat decoctio. Cape de co-
latura 3. iiij. in quibus dissolue ca-
tholici & triphera perlicæ sing. 3.
ij. Rhab. optimi in aqua buglos.
infusi & diligenter expressi 3. iiij.
cinanomi eadem arte preparati 3.
viij. syr. ros. solut. 3. j. misce, fiat po-
tio. Si adstricta sit aluus etiam post
solutiui medicamenti administra-
tionem, supponetur semel aut
bis in hebdomade sequens clyster.

℥. fol. mal. viol. acanth. parietariae,
fol. lactucæ, altheæ cum radi-
cibus, borrag. sing. M. j. rasuræ cu-
curbitæ recētis lb. 3. 4. sem. frig. ma.
contusor. sing. 3. iiij. prunorum p.
x. flor. nymphaeæ, viol. bugloss. sing.
p. j. fiat decoctio in aqua hordei
perfectè cocti. Cape de colatura lb.
j. 3. in qua dissolue cassiæ cum
saccharo 3. vj. catholici 3. 3. olei
viol. ol. nymphaeæ sing. quart. 3.
mellis viol. 3. ij. misce, fiat clyster.

Tertium scopum sequentibus
præsidiiis exequemur. Habenda pri-
mum cordis præstantis visceris
ratio,

68 *De Tumorib. prater naturam,*
ratio, ac symptomatum hunc affe-
ctum comitantium : & cum hic
morbus sit ex valde acutorum clas-
se , sequentia remedia vsurpanda
erunt.

℞. theriacæ elect. ʒ. iiij. aquæ
scabiosæ ʒ. iiij. misce , fiat potio.
Quod si aëris constitutio sit cali-
da , aqua acetosæ erit salubrior.
Vel sic.

℞. pulueris electuarij beseraici
ʒ. ʒ. pulu. electuarij de bolo ʒ. j.
pulueris diamargarit. frig. ʒ. ij. syr.
de acetos. citri ʒ. j. aquar. acetosæ &
bugloss. sing. ʒ. ij. misce, fiat potio.
Detur matutina hora , vel longo
tempore ante cibum. Vel sic.

℞. cōf. de hiacinto ʒ. j. pulu. dia-
marg. frig. ʒ. ʒ. pul. electuarij de gē.
ʒ. ʒ. syrup. de linonibus ʒ. j. aquarū
endiuiæ & scabiosæ sing. ʒ. ij. misce,
fiat potio : & cum siti. inexhausta
premuntur vti debent sequentibus
remediis.

℞. conser. rad. buglossæ ʒ. j. ʒ.
conseruæ acetosæ & florum nym-
pheæ sing. ʒ. vj. pulueris diamarg.
ʒ. iiij.

Liber primus, Cap. XIII. 69

℞. iij. seminis citri minutatim incisi ℥. β. coralli rub. ℞. ij. rad. tormentillæ & rasuræ eboris sing. ℞. j. sac. ros. tabul. q. s. fiat conditum auro coopertum, vtatur cum aqua hordei perfectè cocti sitis tempore. Vel sic.

℞. syr. viol. & acetosi simp. an. ℥. iij. vtatur cum aqua cocta aut ptisana. Cumque ardentis febris ratione lingua sit arida & nigricans, præscribendum erit remedium sequens.

℞. sem. psyllij integri ℥. iij. sem. cidoniorum ℥. j. β. gummi tragacanthæ ℞. iij. sacchari candi ℥. ij. misce, & in sindone rubra vel panno lineo raro fiant formulæ lupinares, mittantur in aquam rosaceam, teneat sæpe vnā super linguam. Vel sic.

℞. muccag. sem. psyllij & cidoniorum cum aqua ros. factæ sing. ℥. iij. sacch. candi puluerati ℥. ij. teneat sæpe in ore. Nonnunquam ægrotum acerbo capitis dolore molestari contingit, quem sequenti

70 De Tumorib. præter naturam,
quenti remedio lenies.

℞. lactis mulieris filiā enixā ʒ. ij.
olei rosati omphacini ʒ. iiij. aceti
fortis ʒ. j. misce, diu mista agitetur,
linantur bregmatis ossium partes
cum temporibus. Mammæ sinistræ
ad cordis robur instaurandum, ve-
nenatosque vapores repellendum,
quod sequitur præsidium admoue-
bimus.

℞. florum cordial. flor. cœnanthes
p. j. omnium santalorum an. ʒ. iiij.
pulu. elect. diamarg. frig. ʒ. j. β. pul.
coralli rub. & pulu. elect. de bo-
lo an. ʒ. j. granorum tinctor. sem.
ocimi gariophyllati an. ʒ. j. tro-
chiscorum decaphura ʒ. xv. vini al-
albi generosi quar. β. Aquar. scabio-
sæ, acetosæ & endiuæ sing. ʒ. v.
fiat Epithema; excipiaturo panno ex
puluere granorum tinctorum vel
alchermes infecto, expressus parti
supra recensitæ applicetur, alium
cum hic frigere cæperit calidum
admoueto. Vel sic.

℞. coralli rub. ʒ. j. santali albi &
rub. sing. ʒ. iiij. corticis citri sicci ʒ.
j. β.

Liber primus, Cap. XIII. 71

j. β. florum viol. bugl. nymph. ros.
rub. sing. p. j. fragmentorū lapidum
pretiosorum, margaritarum splen-
didarum sing. 3. β. puluerentur vt
artis est, & in sindone rubra fiat
sacculus acu interpunctus, ad in-
star nebulæ saccharatæ, qui cordis
regioni admoueat, & aduentan-
tibus sudoribus tollatur die præ-
fertim critico.

Quartus scopus nos monet, vt
buboni topica præsidia appona-
mus, quæ repellentia nequaquam
esse debent, verum maximè attra-
hentia: ob quam causam plerique
cucurbitulas tumori affigunt ma-
gno igne præditas. Vt autem ad
externas partes humorem euoce-
mus, commodè sequens empla-
strum vsurpabimus.

℥. bdellij, galbani, ammo-
niaci sing. 3. j. pulu. iridis flo-
rent. 3. β. olei de lilio quod sufficit
ad malaxandum, fiat emplastrum,
prius gummi in aceto eliquentur.
Vel sic.

℥. æsopi & olei de lilio sing.
3. iij.

72 *De Tumorib. præter naturam.*

℞. iij. vngatur locus bubone infectatus: admoueto postea lanam succidam. Vel sic.

℞. diachilonis minoris ireati, vel si attrahere magis volueris, diachylonis magni gummati ℞. iij. malaxentur cum oleo de lilio, aut keirimo, fiat emplastrum.

Quod si horum medicamento-
rum usu malignus ac peruicax
humor non digeratur, maturandus
erit medicamenti ad id dicatis, ta-
men integra maturatio; ob loci
tum imbecillitatem, tum rarita-
tem, non erit expectanda. Sequens
tunc præscribemus medicamen-
tum.

℞. cēpas albas duas numero,
coquantur sub prunis, caricarum
pinguium elixarum numero viij.
diligenter pistentur simul, fermen-
ti acris ℞. vj. butyri sine sale ℞. iij,
olei de lilio ℞. iij. misce, fiat cata-
plasma. Vel sic.

℞. maluarum, bisinal. cum suis
radicibus, viol. sing. M. j. rad. lilior.
mundatarum ℞. iij. caricarum
pinguium

Liber primus, Cap. XIII. 73

pinguium p. vj. flor. chamæmel. & sambuci sing. p. j. facta decoctione necessaria, pistentur diligenter & per cribrum medicum transfundantur. Misce postea axungia porci sine sale, vel adipis vitulini, præsertim si humor coctioni contumax extiterit, farinae seminis lini, frumenti & hordei sing. ℥. iiij. olei sesamini & amygdalarum dulcium sing. ℥. iiij. fiat cataplasma.


Maturato iam humore decliuior bubonis sedes aperienda erit cauterio, aut pyrotico medicamento, natura hoc præstare nequeunt. Procurandus postea escharæ casus tetrapharmaco, butyro, vel ex ouorum luteis & oleo rosaceo parato medicamento. Vsurpanda postea erunt detergentia colletica, & cardiacorum medicamentorum in omnibus morbi temporibus, vt cap. de carbunculo dicemus, vsus minimè erit negligendus.

Buboni etiam pestilenti maximè conferre dicitur Aster atticus (quæ multi bubonium aut inguinariam

D vocant)

74 *De Tumorib. prater naturam,*
vocant) cuius non solum vnctio,
sed contactus bubonas curare di-
citur. Remedia buboni pestilenti
mox affatim exhibenda sunt, quo-
niam morbus magno periculo non
vacat: in talibus enim morbis cura-
tionem differre malum est.

*Hip. I.
Aphor.*



*De Carbunculo, quem Græci ἀν-
δρῆα vocant.*

C A P. X I V.

CUM vnus, vel plures carbo-
nes bubonum sint fidi co-
mites, & iisdem fermè præfidiis
profligentur, non erit à nostro in-
stituto alienum, vt priùs de eo
disseramus, tradituri mox causas,
indicia & curationem bubonis ve-
neri, qui Hispanum morbum tan-
quam coryphæus & antesignanus
nonnunquam præcedit. Est carbun-
culus, vlcerosus tumor initio exi-
guus, sed postea ob humoris ca-
coëthiam & deleteriam qualita-
tem magnus (vt de incipiente
cancro

Liber primus, Cap. XIV. 75

canro scriptum reliquit Gal.) ab
effervescente putrefacto & retor-
rido sanguine ortus, vlcus celeriter
& escharam faciens, cum forti cir-
cumstantis particulæ inflamma-
tione.

Duplicem carbunculum statuit
Galenus. Vnus fit cum sanguis ad-
modum feruidus & proprij tempe-
ramenti limites prætergressus reso-
lutis à flammeo calore humoris te-
nuioribus partibus, crassam substā-
tiam adeptus, in quamcumque cor-
poris partem (quia nullam corporis
sedem sibi determinat) fluxerit, eam
igniti ferri modo exurit, crusto-
sumque vlcus cum alta escharam
efficit. Quo enim corpus aliquod
calidissimum crassius est, eo suo
contactu membri partes validius
afficit. Hoc facile videre possu-
mus in escharoticis & pyroticis me-
dicamentis, quæ quò crassiora sunt,
eò vehementiùs vrunt, altiore
escharam facientia. Quod fuit à
Galeno disertè variis locis osten-
sum. Cum vlcere semper carbun-

*lib. 14.
Meth.*

*li. 5. de
facult.
simp.
med.*

76 *De Tumorib. præter naturam,*
culus inuadit : partes , vt iam di-
ximus , circumstantes ab humoris
tum caliditate , tum crassitie , in
tumorem & feruentem inflam-
mationem attolluntur , simulque
ob intemperiem & solutam vni-
tatem grauissimo dolore conflictan-
tur.

cap. de
Antra.
doct. 2.
irac. 2. Hic affectus carbo Latinis, Græ-
cis ἀνθράξ dicitur, non quod antrū,
vt voluit Guido Cauliacensis, hoc
est, cor petat, sed quod carbonis
more (qui terra est accensa) vrat,
qui etiam carbunculum & anthra-
cem differre scribens, fœdissimè
lapsus est Græcarum literarum
inſcius. Auicennas Althoin, siue
carmata patrio idiomate vo-
cavit.

Est & alter carbo à sanguine ni-
gro ; fœculento , feruido, vt prior,
sed ichori tenui permixto ſcatu-
riens: qui ad cutem protrusus bul-
lulas granis milij ſimiles , & his
quæ ab ignis calore fiunt , excitat.
At vbi ruptæ ſunt , cruſtoſum vl-
cus relinquunt. Interdum hic car-
bo

bo sine pustula, sed cum pruritu
apparet: ob quem laborantes par-
tem ita scabunt, vt orta ac rupta
pustula, vlcus cum crusta rema-
neat. Sæpe citra pustulæ ortum cu-
tis excoriatur, vt contingit car-
bunculis qui per Asiam sunt graf-
sari. Id omnibus commune est vi-
tium, vt crustosum vlcus appa-
reat, crusta ipsa modo cineritium,
modo nigrum colorem præ se fe-
rente. Quibus circumposita caro
in summam peruenit inflammatio-
nem, ij necessariò nec sine periculo
febriunt.

Est & carbonis significatum tri-
plex. Aliquando dothienem siue fu-
runculum (quem Mauritanus Rha-
ses carbonē vocat) nobis significat,
qui etiam à parum inflammato sã-
guine oritur. Aliquando pro vitii
ac arborum vitio à carbonis vredi-
ne, hoc est, magno æstu procreato
vsurpatur: aut glareosæ & squalidæ
terræ morbus est tritico rubiginem
inducens; hanc enim terram tunc
carbunculo tentari dicimus, vt à ^{lib. 26.} _{cap. 1.}

78 *De Tumorib. præter naturam,*
Plinio solerti naturalis historiæ in-
dagatore fuit doctè demonstratum.
Interdum inflammationem vehe-
mentem graui dolore membrum
distorquentem à sanguine putri &
retorrido profectâ carbo indicat, de
quo adhuc futurus est nobis sermo.



De Carbunculi causis.

C A P. XV.

Carbunculi causas duplices
statuimus, procatarticas
alias, alias corporeas, putriū
eduliorum, ac fructuum stataria,
cœnosa & corrupta aqua irrigato-
rum vsus frequens, regionis pesti-
lennis habitatio, aëris calida & hu-
mida constitutio, austrinæ pluuiæ
longæ & multæ, ea etiam tem-
poris conditio, qualem in Crano-
ne aliquando fuisse scripsit Hippo-
crates, perseuerans: vellerum ouiu
morbosarum ac reiiularum mor-
bo (quem nostræ oræ pastores ac
rustici la Marrana vocant) labo-
rantium

2. Epi.
cap. 1.

Liber primus, Cap. XV. 79

rantium frequens contactus, causæ procatarticæ habentur. Quo fit ut nemo mirari debeat, si crebrò in laniorū familiis nascantur carbones. Calida & meridionalis plaga gignēdi carbunculis est aptissima, ut Narbenensis. Æstate & Autumno, quàm aliis anni temporibus potius accidunt. Et cùm carbunculi, sicuti & aliorum morborum magna sit latitudo, aliqui enim sunt mites, & non contagiosi à sanguine non admodum feruido dependentes: alij magno periculo non vacantes, à sanguine admodū calido ac putrescente orti, ob putredinem, & efferuescentiam, vel cacoethiam deleteriam qualitatem adipiscuntur, qui pestilenti tempore grassantur, & pestilentium febriū venenatorumque bubonum sunt germina: talem humorem corpoream causam & antecedentem esse iure optimo dicemus. Atrabilarius humor à feruore & putredine sanguinis genitus, corporis parti impactus, causa est continens.

80 De Tumorib. præter naturam,

Acta
bi.ii
triplex.

Triples Gal. statuitur atræ bilis differentia. Prima fit cum aliis humoribus, quæ cum sit naturalis humor, alendis partibus melancholicis est idonea. Hanc melancholicum succum vinariæ faci similem aptius vocabimus, qui dum in aliquam partem corporis effluxit, scirrhum legitimum parit, ut quarto libro præsentis operis exactius demonstrabimus.

Secunda, quando naturalis melancholia diutius in calido loco coacta adurit, & in atram bilem naturæ capitalem hostem transit. Ex qua, si non admodum magna sit visio, cancri sicci siue absconditi fiunt. Si adustione acrimoniam quandam is humor contraxerit, cancri humidi & subiectam carnem erodentes excitantur.

Tertia omnium est perniciosissima, quæ ex bile flava maximè refoverida gignitur: quæ in terram projecta, acris aceti modo fermentat atque ebullit. Hanc muscæ, vermes, & quæ infecta vivunt, odorant

runt

Liber primus , Cap. XV. 81

runt ac fugiunt. Cancro vlcerato
& pernicioso anſam ſuggerit.

Doct̃or quidam Pariſienſis, vir
quorundam iudicio doct̃us, & de
re medica bene meritus, exiſtimans
ex duabus vltimis atræ bilis diffe-
rentiis carbunculos oriri, fœdiſſi-
mè lapſus eſt, quem Galeni lib.
de atra bile, & libro de tumori-
bus præter naturam non accuratè
adnimaduërſa autoritas ſefellit.
Ait enim Galenus ab atrabilario
ſucco carbūculum manare. Verùm
is oblitus eſt alterius Gal. loci, quē
in ſequentem modum nobis ſcri-
ptum reliquit; Vt à flaua bile fit
Eryſipelas: ita à ſeruido & retor-
rido ſanguine in atrabilarium hu-
morem verſo fit carbo: quod lib.
artis curatiuæ ad Glauconem 2. 2. lib.
confirmauit.

Cauſa igitur corporea & antece-
dens eſt putrens & retorridus ſan-
guis, qui tamenſi ob vſtionem atræ
bilis imaginem induat, non ob hoc
omnino ſanguinis naturam exuit.
Nam ſinia (vt eſt in peruulgata

D 5 illa

Liber primus, Cap. XVII. 83
initia parua, & ciceris magnitudi-
nem non superans, præceps huius
incrementum cum partis oneroso
pōdere, ac magna grauitate, naufea,
animi deliquiū, deiecta appetentia
cū cordis tremore, vrgente fomno.
Nonnumquam vesicis est munitus,
quæ ruptæ escharam relinquunt:
frequētiores sunt pestilentiaē tem-
pore. Reliquæ notæ ex his quæ su-
perius tradita sunt, perspicuæ eua-
dunt.



De Carbunculi curatione.

C A P. XVII.

Carbunculi curatio magnum
habet commerciū cum bu-
bonis pestilentis curatione,
quæ quatuor obseruatis scopis per-
ficitur. Primus consistit in debito
sex rerum naturalium vsu. Secun-
dus in humoris fluentis reuulsione
& euacuatione. Tertius in illorum
remediorum administratione, quæ
visceribus præcipuis robur addere

84 *De Tumorib. præter naturam,*
solent. Quartus in topicorum præ-
sidiorum dextra applicatione. *in*
Quomodo primum, secundum
ac tertium scopum absoluamus, su-
periori capite fuit traditum. Ab-
stinere certè à cibo & vino consul-
tis priùs viribus oportet, & quàm
parcissimè bibere expedit, præfer-
tim si ex malignorum ordine ex-
titerit, nam tunc comitem habet
febrem.

Ad quartum scopum properan-
tes, necessum est vt topicorum
præsidiorum vsuin sine aliqua cun-
ctatione adhibeamus. Quapropter
post sanguinis missionem vsque ad
animi deliquium, si nihil prohi-
beat, altis sectionibus scarificandus
erit locus carbone tentatus, vt san-
guis ater ipsum inficiens euacue-
tur; neque sunt restringentia &
apocroustica admonenda, ex quo-
rum vsu maius dispendium quàm
utilitas sequeretur. Non tamen est
negligenda in affectam sedem flu-
xio, quæ inflammationem, dolo-
rem, & reliqua symptomata auget.

Ob

Liber primus, Cap. XVII. 85

Ob hoc excogitandum erit aliquod præfidium, quod cum repulsiōe moderata digerendi viū habeat. Vsurpabimus igitur cataplasma illud à Gal. traditum, de arnoglossa appellatum, quod è plantagine, sincomisto siue mensario pane & lente conficitur ad saturitatem coctis. Huic emplastro Aui-cennas gallas adiecit. Pancem neque admodum furfuraceum, neque siligineum & ex defæcatissima farina paratum esse oportet. Hoc autem nõ supra carbunculum ipsum, sed in ambitu est apponendum. Candens autem ferrum, vel pyroticum medicamentum scarificatæ pustulæ, tum ad exterendam escharam, tum etiam ad venenatum & in profunda parte latentem humorem foras euocandum, adigendum erit. Itaque super vlcus, & non circumstantes partes, ne illas imprudenter, & sine vlla necessitate vlcereus, imponendus erit pastillus Andronis, Polyidæ, Bithini, Pasconis aut Musæ, vino dulci

14. Me-
ito.

86 *De Tumorib. prater naturam,*
dulci vsque ad crassitiem aut mel-
lis consistentiam dilutus.

Horum vsus non solum carbun-
culorum crustas cadere facit, sed
affectum locum cum sit adstrictio-
nis particeps, sine fluore conseruat.
Illorum pastillorum loco commo-
dè utemur trochiscis Iohannis Vi-
gonij, quos capitellum vocant:
quibus ad meliorem citatioremque
operationem momentum subli-
mati plerique miscent. Qui Ara-
bum & classicorum Chirurgorum
vestigia sequuntur, ex duobus ma-
lis punicis, acido & dulci, repellen-
te simul & digerente facultate præ-
ditum emplastrum admovent, suc-
cessu non infœlici, aliqui ex solo
acido illud parant.

Reliquas rubore tentatas partes
vnguento de bolo (quod defensi-
uum vocant) illinunt: quod medi-
camenti genus, quamuis pestilen-
ti morbo & venenis utilis sit bo-
lus, probare non possum. Nam cum
sit frigidum, & emplasticum me-
dicamentum digerente facultate
pri

Liber primus, Cap. XV III. 87

priuatum , vitiosum ac venenosum humorem ad interna viscera protrudit : ad quæ propter illius deleteriam qualitatem, nullo modo est reuocandus. Escharam tetrapharmaco , butyro , vel medicamento ex ouorum luteis & oleo rosato confecto detrahemus. Sordidum postea vlcus detergemus, & detersum colleticis agglutinabimus. Auicennas, cuius Cauliacensis Guido est vestigia sequutus, emplastro ex caricis & fermento , carbunculum non admodum malignum maturat, & post escharæ casum, sordidum vlcus vnguento Ægyptiaco, vel viridi detergit : aliorum denique vlcenum more agglutinat.



De Bubone venereo.

C A P. XVIII.

Solent nonnunquam bubones ex intempestiuo lue Hispanica infectorum concubitu gigni , qui inguina, hepatis & lie

nam tundamus, tantamque sanguinis copiam mittamus, quantam laborantis vires ferre poterunt. Quod si corpus cacochymicum extiterit, propinandum erit euacuans medicamentum pro noxij humoris natura, neque aspernanda sunt remedia quæ curando Hispanico morbo sunt accommodata, cum soleat hic tumor talem morbum, tanquam coryphæus quidam præcedere.

Tertius sequentibus remediis absoluetur. Non sunt huius affectus initio apponenda repellentia, sed potius attrahentia: imitandusque est naturæ motus. Si verò tumor ad incrementum piger videatur, affigendæ sunt buboni cucurbitulæ magnæ, vtendumque diaphoreticis, impactumque parti humorem discutientibus. Ex usu itaque sequens emplastrum erit: prius tamen meminisse oportet veterum decreti, ne inguinibus vel adenosia aliis locis emplastra admoveamus duram consistentiam habentia, quin
prius

90 *De Tumorib. præter naturam,*
prius discutiente & emolliente
oleo (quale est fufinum) emollita
fuerint. Duræ enim medicamenta,
vt fuit fuperius demonftratum, has
partes diftendunt, & rursus inflam-
mationem irritant.

℞. Maſſæ emplaſtri diachylonis
ireati ℥.iiij. terebinth. ℥.j. olei de li-
lio q. s. fiat emplaſtrum molle.
Vel fic.


℞. Diachylonis magni gumma-
ti ℥.iiij. malaxetur oleo irino, fiat
emplaſtrum molle. Vel fic.

℞. Bdellij ſcythici (quod omni-
bus affectibus quibus confert am-
moniacum thimiama vtile eſt, au-
tore Celſo) opopanacis, galbani in
acri aceto eliquatorum ſing. ℥. ij.
terebinth. q. s. florum chamæmeli,
ſambuci, anethi ſing. ℥. ij. pulueris
iris florentiæ ℥. ſ. olei de lilio,
vel chamæm. quod ſatis eſt ad ma-
laxandum, fiat magdaleon, forme-
tur emplaſtrum magnitudinis de-
bitæ.

Si bubonis materia horum me-
dicamentorum vſu non digeratur,
ad

ad pus mouentia medicamenta transeundum erit, quorum superius meminimus. Danda tamen est opera ne digerentia medicamina sint impense calida, talia certè tenuiorem humoris partem discuterent, fœculentiori remanente, quæ scirrhum procrearet. Neque pus mouentia admodum humida esse debent, quippe quæ affectam partem putredini ac corruptioni subditam efficerent. Vbi iam maturuit humor, ferro frigido, aut rutilante, causticoue medicamento aperendus erit locus tumoris decliuior. Curandum postea erit vlcus collecticis & epuloticis remediis, de quibus libris de vlceribus agemus. Si ex digerentium medicaminum vsu intempestiuo obduruerit tumor, medicamenta propellendo scirrhus necessaria vsurpabimus, de quibus suo loco differemus.

De

*De Phymate & Phygethlo.*

C A P. X X.

Postquam de bubone dictum est, de phymate & phygethlo affectibus buboni non admodum dissimilibus est discernendum. Est phyma adenum phlegmone quæ celeriter & adaugetur, & ad suppurationem venit, & à phymo plurimum differt. Est enim phymus glandis aut præputij affectus. Huius duò sunt discrimina, speciatim scilicet & generatim sumitur. Phymatis tracta est ab his quæ in terra celeriter nascuntur & crescunt, metaphora. Generatim consideratum, alias ab adenibus partes distorquere solet, quod fecit manifestum Hippocrates dicens; Quibuscunque in vrinario meatu phymata nascuntur, his suppuratione facta & eruptione morbi solutio fit. Phyma tuberculum est dothieni simile, sed planius & rotundum

lib. 7.

cap. 57.

tundius, sæpe etiam maius. Nam furunculus oui dimidij magnitudinem rarò explet, sed nunquam excedit. Phyma latius patere consuevit, sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Id in pueris sæpius nascitur, & facilius curatur: in iuuenibus rariùs, ægriùsque sanatur: in senibus ne sanatur quidẽ.

Phygethlon tumor est non altus, sed latus, phlegmone erysipelato-des, aut phlegmonodes erysipelas dicitur, ac in alis aut inguinibus excitatur. Panum ad figuræ similitudinem plerique vocant. Pantum vsurpauit Varro pro fli glomere, ad cuius similitudinem panes ipsi finguntur: & quemadmodum ex pano lanificium in multas figuras digeritur: ita panus varias capit imagines: paniam saturitatẽ Athenæus vocauit. Panus etiam textricum, nomen dedit tuberculo, quod Græci Phygethlon vocant. Phygethlon Guido Cauliacensis fugile appellauit, atque hic in tumorum à pituita ortorum catalogum falsò reposuit.


De

*Ca. de
apofte.
phleg-
masi-
cis.*

De Phymatis ac Phygethli causis.

C A P. XXI.

Phymatis & phygethli causa, alia corporea, alia prægressa. Defluxio in glandulosum genus causa est corporea: quam plethora vel cacochymia parit: nonnunquam à visceris inflammationibus procedunt. Defluens in glandulam sanguis, causa est corporea. Phygethlon mixtus est affectus ex phlegmone scilicet & erysipellate. A sanguine igitur & bile dependet. Alia causa quæ hos humores ad fluxionem disponunt, procatarctica censentur.

*De Phymatis & Phygethli curatione.*

C A P. XXII.

Phymatis & phygethli curationo triplici intentione perficitur. Prima in proba victus ratione sita est. De qua hic, cum fuisset

Liber primus, Cap. XXII. 95

fufiffimè capite de phlegmone & bubone difputauerimus, nihil breuitatis ftudiofi agemus. Secunda in fanguinis miffione concurrentibus mittendi fanguinis fcopis confiftit. Tertia in difcutientium medicamentorum vfu : nam repellentibus omnino eft parcendum. Ob humoris digeftionem plerique adianthum contufum & admotum phyma difcutere fcripfere, vel atriplicem fic præparatam. Alij altheæ radicem in vino decoctam contundunt, & cataplafmatis vice vtuntur. Vbi hæc prodeffe non poterunt, fequens præfidium vfurpandum erit.

℞. faponis nigri, adipis fuilli, picis, ceræ fing. partes æquales, olei antiqui, olei irini an. q. s. diluere oportet fapõnem lixiuio, ceram antiquo oleo, & omnia probè mixta ad cerati confiftentiam reducantur. Vel fic.

℞. ladani puriffimi bdellij fing. ʒ. j. ſ. ammoniaci, therebintina fing. ʒ. j. propoleos, olei antiqui fing.

96 De Tumorib. prater naturam,
sing. q. s. addendo aceti parum, fiat
emplastrum molle. Quod si præ-
cedentibus remediis discuti non
possit tumor, vt in abscessum ver-
ratur congruum erit sequens reme-
dium.

℞. farinæ lupinorum q. s. radi-
cum capparum in aceto coctarum
& diligenter contusarum ℥. j. salis
nitri quart. j. fermenti acris ℥. vj.
Caricarum pinguium elixarum pa.
iiij. olei de lilio vel amygdalarum
dulcium an. ℥. iiij. fiat cataplasma,
cui capas duas addemus si humo-
rem suppurationi pertinacem con-
spicimus.

Post suppurationem aperiendus
erit tumor, & ylcus agglutinan-
dum, vt fuit superius dictum. Erit
ab istis medicamentis abstinendū,
si tumori vehemens copulatus sit
dolor: sequendumque Galeni con-
siliū quo monemur vt locū af-
fectum oleo communi & calido,
œsipo aut lanæ hapsō foueamus:
hæc enim chalaistica sunt, & dolo-
rem compescentia. Si in tantam
phyma

2. ad
Glas.

phyma magnitudinem attollatur, vt glandulas maximè distendat, dolentem locum post corporis euacuationem scarificabimus: adhibebimus postea ea remedia quæ factis iam sectionibus conueniunt. Phytheli verò curatio, cum mixtus sit ex inflammatione & erysipelate morbus, ex his quæ de phlegmones curatione sunt prodita, & quæ de erysipelate secundo libro dicentur, innotescet. Erunt augenda, vel minuenda alterutrius remedia, pro superantis in mixtura humoris ratione.



De Gangrana & Sphacelo.

C A P. XXIII.

Phlegmone magna, vel carbō cum neque digeri, neque in pus mutari potest, sæpe in gangranam, & Græcis appellatam *ῥέγρον*, hoc est, syderationem, vel partis mortem, incidit, de qua hic differere statuimus. Est gangrana

98 *De Tumorib. prater naturam,*
græna partis mutatio à naturali ha-
bitu in alienum cum vlceratione,
& natiui caloris extinctione, cui
nisi celeriter occurratur *νεκρωτική πα-*
θήκη *Γάγγραινα*, quod est læsum faci-
lè emoritur.

Ab sphacelo, quem cum Auicen-
na Guido Cauliacensis corrupta
atque ignota nomenclatura sca-
chylon vocauit, differt: quia in
gangræna inflammatio sua magni-
tudine mortem in membro pro-
creat, quæ tamen nondum sit in-
tegrè facta & confirmata. Quod si
perseuerante malo, eius vis & ty-
rannis tanta sit, vt affecta pars mor-
tis imaginem repræsentet, ac mo-
tus sit expertus, & cum secatur aut
aduritur non sentiat, & nigrescat,
tunc hanc non gangræna, sed spha-
celo tentari existimandum est.

Est itaque gangræna partis fiens
mortificatio: sphacelus verò iam
facta & deplorata. Guido cum Aui-
cenna corruptionem ad continuas
partes transeuntem, esthiomenon
vocauit, quo nomine in aliis mor-
bis

Liber primus, Cap. XXIV. 99

bis Græci vtuntur, vt in herpete
esthiomeno & phagædena. Soler,
Aëtio autore, sphacelos ad ossa *lib. 24.*
serpere, corrupta ea quæ hæc tegit, *ca. 57.*
carne, tetros ichores emittente, ac
corruptis quæ per carnem sunt di-
spersa vasis. At gangræna solam
carnem occupat. Gangrænam vel
sphacelum rudis plebecula ignem
D. Anthonij aut Martialis vocat.
Galenus vt Hippocratem ab omni
calumnia liberaret, Com. in 50.
Aph. sect. 7. visus est sphacelum
cum gangræna confudisse.

Duplicem sphacelum constitue-
mus, incipientem scilicet & factum.
Incipientem curari posse Hippo-
cratis & Herodoti testimonio
ostenditur: sed factum hominem
enecare; vel Medicum ad resectio-
nem mortuæ partis adigere.

De Gangræna & Sphaceli causis
& indiciis.

C A P. XXIV.

Gangræna causæ procatartici-
cæ sunt vincula arctissima,

E 2 in

100 *De Tumorib. præter naturam,*
iniecta membrīs, venis & arteriis
inſignibus munitis: ob quæ partis
temperamentum & horum natiuus
calor nequeuntibus ſpiritibus ad
illam deſluere, perit. Medicamenta
inſuper venenofa, calida aut fri-
gida. Calida, quia vehementi ſua
caliditate harmoniam qualitatum
partis corrumpunt, vt Euphor-
bium, lepus marinus. Hoc ipſum
præſtare poſſunt frigida, vt alter-
cum, opium, mandragora, & ea
omnia quæ abſolutè venena di-
cuntur.

Externum & vehemens frigus
huic etiam morbo cauſam præbet,
quod his qui per loca frigidiffima,
glacie & niuib. obruta incedunt,
accidere videmus, quorum artus
putreſcunt & emoriuntur. A vehe-
menti enim frigore ita obſtruun-
tur meatus, inſrigidatur cum ſan-
guine calor, & naturale mem-
bri temperamentum euertitur, vt
ſpiritus partes illuſtrare non poſ-
ſint.

Cauſæ corporeæ ſunt, anthra-
ces,

ces , venenatæ pustulæ , magna phlegmone , ita ob humoris copiâ venas & arterias , & carnis poros replens atque distendens , vt ipsæ arteriæ ob angustiam sese attollere nequeant. Hoc ipsum etiam fit quando sanguis crassus meatus sic obstruit , vt perspirationem natiuo calori præpediat , & fuliginosa recrementa retineat. Gangræna tantæ prauitatis est , vt nisi , omni morâ procul pulsa , præsentissimum feratur præsidium , laborans particula citò moriatur , & tunc in sphacelum transeat.

Incipientem gangrænam , Celso lib. 5.
ca. 26.
& 33.
7. lib. teste , curare non est difficile , præsertim si integri adhuc sint musculi & nerui leuiter affecti : sed periculo maximo non vacat , quando iam in sphacelum migrarit.

Notæ gangrænæ demonstratiuæ sunt , partis ad quandam nigredinē vergens rubor , dolor inclementissimus , subditæ carnis mollities , cū cadaueroso fœtore , in quam si digitum impingas , fossam remanere

Liber primus, Cap. XXV. 103

que, portulaca, oxalis, mala punica
acida etiam salubria iudicantur.
Viao constantibus viribus interdi-
cendum: debilioribus factis dan-
dum oligophoron, tenue, & bene
dilutem. Gallinarum, pullorum,
aut caponum iuribus vtendum, qui-
bus horraginem, buglossum, oxali-
dem lactucamue incoques. Cappa-
res non salitæ cum oxelæo in pri-
mis mensis mansæ, non solum in
gangræna, sed in omni pestilenti
affectu probantur.

Secundus scopus, corpus eua-
cuandum esse sanguinis missione
docet. Quod fit, vt præsetibus mit-
tendi sanguinis scopis antispasticam
venæ sectione exerceamus: vel cu-
curbitulas opposito loco affiga-
mus, supposito prius aluum emol-
liente clysmate. Medicata etiã po-
tio ad biliosi & melancholici succi
euacuationem post sectam venam,
non erit contemnenda, quam ex
sequentibus parabis.

℥. medullæ cassiæ fist. à canna nu-
perrimè extractæ ʒ. ss. catholici ʒ.

E 4 vj.

104 *De Tumorib. prater naturam,*
vj. cum aqua bugl. fiat potio. Vel sc.

℞. rab. electi ʒ. j. β. cinamomi interioris ḡ. viij. macerentur in fero caprino per noctem, & facti de mane forti expressione dissolue. syr. ros. solut. ʒ. j. β. aquarum buglos. & oxalidis an. ʒ. ij. fiat potio in aurora danda.

Et quia ab efferuescente sanguine vapores multi non mirus quàm à venenato anthrace ad cor deferuntur, roborandū erit theriaces administratione, ac epithematum appositione, vsurpandaque erunt ea remedia quæ capite de bubonis pestilentis curatione vtilia esse statuimus. Sequenti præsidio cordi robur addemus, venenatosque vapores propulsabimus.

℞. confervæ ros. & rad. buglossi sing. ʒ. j. β. conferv. oxalidis, florū cichorij sing. ʒ. j. corticis citri saccharo conditi ʒ. iij. pulueris elect. bese-raici, de bolo, & diamarg. frig. an. ʒ. ij. myrobalanorum emblicarū saccharo conditarum vnam numero, pulueris elect. de gē. & coralli rub. an.

Liber primus, Cap. XXV. 105
an. ℥. j. syr. ex succo citri, vel limoni
quod satis est ad incorporandum.
Fiat in modum opiatae: capiat ad
quantitatem vnius nucis comesti-
bilis duabus horis ante prandium:
forbendo postea cochlearia duo se-
quentium aquarum.

℞. aq. scabiosae, buglossi & oxa-
lidis sing. ℥. viij. Misce.

Tertius scopus topicorum præ-
sidiorum vsu perficitur. Si enim vi-
deamus floridum colorem in liui-
dum mutari, vehementique inflam-
matione partem tentari, vsurpandū
erit Auicennae præsidium, quod re-
cipit boli armenici terrae sigillatae
sing. ℥. j. s. aceti q. s. ad incorporan-
dum, fiat ad instar linimenti, quod
in gangraenae ambitu non supra lo-
cum admovebimus.

Verum creber maximè infrigi-
dantium medicamentorum vsus
est suspectus. Nam hæc meatus ob-
struendo spirituum transitum præ-
pediunt, & naturalem partis calo-
rem corrumpunt. Loco autem gā-
græna tentato faciendæ sunt plagæ

E s multa,

106 *De Tumorib. præter naturam,*
multæ, altæ iuxta minutissimarum
venarum diuarcationem: vt san-
guis crassus perspiratione egens
euacuetur. Plagis admovebimus
hirudines famelicas, quo melius
venenatum sanguinem attrahant.
Abluenda demum erit aqua marina
falsa, aut lixiuio scarificata pars,
vtendúmque erit sequenti medica-
mêto putridis vlceribus consecra-
to, quod componitur ex lomenti x.
farinæ fabacæ, & farine erui, lolij
æqualibus partibus, syrupo aceto-
so, vel aceto mulso mixtis. Parti
scalpello punctæ strenuè deter-
gentia, exiccantia ac aperientia
medicamenta commoda sunt: ob
hoc ab Auicenna sequens reme-
dium est excogitatum.

℞. salis communis ℥.iiij. farine
fabarum, orobi sing. ℥.viij. mellis ℥.
iij. succi absynthij, & vrticæ sing. ℥.
ij. s. misce, fiat cataplasma. Lauanda
etiam erit pars frequenter aceto ca-
lido, desinēteque sanguinis feruore
Ægyptiaco vnguento erit detergēda
& expurgāda. Perseuerante affectus
malitia

malitia & membri putredine, iam
factis scarificationibus commodè
admouebimus, Andronis, Pasionis,
Musæ, bithyni, Vigonij aut aspho-
delorum pastillum. Arsenici effecta cap. de
giant-
dulce
or E-
fihro-
meno.
plurimum commendauit Caulia-
censis Guido, quo non esse uten-
dum, nisi consultis prius ægrotan-
tis viribus, & illius optimè cōtem-
plato temperamento, suadet. Nam
imbecillum & molle corpus mitia,
durum & validum acriora medi-
camenta perferre potest.


Et cum hæc pyrotica medica-
menta suo calore & operationis
vehementia febrē & dolorem exci-
tent, vt febris ac phlegmones ad-
uentum inhibeamus, humido victu
febrientibus accommodato ægro-
tū triduo alemus, superioribusque
vicerati loci partibus poscā, vel ex
bolo paratū medicamentū, de quo
superius meminimus, apponemus.

Post escharæ casum, Paulus Ægi-
neta emplastrum ex pluribus lactu-
cis, fibris exēptis, & loliacea farina
probat, vetustissimasq; nuces, illa-

108 *De Tumorib. præter naturam,*
rum præsertim cortices tritos hoc
vltus maximè repurgare ait. Te-
trapharmacum Macedonicum Ga-
lenus laudat. Ad escharæ casum
Aëtius cataplasma ex hordei & tri-
tici farina & hydrelæo incocta cō-
sulit. Nicolaus Florentinus (quem
non plagiarium, sed strenuum me-
dicarum sententiarum aggregatorē
vocare volo) hoc medicamentum
extollit, quo vtendum iubet, donec
vltus sit probè detersum, & in se-
quentem modum parat.

℥. vitellorum ouorum recentiu
& crudorū iiij. num. myrrhæ elect.
℥. j. β. farinæ hordei ℥. iij. mellis de-
spumati q. s. ad incorporandum ad
emplastri consistentiam reducan-
tur. Tandem ad colletica & simu-
lotica medicamenta transeundum
erit. Emortua iam & sphacelo la-
borās pars serra secanteue instru-
mento, ne id quod iam putruit
veneni instar suo contactu sanum
& integrum inficiat & corrup-
pat, secanda venit. Obortam à
sectione hæmorrhagiā rutilantibus
ferra

Liber primus, Cap. XXVI. 109
feramentis sistemus: iam à putre-
dine & sordibus priuatum vlcus,
vt suprà ostensum fuit, agglutina-
bimus.



De Ophthalmia.

C A P. XXVI.

AB affecta sede quæ in pro-
patulo est, oculo scilicet, di-
cta est ophthalmia. Est au-
tem inflammatio adnatæ oculi tu-
nicæ, à membrana caluariam te-
gente originem trahentis, quam
Alexander Benedictus in sua ana-
tome fundam appellauit, quia ad
fundæ similitudinem, quæ est retis
instar, exiguarum venarum multi-
plicem distributionem admittit
forinsecus apparens, ligamentum
existit toti oculo, ad ossa circumsi-
ta. Huius per se morbus est, totius
verò oculi per accidens esse dici-
tur.

Ophthalmiam, Lippitudinem
cum Celso, Galeni Interpretes vo-
cant,

110 *De Tumorib. prater naturam,*
cant, quæ à taraxi, id est, oculi per-
turbatione vel vacillatione differt.

Paulus
lib. 3.
ca. 22.

Fit enim taraxia ab externa causa oculum calfaciente, humectante, & ruborem inducente: ut à Sole, fumo, oleo, pulvere & vento. Hæc facile soluitur, ubi causa nobis est perspecta. Lippitudo verò non solum à procatarctica causa, sed ab interna & cæca scaturit. Ab epiphora etiam differt: nam tametsi in epiphora sit rubedo, ea est in ipsis palpebris, quæ tandem à calida & acri fluxione ulcerantur.




De Lippitudinis causis.

C A P. XXVII.


Superiori capite ostensum fuit, multiplices esse ophthalmiæ causas procatarcticas, quibus eas addemus omnes quæ vapore & calido sanguine, eodemque copioso oculos replent, fixos rubrarum rerum intuitus, ac lippitudine laborantis oculi frequentes

Liber primus, Cap. XXVIII. III
quentes conspectus, præsertim
quando plethora corpus molestat.
Humores varij in adnatæ tunicæ
venas delabentes internæ causæ
habentur: quæ frequentius à san-
guine vt vera phlegmone excitantur,
cuius nonnunquam tam magna
copiâ in iam dictam tunicam
fluit, vt maximè exaltata & turgi-
da effecta, quod nigrum in oculo
conspicitur, tegat. Cùm oculi in
capite totius corporis arce sint siti,
ab ipso potiùs quàm alio membro
fluxionem suscipiunt.




De Lippitudinis indicis.

C A P. XXVIII.

 Culi perturbationis indicia,
cùm à prægressæ causæ præ-
sentia dependent, sunt ma-
nifesta: at vehementis lippitudi-
nis causæ internæ sunt, continuus
inuitarum lacrymarû per magnos
canthos defluxus, de quibus cap.
sequenti disseremus, tumor, dolor
vehe

112 *De Tumorib. prater naturam,*
vehemētissimus ob exactum mem-
bri sensum, rubedo adnatæ, & eius
venarum plenitudo, malarum tu-
mor, cum temporum pulsatione, &
anterioris partis capitis dolore.



De Lippitudinis curatione.

C A P. XXIX.

Non est negligenda ophthal-
miæ curatio, eo quod fre-
quenter laborante vno ex
oculis, in alium migrat: quæ vbi
iam altas radices egit in abscessum
versa, & rupta vomica, ac ulcere
cicatrice obducto, fœdas, indelebi-
les, & visum maximè præpedien-
tes maculas relinquit. Hanc itaque
(in mentem priùs quæ de phleg-
mones curatione sunt tradita re-
uocantes) quatuor scopis profliga-
bimus.

Quorum primus ostendit, vt te-
nuem victum administremus, eu-
chyma alimenta ægroto præbea-
mus, & vaporulentorum edulio-
rum

rum usu abſtineamus, obſcuro potius quam luminofi loci habitationem conſulamur, ſomnum prouocemus, ac nigri, viridis, vel carulei coloris intuitum commendemus. Et illum moneamus, vt ab ira, Venere, vehementi oculorum agitatione abſtineat, neque pronum, ſed altum caput teneat.

A ſecundo ſcopo monemur, vt quemadmodum in phlegmone principio, reuulſione & euacuatione, quæ per antiſpaſticam ſanguinis miſſionem fit, vtimur: ita hanc ex cephalica, affecto oculo reſpondente exerceamus, aut purgatorium medicamentum propinemus, ſi à ſanguinis ſodalitio priuato humore ophthalmia excitetur. Scapulis etiam cum ſcalpellatione, vel ſine hac cucurbitulas affigemus, partes externas corporis fune, vel zona vinciemus: vel Galeni dogma ſequuti, arterias temporum ſecabimus modò à parte caluariæ externa in egrorā fluat humor. Quod ſi ophthalmiam præceſſerit cepha
pha

114 *Dè Tumorib. præter naturam,*
phalea, & ea perſeueret; cum ea
cauſæ ſine qua non rationem ha-
beat, erit priùs præſidiis à Galeno
& Mauritano Rhæſe conſcriptis
abigenda.

Pro tertio ſcopo repellentia me-
dicamenta initio erunt uſurpanda:
habet enim ophthalmia, ſicut &
phlegmone, quatuor tempora. Ad-
hibenda itaque ſunt repulſoria
pharmaca, non uehementè adepta
adſtriſtionem, ſed lenientem li-
quorem obtinentia. Hoc autem
agere debemus, tum propter excel-
lentem membri mollitiem, tum
ſenſus ſubtilitatem, & ſubſtantię
raritatem. Ea de cauſa excogitata
ſunt collyria, quæ ſenſim, & non ab
alto, torrentis ritu, in magnū oculi
canthum ſunt mittenda. Solidiori-
bus paulo medicamentis, ſimilibus
his, quæ *καλλιβλέφαρα*, id eſt, palpe-
bras honeſtantia dicuntur, externas
palpebrarum partes inungemus. In
huius igitur inflammationis prin-
cipio ſequens collyrium erit utile.

℥. Aq. candidæ ouorum ſub-
ſtantię

Liber primus, Cap. XXIX. 115

stantiæ ʒ.ij. aquæ ros. plantag. sing.
ʒ. j. β. collyrij albi Rhasis sine opio
ʒ. j. misce, fiat collyrium. Mittan-
tur guttæ aliquot frequenter per
magnum oculi canthum in ocu-
lum, resupino existente ægroto.
Vel sic.

℥. Aq. plantag. ʒ.ij. mucag. sem.
psyllij cum aq. ros. extract. ʒ. j. pom-
pholigos optimè præparatæ, & in
tenuissimum puluerem (alchool
Arabes vocant) redactæ ʒ. j. cerusæ
aqua rosarum ablutæ ʒ. ij. aq. sola-
ni, & endiuivæ an. ʒ. j. β. misce, fiat
collyrium. Vel sic.

℥. Amyli ʒ. ij. cerusæ aqua ro-
sarum ablutæ. ʒ. iiij. gummi Arab.
ʒ. j. gummi tragacanth. in aq. ros.
eliquati ʒ. j. β. puluerentur tenuis-
simè. Fiat in modum limmenti, in-
ungantur palpebræ.

Verùm si humor calore acrimo-
niam contraxerit, supradictis pul-
ueribus supra cotem optimè tritis
miscere poterimus lac iuuentulæ
bene habitæ, filiúmque enixæ (si
fieri potest) quod ex vbere recen-
ter

116 *De Tumorib. præter naturam,*
ter emulctum sit.

Temporibus admouenda erunt
medicamina fluentem humorem
intercipientia in sequentem mo-
dum parata.

℞. Boli armeni, sanguinis dra-
conis, terræ lemnix, thuris & eius
corticis, mastices, amyli an. ℥. j. pul-
uerentur & ouorum candida parte
cum vti volueris, excipiantur: fiat
emplastrum rotundum, applicetur
tempori è regione laborantis ocu-
li. Quando ad inflammationis in-
crementum ventum est, tunc quæ
apocrousticam simul & digeren-
tem facultatem sunt adepta, vfur-
pabimus, sed inæqualiter mixta.

℞. Muccag. sem. cidon. & fœ-
nugræci diligenter loti an. ℥. j. β.
aq. solani ℥. ij. pompholigos optimè
præparatæ ℥. iij. sarcocollæ in la-
cte asinæ maceratæ ℥. j. cerusæ aqua
ros. ablutæ ℥. ij. puluerentur te-
nuissimè. misce, fiat collyrium.
Vel sic.

℞. Sarcocollæ in lacte asinæ
vel humano maceratæ ℥. j. gummi
tragac.

tragac. \mathfrak{z} .ij. cerusæ aq. rosarum lotæ
 \mathfrak{z} .iiij. aquæ pluuiæ \mathfrak{z} .iiij. misce, fiat
collyrium. Ex his sine aqua addito
vno oui vitello parari potest em-
plastrum, quod leniter palpebræ
applicabimus. Non minus isto ef-
ficax est remedium sequens, præ-
sertim quando morbus est in vigo-
re summo.

℥. Pomorum semiputrium sub
prunis coctorum, postea diligenter
in mortario marmoreo contuso-
rum & per colum medicum trans-
fusorum iij. num. aq. rosar. q.s. do-
nec ad cataplasmatidis consistentiam
reducantur. Vel sic.

℥. Foliorum plantag. solani
summiratum fænic. chelidonij ma-
ioris, euphrasie, verbenæ sing. M.j.
sem. fœnugræci diligenter loti &
contusi \mathfrak{z} .j. β . dissecantur minutim
herbæ & vino albo irrorentur. Fiat
sublimatio in balneo Mariæ, liquo-
ris stillatitij cape \mathfrak{z} . iiij. quibus se-
quens præsidium miscere poteris.

℥. Sarcocollæ vt dictum est præ-
paratæ \mathfrak{z} . iiij. tuthiæ optimè præ-
paratæ

118 *De Tumorib. præter naturam,*
paratæ 3. j. cerusæ aq. rosarum ablu-
tæ 3. ss. cadmiæ vstæ diligenter lo-
tæ 3. ij. misce, fiat collyrium. Vel
sic.


℞. Olibani & myrrhæ electæ
an. 3. ij. sarcocollæ vt dictum est
præparatæ 3. iij. tuthiæ optimè
præparatæ 3. j. margaritarū splen-
didarum, coralli rubri & lapidis
hæmatitis an. 3. j. puluerentur te-
nuissimè & cum aqua rosarum in-
fusionis gummi tragacantæ fiant
pastilli: teratur vnus subtilissimè
supra cotem, & debitæ supe-
rioris stillatitij liquoris quanti-
tati misceatur, fiat collyrium.
Non sunt circa morbi initium
vsurpandi soli pulueres, quippe
qui oculos grauent & acerbos
dolores moueant. Iam opthalmia
in declinatione existente digeren-
tia ex vsu erunt: qualia decocta
ex fanugraco, meliloto, chamæ-
melo, rosis rubris parata: & col-
lyria superiùs tradita, quibus thus,
& sarcocollam miscebimus. Meri-
porio tunc concedenda: balneum
vtile,

utile, fatus non denegandus, neque
ea quæ ab Hip. in Aphorismis sunt
tradita. Magnam lippitudinem pal-^{Aph.}
pebrarum tarso hærentem & ocu-_{31.66.}
li apertionem liberam verantem
fœnugræci decocto aut vino albo
repido tollemus.

Quartus & ultimus scopus ex-
poscit ut vehementem corporisque
robur deficientem dolorem ano-
dynis medicamentis leniamus.
Quod si hæc non prosint, narco-
ticis, quamvis oculis maximè sint
adversa, sopiemus. Huius methodi
memores, ut à debiliorum usu au-
spicemur, quorum frequens usus
esse non debet, quia materiam reti-
nent, & illius digestionem prohi-
bent: ad fortiora urgente necessi-
tate deinde transeamus. Quare col-
lyrium ex decocto seminis papave-
ris albi, florum violarum, nymphaeæ,
rosarum rubrarum, pomorum man-
dragoræ & psyllij mucagine erit
utile. Vel sequens etiam erit ac-
modatum.

℞. semin. papaveris albi, sem.
plan

120 *De Tumorib. præter naturam,*
plantag. sing. ʒ. j. florum violarum,
nymphææ sing. p. j. licij ʒ. j. s. aloës,
gummi arab. sing. ʒ. j. opij thebaici
ʒ. iij. decoquantur & colentur.
Mittantur guttæ aliquot in ocu-
lum. Conciliandus erit somnus
unguento populconis, vel rosaceo,
cum oleo seminis papaveris albi
temporibus admoto, vel admini-
stratione asyncriti ʒ. j. Olea & pin-
guia medicamenta oculis non sunt
applicanda, eo quod dolorem in-
cutiunt.



*De Vux & Columella inflam-
matione.*

C A P. XXX.

Vux seu columellæ, quæ est
vocis veluti plectrum, affe-
ctus frequētissimè acciden-
tes duo esse censentur. Alter inflā-
matio, vel tumor ab humore san-
guineo profectus. Qui si magnus
sit, & in inferiore parte crassus ac
orbicularis, periculo non vacat,

vt

Liber primus, Cap. XXXI. 121
vt ait Celsus. Alter illius membri ^{ca. 14.}
relaxatio, incrementum & tenuitas ^{6. li.}
cum liuore quodam. Prior *σαφυλή*
siue vna affectionis nomine dicitur.
Posterior *κίων & κίωνις* columella,
siue lorum: vterque à similitudine
(vt morborum plerique) dictus est.
Vtriusque causas, indicia & curatiuam
methodum sequentibus capitibus trademus.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De Tumoris vnae & columellae causis & indiciis.

C A P. XXXI.


HOs affectus excitantes causas procatarticae, sunt omnes illae quae fluxionem à capite ad gurgulionem promouet, quales sunt vini generosi & meracioris frequens vsus: calidorum & acrium ciborum, sanguinemque adaugentium copia, laboriosus & intempestiuus corporis motus, pleno existente capite: Aquilonia temporis constitutio, cerebrum ipsius-
F que

122 *De Tumorib. præter naturam,*
que velamina comprimens, vehemens
solis æstus humores fundens
& eliquans, clamores magni atque
ad rauim vsque facti.

Internæ causæ sunt maxima gurgulionis imbecillitas, capitis crassa
& carnosâ constitutio, ipsiusque
plenitudo, quæ per venas in gurgulionem
defluens vnam gignit, tenui & pituitoso humore gurgulionem
irrigans, ac extendens, vnde columellam excitat: vterque affectus
non sine magna molestia agrotantem excruciat, tum quod spiritus viam,
tum quod cibi iter occludat.

Tussis omnibus adest, & humor in nares repellitur, laborantibus
vnâ tonsillis. Aperto ore & compressâ linguâ, tumor & extensio
facile videtur, nonnunquam tam tenuis pendulus est gargareo, vt
linguam ipsam contingat. Senibus columella, vna iuuenibus morbus
est peculiaris.

De



*De Tumoris vnae & columellae
curatione.*

C A P. XXXII.

Væ curatiua methodus tri-
bus scopis absoluitur. Priùs
enim agendum est de huius
curatione, denique de columellæ
remediis. Primus nos monet, vt
congruam victus rationem ægroto
consultamus: quem in aëre calido
& humido, in regione austro &
boreæ exposita versari nolumus,
sed modicè frigida & sicca. Absti-
nentiã consultis priùs viribus
Celsus commendat. Ab eduliis ca-
lidum & copiosum sanguinem gi-
gnentibus abstinendum: necnon à
veteris, acris & meracioris vini po-
tu, cuius loco aqua hordei utilis,
salubre quoque hydromel. Labo-
ribus magnisque exercitiis parcen-
dum. Sublimius tenendum caput:
sit moderatus somnus, nam ab eo
qui debitam naturæ legem excedit

*ubi su-
pra.*

124 *De Tumorib. præter naturam,*
periculum haud dubiè maximum
imminet. Venus negligenda: & fu-
gienda, omnia animi pathemata,
ea potissimum quæ sanguinem in-
flammare nata sunt. Noxia pleni-
tudo, alui deiectio frequens salu-
bris: aduersus item vaporulento-
rum alimentorum, vt alliorum, cæ-
parum & bulbosarum radicū vsus,
vinique recentis & nondum de-
fœcati potus. Modicè alentia ali-
menta, frigida qualitate prædita,
sunt ex vsu; frictions externarum
partium, inferiorum præsertim vti-
les habentur, quas vniuersalis eua-
cuatio præcedere debet.

Secundus scopus corporis totius
euacuationem, & humoris ad affe-
ctam sedem fluentis reuulsionem
expostulat. Itaque si corpus sit ple-
thoricum, & mittendi sanguinis
adsint scopi, venam cubiti mediam,
quam Arabes brachij funem vo-
cant, commodè tundemus. Ætate
verò venæ sectionem respuente sca-
pulis affigendæ erunt cucurbitulæ:
quorum appositio frequens etiam
post

Liber primus, Cap. XXXII. 125

post venæ sectionem non est negligenda. Vincula quoque inferioribus partibus iniecta reuulsionis ergo probantur. Vtilia sunt in capitis & capiti proximarum partium morbis clysmata, modo sint acria, & è longinquis partibus humores euocantia, quæ in sequentem modum parari possunt.

℥. Maluauisci cum rad. viol. acanthidis, parietariæ, mercurialis, maluæ bethonicæ, samplici sing. M.j. prunorum, caricarū pinguium sing. pa.x. sem. fœnic. anisi & seseli massiliensis sing. ʒ. ij. agarici albi fœmini. ʒ. vj. sem. lini, fœnugræci sing. ʒ. j. sem. carthami contusi ʒ. x. florum centaurij minoris, rorismarini, stœchados, sambuci sing. p. j. Fiat decoctio. cape de colatura qu. v. in quibus dissolue benedictæ & hieræ picræ sing. ʒ. β. cassiæ cum sacch. ʒ. vj. succi ciclæ, mellis ros. colati, sacchari rubri sing. q. s. ol. viol. & de lilio sing. ʒ. ij. salis communis ʒ. j. misce, fiat clyster.

Multi ad reuulsionem candens

F 3 fer

126 *De Tumorib. præter naturam,*
ferrum ossium bregmatis regioni
ad latus obelex commissuræ ad-
mouent. Setonibus quoque fluxio-
nem reuellunt, supremæ scapula-
rum regioni apponentes, humido
& pingui medicamento, vt inflicta
vulnera aperta longo tempore ser-
uentur, illinentes.

Tertius scopus topicorum reme-
diorum vsum commendat. Quare
in morbi initio, capite & vniuerso
corpore prius euacuatis, quæ fluxū
reprimunt auxilia vsurpabimus, ac
fortia in magno, debilia in paruo
adhibebimus: & cum nostri corpō-
ris affectæ partes pro illarum varia
structura variaque actione propriis
& maxime accommodatis remediis
egeāt; gargarismata & collutiones,
his tanquā magis congrua remedia
in sequentem modum parabimus.

℞. Foliorum oleæ syluestris, ca-
cuminum rubi, foliorum solani,
plantaginis, herbæ Roberti, pampi-
norum vitis sing. ℞. j. mororum, ra-
dicis mori sing. ʒ. j. citinor. hypocy-
sthidis sing. ʒ. vj. pyrorum acerbo-
rum,

Liber primus, Cap. XXXII. 127
rum, sorborum sing. nu. viij. fiat decoctio, facta colatura ad lb. ij. misce dianuci & succi ros. defæcati sing. ʒ. iiij. fiat gargarisma, vtatur frequenter longè à cibo. Ex lacte gargarismus circa initium & summum vigorem maximè commendatur ab Auicenna: quod repellat, leniat & dolorem sedet. Sed hoc est obseruandum, ne capite & corpore plenis hæc administremus, promptio- rem ab agitatione humoris defluxionem metuentes. Vel sic.

℥ Turionum ilicis, fagi, arbuti sing. M. j. glandium, folior. & baccarum, myrti, rosar. rub. sing. ʒ. ʒ. cor- norū, mespilorum sing. nu. vj. cype- ri, iunci odorati sing. ʒ. iiij. rhois culinarij & coriarij sing. ʒ. v. fiat decoctio, de colatura cape lb. j. ʒ. dissolue succi malorum granatorum & malorum cotoneorū sing. ʒ. iiij. misce, fiat gargarisma, quod præce- denti est fortius. Adde aluminis scissi, quod aliis aluminis generi- bus ob partium tenuitatem est præ- stantius, ʒ. ij.

128 *De Tumorib. præter naturam,*

Inflammatione ad incrementum,
vel ad summum vigorem mutati,
sequentium auxiliorum formula
non erit indecens.

℞. Rad. acori vulgaris, galangæ
crassioris, rad. iridis sing. ʒ. j. summi-
raturum rubi, lentici, foliorum plan-
taginis, oleæ sylvestris sing. M. j. fo-
liorum verbenæ, agrimonix, turio-
num cauliū sing. M. ʒ. myrrhæ tro-
glitidis, lacrymæ thuris sing. ʒ. ij.
fiat decoctio, & in colaturæ ib. j. ʒ. ʒ.
dissolue mellis dispumati ʒ. ij. suc-
ci rosarum defæcati ʒ. ij. misce, fiat
gargarisma. Vel sic.

℞. Lapidis phrygij combusti &
diligenter aqua rosar. loti, lapidis
ematis, lapidis agerati, & succi Cy-
renaici sing. ʒ. j. teratur supra cotē,
& in tenuissimum pollinem reda-
cta calamo insufflentur in vnam.

Collo repellentia non sunt ap-
ponenda, at potius diaphoretica &
digerētia, etiam quouis morbi tem-
pore, vt de angina ab his qui medi-
cinam faciūt proditum est. Et cum
gargareo capiti subditus fluxiones
ab

ab ipso facile recipiat, huius tanquā
mēbri mandantis habēda est ratio.
Emplastrum igitur sequens aliaque
præsidia stephanæ & obeleæ cōmis-
suris applicabimus, pilis prius rasis.

℞. Thuris, mastiches, gummi lū-
niperi sing. 3. j. β. melanthij torrefa-
cti ʒ. iiij. fimi columbini & muris
sing. 3. j. ros. rub. baccarum & folio-
rum myrti sing. ʒ. ij. cariophyllorū,
nucis moscatae sing. 3. β. picis naua-
lis q. s. fiat emplastrum ad formam
literæ T. Vel sic.

℞. Fermenti acris 3. j. β. salis tor-
refacti, fimi columbini sing. 3. ij.
mellis anacardini q. s. ad incorpo-
randum fiat emplastrum. Capiti
etiam sinapismo sequenti robur ad-
demus, ac humorem in ipso coa-
ceruatum discutiemus.

℞. Coriandri præparati ʒ. j. ga-
langæ crassioris, nucis moscatae,
cariophyllorum sing. 3. j. β. foliorum
beton. siccorum ʒ. iiij. ros. rub. ʒ. ij.
granorū tinctorum 3. β. santali albi
& rub. sing. 3. j. fiat pulvis tenuissi-
mus, applicetur serò in lecti ingres-

su, & mane panno aspero fricetur caput, nouum postea puluerem supra ponēdo. Si repellentibus & digerentibus auxiliis non cesserit humor, & iam abscessum fecerit, & vomica non aperuerit, cauterio per cānulam in partem affectam misso, ne linguam attingamus, aperienda erit. Deinde sequenti gargarismate deterforia facultate prædito vtēdū.

℞. Succī verbenæ, caulium, agrimonie depuratorū sing. ℥. iij. mellis ros. colati ℥. ij. decocti hordei integri lb. j. fiat gargar. Deterfo iam vlcere, huic sarcocollæ & myrrhæ sing. ℥. j. miscere poterimus. Ex lacte caprino, aut asinino parabitur etiam commodè gargarisma.

Si vna magna & rubra sit, sine periculo secari, & vri non potest ob inflammationis, & sanguinis eruptionis metum. Si gracilis, liuida & extrema pars crassior, superior gracilior fuerit, tunc consulente Hippocrate manus ad mouere tutū est. Decubitus pronus potius quàm supinus ægroto consulemus.

De

3. pro-
gnostic.
prog.
21.

De Columella curatione.

Laxa & prominula columella
quiete & proba victus ratione, gar-
garismis simplicibus, & leuiter
astringentibus curatur, diluta pos-
ca & tepida aqua mulsæ, & collu-
tionibus repellentibus & digeren-
tibus. Sed hæc ante venæ sectio-
nem, si corpus sit plethoricum, vel
purgatorij medicaminis, admini-
strationem, si cacochymum, non
sunt tentanda. Sequentia itaque
præsidia opportuna erunt.

℞. Lentium, hordei sing. p. j. ro-
sarum rubearum siccarum, baccæ-
rum & foliorum myrti sing. p. ss.
balauftiorum ʒ. ss. aquæ & aceti
sing. partes æquales. Decoquantur
vsque ad mediæ partis consum-
ptionem, colentur, fiat gargarisma.
Miscebimus commodè ʒiij. mel.
ros. colati, vel medicamento Gale-
ni libro ʒij. Crus tradito vtere:
quod recipit spicæ celticæ, nidi hi-
rundinum aut pulueris hirundi-
num in clibano non admodum

Liber primus, Cap. XXXIV. 133
radicem vtrimque perspicuæ : duæ
his proximæ. Sed penitiores Græcis
παιδιῶν dicuntur ab *ιδιῶν* figu-
ra, quòd in augusto meatu sitæ
sint. Solebant enim veteres Græ-
ci locorum angustias, vel strictam
inter duo maria terram *ιδιῶν* ap-
pellare. Oborta quippe in ipsis
inflammatione tument : & spiri-
tus ac tibi viam occludunt. Inter-
dum partem, sæpe affectum nobis
repræsentant. Galenus glandulas
quæ in oris termino vtrimque si-
bi ex aduerso iacent, interdum *ἀν-
τιὰς*, id est, tonsillas, partes autem
his vicinas, paristhmia vocauit.
Auicennæ Interpres amygdalas : *lib. 7.*
Celsus paristhmia, & tonsillas co- *cap. 8.*
rum inflammationem.

De causis & indicis inflammationis
paristhmiorum & tonsillarum.

C A P. XXXIV.

HArum partium inflammata-
rum causæ prægressæ, nimius
meri

134 *De Tumorib. præter naturam,*

meri potus, multa ac avidior ciborum deuoratio, acrium præsertim, asperorum, linguamque ferientiū, habentur. Quibus Solis vehementem æstum, capitis humores attenuantem, & defluxionem promouentem, addes. Intemperies calida & humida, horū morborum causa est corporea. Solent enim membra calida & humida frequentissime in inflammationem incurrere. Nam in habentibus symbolum transitum esse facilem scripsit Aristoteles. Præterea in Aphorismis ab Hipp. traditum est, in morbis minus periclitari, quorum natura, aut ætati, aut consuetudini, aut anni tempori, magis congruit morbus. Sanguinis immoderata copia, & ciborum immoderata quantitas est etiam causa interna. Ob hoc cum pueri se plurimis eduliis expleant, & adhuc lactantes infantes copioso lactis haustu, id sibi malum cōtrahunt. Indicia sunt, transglutiendi difficultas, dolor febris nonnunquam copulatus, tumor cum

Aphor.
34.2.l.

136 *De Tumorib. præter naturam,*
rendi, ventri commodi, ipsumque
laxantes.

Quare ad secundum scopum
transeuntes, si venter non probè
egerat, leniètem clysterem iniicie-
mus. Postea iuueni ægro, multò-
que sanguine abundanti incisa cu-
biti vena sanguinem detrahemus.
Ac post sanguinis missionem gar-
garismos repellentes & infrigidan-
tes præscribemus: quales sunt ij
quorum superiùs facta est mentio.
Horum vsus ante euacuationem
suspectus habetur, nam ob motum
qui in gargarismatis fit, maximè ti-
mendum erit ne humoris maior
copia in inflammata partem de-
turbetur, phlegmonèque adaugeat.
Miscenda postea erunt digerenti-
bus apocroustica, pro vario inflam-
mationis tempore, nudis digerenti-
bus cum ad declinationem morbus
venerit, erit vtendum.

Sed hoc est maximè obseruan-
dum, nè externis partibus repellen-
tia adhibeamus, quod etiam in an-
gina ab omnibus medicis obserua-
tum

tum est: sed potius digerentia chalaistica, ipsumque dolorem lenientia: qualia sunt succida lana æsippo saturata, vel vnctio ex oleo liliceo, chamæmeli, vel resumptiuo vnguento parata.

Quod si digerentibus & apocrousticis medicaminibus non cedat inflammatio, vel futuri abscessus nobis aliqua rudimenta appareant, tunc gargarismus ex caricarum pinguium, dactylorum, vuarum passerarum mundatarum ab acinis, & ziziphorum decocto parandus erit, & iam apparentibus natæ vomicae notis, acuto cauterio per cānulā in os missa, vel phlebotomo aperienda erit. Salubrisque erit detergens & vlcus eluens gargarismus: qualis est is qui ex hordei integri, lentium integrarum decocto fit, addita mellis rosati quantitate debita. Post vlceris probam deterfionem colleticum gargarisma ex stomaticis, non mineralibus, & exitiosis medicamentis, vsurpandum erit: quorum amplissimam syluam lib.

138 *De Tumorib. præter naturam,*
l. 8. c. 1. καὶ τὸν τοῦτο nobis Galenus tradidit.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De Exanthematis & Ecchymatis.

C A P. XXXVI.

EXanthemata psudracia & ecchymata sunt pustulae, quas Auicennas Bothores vocauit. Paulus pustulas per cutem pueris erumpentes exanthematum nomine donat : & cap. 8. lib. 4. exanthemata fieri ex crassis in cute concretis humoribus, pellicula superiore densa existente, lib. 3. cutis exulcerationes subrubicundas & asperas esse tradidit. Psudracia vero capitis exigua tubercula, pustulis similia summam cutem excedentia. Galenus vero ecchymata papulas in cute erumpentes, & sponte extuberantes vocauit, quæ ex superfluis & crassis humoribus fiunt. Quippe qui tenues exulcerationes potius quam tumores creant; crassi vero in tumorem pellem attollunt. Plinius papulas & pituitæ eruptiones

nes vocauit, Hippocrates, herpes magnos , vel quia magnum occupant locum, vel quia cum maligna contingunt erosione.

Ex his cuilibet perspicuum euadit , confusam & indeterminatam esse horum autorum de his morbis differentiam, cum in pustulas , bothores & papulas inter se differentes reuocent. Si quis tamen veritatis inquirendæ studio flagret, & morbos non posse tutò curari illorum nomine & essentia incognita existimet , frequenter in corporis superficie paruas quasdam eminentias rotunda figura in cute exuberantes , vel maculas apparere sibi persuadebit , has cutis descædationes , illas pustulas vocans, quæ non secus ab his humoribus fiunt ex quibus magni tumores oriuntur.

Sub pustula tanquam genere exanthemata, ecchymata, vari, psydracia continentur. Exanthemata, Latinis efflorescentiæ siue efflorescences, florum instar foras exilientium


140 *De Tumorib. præter naturam,*
tium dicuntur, αἰδοῖται enim idem
est quod flos. Vel sunt feruidæ im-
petuosæq; eruptiones in tumorem
cutem attollentes, quæ ab ecthy-
matis non differunt.

Præctici exanthemata in morbil-
los & variolas diuidunt: eo quod
qui in corpore apparent tumores
exigui sunt, & varis faciem non-
nunquam molestantibus similes,
vel citra tumorem rubris maculis
cutis infestata feruidum in internis
corporis partibus sanguinem con-
tineri promittit.

Psydracia sunt pustulæ parum
duræ, subalbidæ, acutæ, supra cutem
eminentes, phlyctenis similes, ex
quibus quod exprimitur humi-
dum est. Psydracion cutis capitis
est affectus: phlyctena corporis
totius.

Exanthemata & ecthymata mor-
bi sunt pueris peculiare, rarò iu-
venes distorquētes, at senes rariùs.
Antiqui Medici cùm de horū mor-
borum constitutione, causis & cu-
ratione perfunctoriè & confusè
sint

Liber primus, Cap. XXXVII. 141
sint locuti, & inter posteriores præ-
stantissimósque nondum de causis
sit conuentum, non erit absurdum
paulò exactiùs causas venari, præ-
sertim exanthematum, & ecthy-
matum, de quibus hos digladiari
maximè videmus.



*De Exanthematum & Ecthyma-
tum causis.*

C A P. XXXVII.

DE exanthematis acutas fe-
bres iudicantibus hic agere
non est nostri instituti: nam
hæc cum naturæ irritatæ vel vali-
dæ motu fiant, huic reluctari non
debet Medicus, neque curationem
aliquam moliri. Sed de his quæ
pueros frequenter molestant insti-
tuere sermonem decreuimus, &
ostendere (nullius defraudans iudi-
cium, libenter enim cedam saniora
referentibus) quantum à veritate
in causarum notitiâ, & curatione
aberrarint nostri æui aliquot Me-
dici,

142 *De Tumorib. præter naturam,*
dici , qui potiùs contradicendi
quàm inquirendæ veritatis studio
mouentur.

Horum itaque morborum cau-
sas duplices statuimus , externas
alias, alias corporeas. Externæ sunt
cibi citæ corruptioni obnoxij, aëris
couditio calida & humida , venæ
sectio prætermiſſa , & pestilens tē-
poris constitutio. Exanthematum
causæ corporeæ sunt humores te-
nues & calidi, latas pustulas exci-
tantes , quæ non admodum sunt
pruriginosæ : ecchymatum sanguis
crassus fastigiatus atque acutas pu-
stulas faciens.

Vterque affectus ex sanguinis
menstrui malignitate , quo infans
in matris vtero alitur, emanat. Sed
exanthema à tenui & bilioso san-
guine , ecchyma à crassiore scatu-
rit, qui in partium solidarum poris
stato tempore retentus & latens,
ab externa vel interna causa effe-
uescens , ad corporis habitum ex-
cretoria facultate valida existente
protruditur. Ob hoc cuius homini
(modò

Liber primus , Cap.XXXVII. 143

(modo immatura morte non præueniatur)semel contingit. Vterque quamuis sit Epidemius morbus; quia ab aëris corpus nostrum ambientis venenosa quapiam calitus inducta qualitate commouetur, intrinsecam nihilo secius affecti corporis dispositionem ob sanguinis menstrui portionem quandam remanentem , quo infans genitus nutritusque est , præcipuâ causam, cum Auicenna & aliis Medicis esse censemus. Quapropter hanc affectionē multi naturalem vocarunt, quod à malo succo, in embrij cibo fixo, scaturiat , quæ vitari minimè potest.

Quidam celeberrimus Medicus, vir certè cui ob assiduas in philosophicis ac mathematicis disciplinis vigilias , & multos in re medica exanthlatos labores ; posteritas multum debet , oppositam sententiam non leuibus argumentis fulcit, quæ ab Herculani Cômmentariis in cap.de pestilenti febre Auic. prima 4.est mutuatus. Ait enim exanthema,

144 *De Tumorib. præter naturam,*
 thema, morbillos scilicet & ecchy-
 mata, variolas à vulgo (cuius opi-
 nio non est omnino reiicienda) vo-
 catos esse morbos Epidemios, à
 cæca & latente causa ad pestis in-
 star excitatos, & sanguinem men-
 struum non esse horum affectuum
 corpoream & continentem cau-
 sam. Nam si his morbis sanguis
 menstruus à feruidiore cælo, vel
 austrina tempestate foras ex inti-
 mis penetralibus naturæ vi pro-
 trusus ansam suggereret, sequere-
 tur, mulieres quibus menstruæ
 purgationes sunt retentæ, necessa-
 riò ecchymatis vel exanthematis
 distorqueri. Et cum perniciosus sit
 menstruus sanguis, alendisque cor-
 poris partibus planè inutilis, quâ
 fieri potest vt citra horum affe-
 ctuum expulsum tam longo tem-
 pore liber persistat puer, quem, quâ-
 diu in matris utero continetur, è
 materni puriore sanguinis parte
 nutriri Galenus scriptum reliquit.
 Quod si impurus ille sanguis in
 huius alimentum cedit, cur. post
 multas

*lib. de
 femine.*

multas febres, multosque morbos
superatos in annum ætatis trigesi-
mum, aut quadragesimum in mem-
bris delitescit? Vixi sunt in ea
ætate non pauci his morbis confi-
ctari. Insuper oporteret vnūquem-
que his aliquando in vita necessa-
riò diuexari debere, & neminem
his posse secundò, aut tertio pre-
hendi, quorum vtrumque manife-
stè falsum conspicitur.

His rationibus Arabum & mul-
torum Medicorum sententiam ex-
pugnare conatur, & hæc mala ex
communi quadam causa toti aëri
conspersa originem habere con-
tendit, eo quod non solùm cælo
æstuante, sed sæpe hyeme grassen-
tur.

His argumentis addemus & aliud
sue opinioni suffragans, præceden-
tibus nostra sententia non infir-
mius. Si ex menstruo illo sanguine
prædicta incommoda excitantur,
cur in vtero matris fœtus non la-
borat? Nam quo ad excitandum
affectum vehementior est causa,

G acce

146 *De Tumorib. præter naturam,*
accedente proba passi dispositione,
eo effectus & promptior & vehe-
mentior cunctis apparebit. Cum
autem alligatus vtero, vberiori
sanguinis menstrui copia fruatur,
cur non promptius in hæc incom-
moda irruet?

Ergo quamvis huius doctissimi
viri decreta tanquam è tripode
profecta suspiciam atque obser-
uem, veritati tamè magis quàm ali-
cui sectæ addictus, & in verba ma-
gistri iurare insolitus, procul pul-
so omni contradicendi studio, ve-
ritatis (quæ vinci non potest) *παρὰ*
πλὴ munitus, quid de hac re sen-
tiam breuiter explicare, & argu-
mentis respondere conabor, sumpto
ab eo quod à Gal. traditum est &
ab omnibus Medicis receptum ini-
tio.

Generationis nostræ duo sunt
principia, quorum alterum est ma-
ris & fœminæ semen, alterum san-
guis maternus, siue menstruus se-
mini alimentum suggerens. Ex se-
mine solidæ partes omnium facul-
tatum

*Gal. li.
de sem.*

tatum vera fulcra & fundamenta conformantur. Iam conformatas & delineatas carne à sanguine menstruo progenita, natura (vt Apellem Pictorem eximium fecisse traditur) replet. Quamdiu verò maturefcit in vtero fœtus & crescit, tamdiu mulieri menstruæ purgationes retinentur. Quod si nonnullis grauidis menses eruperint, existimemus oportet has succulentas & redundantis sanguinis esse participes, vel valetudinarios fœtus parere.

Ex puriore sanguinis menstrui parte fœtum alii nemo inficias ibit, qui *ap. 7.* purior dicitur. Quemadmodum à Gal. traditum est, lienem melancholicum viscus subtili sanguine alii: quod non est simpliciter intelligendum. Nam sequeretur, lienem calidiorem esse iecere. Omnis enim temperies membri similis est rei à qua nutritur. Lien igitur alitur subtili sanguine, hoc est, subtiliore fœculenti & melancholici sanguinis parte. Ita fœtus in vtero,

*4. de
usu
partiu.
Apho.
37. l. 5.*

*Ani. se.
1. 1. ca.
de com-
plexio.*

148 *De Tumorib. præter naturam,*

purior & defœcator sanguinis
menstrui portione nutritur, cuius
portio quædam malæ qualitatî co-
pulata in partium solidarum poris
certo tempore latitat: quemadmo-
dum in frænîs siue dentium alveo-
lis statò tempore latitat spermati-
cus quidam humor, cuius benefi-
cio dentes nascuntur non solùm in
ipsis pueris, sed etiam in adultis.

*Aui. sc.
1.1.*

Adde quod ij qui à cane rabido
morsi sunt, nõ statim, sed transactis
aliquot mensibus in hydropho-
biam labuntur: quia venenata illa
saluæ qualitas in membrorum po-
ris latitans, non protinus suam ma-
litiâm eiacular, sed ab aliqua
causâ procatactica exagitata, ve-
nenatas vires exerit, insaniamque
procreat.

Præterea experienciâ frequenti
est comprobatum, podagra aut ele-
phante infestatum parentem, po-
dagricum, aut elephanticum filium
gignere, qui nonnunquam ante vi-
cesimum aut trigesimum annum
tali morbo minimè conflictabitur.

Vidimus

Vidimus nos plerosque à nutrice Hispanico morbo laborante educatos citra mulieris congressum, ante tres & viginti annos Hispanica lue non infestatos. Cur hoc quæso ? Non potest meo iudicio alia adferri causa, nisi quod cum orta suæ originis naturam redo- leant, ex elephantico, vel podagri- co, aut Hispanica scabie laborante parente similis procreabitur filius.

Sed cur in multos menses vel annos ea dispositio fileat ? Nam (ut superius fuit demonstratum) vide- mus hos à talibus affectibus non statim corripì : quia virus illud in solidorum membrorum poris latet, cuius aliquid in venis etiam cum sanguine est coaceruatum. Huius occulta illa ac noxia qualitas à probo sanguine coërcita accedente externa, vel interna causa, latentem illum humorem exagitante, reli- quum sanguinem inficit & excre- toriam facultatem (quæ nunquam validè operatur, nisi ab humoris quantitate aut qualitate sit laceffi-

150 *De Tumorib. prater naturam,*
ta) vellicat ac proritat. Tunc ea
quæ priùs latebat dispositio, se pro-
dit. Potest enim venenata materia
mole pauca , sed deleteriis viribus
magna, non secus in corpore gigni
& contineri , quàm à venenata be-
stia, vel alia quapiam externa causa
in corpus ipsum transsumi , vt à
Gal. ex præceptoris Pelopis placitis
fuit luculenter ostensum. Non
solum à sanguinis menstrui pernici-
cie, ex quo fœtus in matris utero
per umbilicalem venam nutritur
& augetur , hos morbos excitari,
sed lactis à tali sanguine geniti su-
ctu qui per amphimēnas venas ad
mammas regurgitat , aliqui con-
tendunt , cùm menstruo sanguini
germanum sit lac , eiusdem noxiæ
qualitatis esse particeps. Sermonem
igitur ad rationes nostram senten-
tiam infirmantes conuertemus, sin-
gulas quo propositæ sunt ordine
diluentes.

Ad primum argumentum dici-
mus, simile non esse de mulieribus
quarum menstruæ purgationes
sup

3. de lo.
aff. et u.
ca. de
prolep.

suppressæ sunt : eo quòd quicquid pueris vitio sanguinis vel lactis (quod est horum pèculiaris alimonia) contingit , aut omnino inseparabile est , aut ægrè secerni potest. Neque vnquam reiiceretur, nisi ab ipso statim initio molestum fuisset naturæ , quæ humoris prauitatis non inmemor , oblata sibi ab interna vel externa causa occasione, hunc foras expellit non sine grauib. symptomatis , & sæpe mortis periculo. In adultis verò mulieribus quibus suppressi sunt menses in venis contentus menstruus sanguis facilius à naturæ robore absque vllo feruore, vel ad cutim , vel ad aliam corporis partem reiicitur.

Ad secundum. Recepta est ab omnibus , tum Aristotelis , tum Galeni sententia, sanguinem menstruum generationis & nutritionis nostræ materiam esse : cuius purior defæcatorque pars contentum in vtero fœtum alit , impurior donec in lucem prodierit, retinetur: quem prouida natura pro onere habens,

152 *De Tumorib. præter naturam,*
horâ puerperij deicit. Iam in lucem emissus foetus sanguine menstruo ad mammas recurrente in his recocto & in lac mutato alitur. Suppressas quippe menstruas purgationes in lactante videmus, quò sit vt eodem tempore mulier menstruas purgationes habere, & lactare vix possit.

Itaque quamuis quod perfectius est ac purius ex menstruo in embrij alimoniam cedat, vitiosa tamen aliqua qualitas ex ipso sanguine menstruo in membrorum poris & mulieris vtero fixa est, quæ tandem à natura à causa externa vel interna irritata, non solum ad cutim, sed interdum ad internas partes protruditur, periculo non vacantia symptomata faciens.

Neque absurdum est malam illam ex sanguine menstruo qualitatem atque infectionem pluribus annis, & sæpe vsque ad senectutem in membris esse absconditam. Id quod pluribus paradigmatis luce meridiana clarioribus ostendi potest.

test. Hereditarios podagricos videmus, quibus à patris semine nonnunquam infectio est communicata, ad annum vsque trigessimum, vel plus vel minus, latitare, quæ podagram ante illam ætatem non excitauit. Idem quoque de Elephantiscis censendum.

Insuper Hispanica oborta nostra tempestate lues hoc ipsum etiam comprobatur, videmus multos huius morbi contagio miserè discruciatos qui ligni guaiacini decocto, vel ex cynabrio suffitu, aut ex ipsa hydiargyro paratis vnctionibus desideratæ salutis restituti sunt. Post multos tamen annos absque vlllo infectæ mulieris concubitu reuiuiscere ea dispositio visa est. Non certè ob aliud nisi in primis visceribus referuatam vitiosam qualitatem, quæ sensim adueniens alimentum infecit, donec hæc perniciēs vigere supra corpus potuerit, acerbos dolores, sæuæque symptomata renouarit.

Nemo igitur mirari debet si per

G s mul

154 *De Tumorib. præter naturam,*
 multos annos atque morbos etiam
 superatos, vitiosa menstrui qualitas
 occulta permanferit, donec validior
 reddita naturā superarit: quod etiā
 in morbillis & variolis accidit.

Ad tertium. His morbis vnum-
 quemque in vita laborare oportet,
 nisi à febre aut exitioso quodam
 morbo morte citiùs quàm hæc ma-
 la nascātur, præripiatur. Neque ab-
 surdum est aliquē posse bis aut ter
 talibus affectibus prehendi, præfer-
 tim si iam cōmoto ab aliqua causa
 menstruo illo sanguine totum pri-
 mis conatibus imbecilla excretoria
 facultas ad corporis habitum pro-
 pellere nequiverit. Tunc ea quæ in
 membrorum poris seruaturs men-
 strui sanguinis portio accedente
 exagitante causa secundò aut ter-
 tiò, tales affectus procreabit.

Ad vltimum dicendum, ad harum
 pustularum generationem duo esse
 necessaria: sanguinis scilicet crassi
 aut biliosi efferuescentiam, & ro-
 bur caloris humorem impellentis.
 Cùm autem vtrum partem esse
 mem

Liber I. Cap. XXXVIII. 155

membranofam & frigidam conftet, morbillis & variolis in ipfo cōtēntus fœtus laborare minimè potest: nam tametsi mēstrui sanguinis vitiosa qualitas in mēbrorū poris sit fixa, nisi is ab impellente causa exagitetur, tales affectus non producet.

His rationibus aduersariorum argumentis satisfactum iri arbitramur. Quod si aliquis meliora habeat, & ea in lucem edat, nō peruicaces & ceruicofi ferulæ lubentè manum subdemus. Dignam ab ipso excusationē recipiēt conatus nostri, cū in magnis voluisse sat sit. Nūc ad signorum hos morbos ostendentū inuestigationē nos cōuertemus.



De Exanthematum & ecchymatum indicis.

C A P. XXXVIII.

NOtæ hos morbos ostendentes petendæ potius sunt à facie, quàm à reliquis partibus. Nam cū facies sit spiritalis,

156 *De Tumorib. præter naturam,*
humida & maxime porosa, impres-
siones facile recipit & ostendit:
quarum quædam futurorum exan-
thematū & ecchymatum sunt nun-
tiæ, quædam iam præsentis morbos
ostendunt. Exanthemata cum à te-
nui & bilioso sanguine excitentur, in
erysipelatis genus admitti debent.
Aut ex phlegmonū sunt classe, quæ
à sanguine interdū crasso & ebul-
liente, interdū pituitæ mixto fiunt:
• De quibus hic agere decreuimus.

Quæ futuras & instantes vario-
las præfagiunt, sunt narium pruri-
tus, caliginosi oculi, maximus in
somno timor, tumor initio parvus
& rarus, sed vigente morbo maior
& frequentior, vox rauca, ægra re-
spiratio: color insuper ruber & san-
guini similis, qui frequentius aliis
humoribus variolis ansam sugge-
rit. Pus ex rupta pustula ema-
nat, eschara cum sanescit decidit,
quæ nonnunquam tam alta, pu-
tris & olida est ac maligna, ut
fædas fossas ac cicatrices inde-
lebiles relinquat. Quod in filio
qua

quatuordecim annos nato cuiusdam forensium caufarum patroni vicini mei superioribus annis confpeximus, qui ecchymatis vniuerfum corpus ita obfessum habebat, vt obortis circa varios articulos altis vlceribus offium cariei copulatis, putrido & cadaueroso illorū odore omnes è cubiculo fugaret, qui tandem nostris præfidiis magna astantium admiratione iam ab omnibus deploratus salutis restitutus fuit.

Si quando oculos diuexant, illos excæcant, aut curatu contumaces maculas gignunt. Quando ob excretoriæ facultatis imbecillitatem in internis partibus, vt pulmone & intestinis, gignuntur, tunc triste nobis promittunt prognosticum.

Exanthematum color etiam ruber est, sed magis clarus, horum tumor non est eminens, neque ad supurationem peruenit, sed potius digeritur. Hi morbi frequentius vere & autumnò quàm alijs anni parti

158 *De Tumorib. præter naturam,*
partibus excitantur. Quibus cutis
densa & astricta est, his difficilis
fit exanthematum eruptio. Sunt
ecthymata periculosiora exanthe-
matis. Hæc à subtili sanguine sca-
turientia nonnunquam illa præce-
dunt, aliquando verò sequuntur
pro varia effectricis causæ disposi-
tione.

Sed cur oporteat his duobus,
cùm in utroque sit menstrui illius
& vitiosi sanguinis in membrorum
poris fixa qualitas, vnumquemque
conflitari? nonne euacuato semel
illo menstruo sanguine, in solis
exanthematis, aut ecthymatis ab
omnibus incommodis à tali causa
emergentibus liber erit puer? cur
ergo oportet ut alterum alter affe-
ctus sequatur? Dicendum huius
sanguinis menstrui (qui horum mor-
borum est effectrix causa) duplicem
esse partem, alteram tenuem & bi-
liosam, alteram crassam, & utram-
que vitiatæ qualitatæ esse partici-
pem. Si à causa vel procatarctica,
vel interna tenuior pars exagitetur,
&

& ad cutim propellatur, exanthemata committet: si crassior commoveatur, ecchymata excitabit. Sanguis hic sic dispositus hos tanquam proprios peculiarésque morbos & non alios procreat.



De Exanthematum & Ecchymatum curatione.

C A P. XXXIX.

HOrum affectuum curatio duobus scopis perficitur. Primus nos monet, ut probam, & his malis aduersam victus rationem instituamus. Quo fit, ut cum ad cutim propulsa sit causa, ne ad internas partes reuocetur, & naturæ motus præpediatur, aëris frigidi inspirationem denegemus, sed tepidi & non admodum calentis usum cōsulamus. Frigidæ potus insalubris, sed vini albi & oligophori utilis; utilis quoque hordei cremor in ecchymatis & tota ptisana. Exanthematis bromij cremor,

160 *De Tumorib. præter naturam,*
mor, quẽm auenatum practici vo-
cant, confert. Ex usu sunt vuæ pas-
sæ, caricæ pingues, præsertim in
morbi initio: oxalidis, malorum
punicorum citrangularum succus
cõmendatur. Sint euchyma alimẽta
frugaliter vsurpata. Vino genero-
so interdicens, & omnibus sal-
sis, acutis & linguam ferientibus
alimentis.

Quod si adhuc ab ubere lac su-
gens puer laboret, purgato nutri-
cis corpore sui officij erit monen-
da, vt scilicet instituta proba victus
ratione, à vino, Venere, & omni-
bus calfacientibus quàm maximè
fieri poterit, abstineat.

Pro secundo scopo sedulam na-
uabit operam Medicus, vt in topi-
corum præsidiorum usu laborantis
ætatem inspiciat. Si infantibus erũ-
pere per corporis superficiem cœ-
perint exanthemata, & horum
alius sit adstricta, supposita ex
melle cocto balano, laxanda erit,
non purgante aliquo medicamen-
to: quod cum adultis sint planè
inuti

inutilia, pueris minus conueniunt. Solent enim medicatæ potiones his propinatæ dysenteriam concitare : præterea his naturæ motus maximè præpeditur, conatur enim natura à centro ad circumferentiâ vitiosum humorem tanquam hostē nefandissimum propellere, cuius motus exhibito aluum subducente medicamento reuocato ad interiora humore, impiedietur.

Et ut naturæ ad externas partes noxium succum expellentis motus sit validior, solent non temerè mulieres rubris pannis infantes inuoluere, ut ad frequentem illorum intuitum, meliùs foras euacuetur vitiosus humor. Est profectò imaginatio res ad morborum vel incrementum, vel curationem magni momenti.

Si adultioribus medicamentum dare cogamur, erit id mite eccoproticum & aluum leniens : quale est id quod ex cassiæ fistularis medulla aut tamarindorū pulpa, prunorum & passularum decocto paratur

*Guido
Caulin.
cap. de
crucem
vulne-
ribus.*

162 *De Tumorib. præter naturam,*
ratur addito rhabarbari momento.
Venæ sectio iam apparentibus exā-
thematis est prorsus vitanda. Quod
si in expellendis ad externas par-
tes humoribus natura segnior sit,
decocto in sequentem modum pa-
rato illius motum iuuabimus, vt
foras euocatus humor discutia-
tur.

℞. rad. rusci, asparagi, grami-
nis, apij & sceniculi maceratarum
per diem integrum in vino albo
diluto sing. ℥. j. glycyrrhizæ rasæ
& recentis ℥. β. herbarum cap.
com. oxalidis, vtriusque cichorij &
scabiosæ an. M. j. seminis aspara-
gi, melonum & anisi sing. ℥. β.
caricarum pinguium, passularum
enucleatarum sing. p. x. florum bu-
gloss. viol. sing. p. β. cicer. nig. p. j.
f. decoctio, cape de colatura quart.
v. in quibus dissolue oxysacch.
simp. syr. capillorum ven. & viol.
sing. ℥. ij. β. pulu. elect. triasantali
℥. iij. f. apozema clarificatum &
aromatizatum pro quatuor matu-
tinis.

Solent

Liber I. Cap. XXXIX. 163

Solent post exanthematum eruptionem oculi malè affici : tunc ad repellendum & oculos roborandum , præscribendum erit sequens collyrium.

℞. aquæ rosarum, aq. albuminū ouorum an. ℥. ij. collyrij albi Rhafis caphurati ℥. j. Misce, instillentur guttæ aliquot in magnos oculorum canthos. Gutturis & oris noxæ medebimur gargarismo ex decocto hordei, lentium & diamori confectiōe. Tussi & pulmonum incommodis eclegmate sequenti.


℞. granorum pini recentium in aqua hordei maceratorum ℥. j. grā. pistac. nō rancidorū ℥. vj. pul. diapa-paueris ℥. j. β. elect. diatragac. frig. ℥. ij. penidiorum ℥. i. β. syr. viol. q. s. fiat Eclegma , vtatur frequenter transglutiendo sensim longè à suis partibus.

Post decisam ecthymatum escharā solent in facie mala vestigia & cauæ cicatrices remanere, quibus sequenti medicamento medebimur.

℞. ce

164 *De Tumorib. præter naturam,*

℞. cerusæ cum aq. rosarū ablu-
tæ ʒ. j. lytharg. auri ʒ. ij. cadmix ʒ.
iiij. pul. specierum vnguenti citrini
recenter dispensati ʒ. iiij. pulueris
cannarum adustarum ʒ. j. olei ne-
nuphar. ʒ. iiij. olei ros. ʒ. j. β. ceræ al-
bæ q. s. f. linimentum.



De Epinyctide & Termintho.

C A P. XL.

IN pustularum etiam catalo-
gum Epinyctides & Termin-
thos reponere conuenit. Est Epi-
nyctis pustula perniciofa, subrubra,
cum colore quodammodo liuido,
noctu præcipuè animantem affli-
gens, interdiu non magnopere ex-
crucians, nullo instigante, sed spon-
te exulceratur, subcruetam faciem
emouens. Causam carbunculi simi-
lem tamen habet, nihilominus
nullius est pestilētis cōtagij parti-
ceps. Hæc pustula carbunculo minor
existit, huius quoque conditionis
est Terminthus, à feruido præafsa-
toque sanguine scaturiēs. Termin-
thum

thum aliqui phymatis speciem esse censent, alioth in Auicennas vocauit. Galenus adnascentiam quandam nigram in cruribus præcipue genitam statuit. Huius nomen à figura, coloris, magnitudinisque similitudine, quam cum terebinthorum fructibus habet, deriuatum est. Epinyctides Essere Mauritani Medici nominant.



*De causis & curatione Epinyctidis
& Terminthi.*

C A P. X L I.

CAusæ horum affectuum procatarticae sunt, quæ sanguinis tenuis, aut pituitæ vaporem ad cutem trahunt, qui ad hanc subito expulsus & ab illius densitate retentus tumorem excitat. Sanguis itaque tenuis, vel nitrosa & salsa pituita, quam Auicennas Bauracalem appellat, causa est antecedens & corporea: ex his humoribus confurgens vapor causa est continens.


Affectus ij cum (vt iam diximus)
ali

166 *De Tumorib. præter naturam,*
aliquid cum dothiene & carbun-
culo commune habeant, similibus
fermè præsidiiis profligari possunt.
Quapropter alimenta infrigidante
& astringente qualitate prædita, la-
borantibus Epinyctide à sanguine
tenui profecta, exhibemus, potum
decocti rha obsoniorum consulē-
tes. Acrium, acidorum & falsorum
eduliorum vsus vitari debet. Aluū
emollientes clysteres, atque infri-
gidantes præscribimus, nō præter-
missa venæ sectione, si mittendi sā-
guinis adesse scopos videamus. A
pituita falsa & putri dependente,
hac postposita, phlegmagogū me-
dicamentum propinabimus: quod
ex myrabolanis indis cebulis &
turpeto parari poterit. Post ipsam
euacuationem theriacæ vsus est sa-
lubris. Pro topicis remediis folia
caulium vsurpabimus aut fraxini
folia lenia & aceto mixta, frictio-
nes manus aut aspero panno factæ
ad vaporum digestionem commen-
dantur. Ex vsu etiam erit ex se-
quenti præsidio inunctio.

℥.li

168 *De Tumorib. præter naturam,*
arteriam recurrere.

Galenus arteriæ apertionem
ἀνέυρημα vocavit. Paulus *ἀνέυρημα*
tuumorem esse tactu blandum, pre-
mentibus digitis cedentem, ex san-
guine & spiritu contractū, scripsit:
qui in qualibet corporis parte fieri
potest: cuius causas sequenti capite
aperiemus. Differt etiam à varice,
ut suo loco demonstrabitur.



De Aneurismatis causis.

C A P. XLIII.

FIt *ἀνέυρημα* Chirurgi insci-
tia, nonnunquam arteriam
venæ loco secantis, præser-
tim si cuti aut carni inflictum vul-
nus coagmentum recipiat, ac cica-
trice obducatur, arteria verò hiet,
& sub carne & cute aperta rema-
neat, tunc enim sanguis & spiritus
sensim excreti sub cute colliguntur,
tumoremque faciunt. Interdum à
sanguinis tenuis maxima copia ar-
teriam extendentis & findentis:
non

nonnunquam à sanguine acri & mordaci artefiam per ἀνάβρωσιν aperiēte, tanquam corporea causa excitatur. Non desunt qui contra Galenum, Paulum, Aëtium Antiochenum, & horū asseclas, per hunc affectum non rumpi aperiri que arteriam vel venam scribant.

Vt autem bonorum virorum placita euertant, hac ratione tanquam tutissimo clypeo se muniunt. Si sanguis è vena aut arteria (aiunt) profiliat, cum iam amplius ab suis vasis non contineatur, mox corrumpetur ac putrescet, vel grumofus efficietur, diuersique generis tumorem excitabit, quod fuit ab Hip. in Aphorismis scitè demonstratum.

*Aphor.
20.1.6.*

Potest alia addi ratio. Sanguis qui in propriis conceptaculis amplius non continetur, natiui caloris & floridi coloris iacturam facit, necessario putrescens & abscessum procreat, qui nisi candente ferro, aut pyrotico medicamento aperiatur, gangrænam subiectis partibus

H indu

170 *De Tumorib. præter naturam,*
inducit. Ergo non à fracta aut di-
uisa arteria, sed potius dilatata
à *veue sua* excitabitur.

His cauillis Galenum, & reli-
quos bonos viros ab erroris nota
vindictantes facile respondere po-
terimus. Sanguis si omnino sua
propria vasa relinquat, & in ma-
gnum vel sensilem ventrem se reii-
ciat ab influentis caloris influxu
destitutus, necessario putrescet: sed
in aneurismate, quod ab aperta ar-
teria fit, nō ita ab illius calore, & à
reliquo qui in ipsa continetur san-
guine, est abalienatus, vt ipsius na-
tius calor & color pereat, neque
in tam amplum ventrem est expul-
sus vt putrescat. Fouetur enim à
vitali spiritu in arteria contento,
cū ipsius materiæ adhuc sit con-
tinuus. Nam quamuis diuisa sit ar-
teria, & sanguis tumorem faciens
egrediatur, non tamen, continua
existente quæ arteriam tegit carne
& cute, in amplum spatium sem-
per se ita insinuat vt putrescat, & à
naturæ legibus destituatur.

Aneu

Aneurisma à varice differt, quod varix proprius sit venæ affectus, illud autem arteriæ. Pressus insuper aneurismatis tumor pulsum edit, sed varix nullum, cum venæ otiosis seruis sint similes, arteriæ verò operosis: quarum tumor cum premitur, quæ intus est materia promptè subterfugit. Aneurisma externas partes interdum diuexat, ut manus, pedes, & eas quæ circa iugulum & mammas sunt.

Sæpe internarum partium arterias defatigat, ut pectoris, meseræi, lienis. Quod à me anno à Christo nato quinquagesimo quarto supra millesimum fuit magna multorum admiratione obseruatum. Cum Iohannes Fabri acutissimus & sedulus Palatij Monspelienfis Scriba, præcipuam iuuentutis partem in commestationibus, frequenti atque intempestiuo meracioris vini potu transegisset, cœpit circiter quinquagesimum ætatis annum ægrè respirare, & cordis molestissima palpitatione labora-

172. *De Tumorib. præter naturam,*
re. Ad huius morbi depulsiōem
fuerē non solum à nobis, sed à no-
stræ Academiæ præstātoribus Me-
dicis præscripta varia præsidia.
Quæ cum contumax & peruiçax
morbus ob perseuerantem malam
victus rationem, prorsus contem-
neret, deterius habuit, & transactis
aliquot mensibus quibus Medico-
rum consilio nullo medicamento
usus est, (volebant ij curationis
partem chronici affectus, naturæ
committere) cœpit de illius parte
quæ est sub sinistra homoplata
queri. Inspecta & optimè animad-
uersa doloris sede, tumor insignis
mihi apparuit, tactu mollis & cum
pulsatione, & digitis pressus totus
ferè delitescens, & his ablatis re-
currens. Conieci protinus aneu-
risma esse excitatum à crebra &
diutina cordis palpitatione, nec-
non & sanguinis biliosi copia arte-
rias & replentis, & distendentis.
Erat enim natura ita biliosus, vt à
leuissima procatarctica causa facilè
excandesceret, & veluti furibundus
omnes

omnes è tectis profligare tentaret. Calidorum & siccorum eduliorum vsus, ac generosi vini potus frequens, distemperiem adauxerat. Tumoris non ab omnibus bene cogniti moles, in dies cùm cresceret, duos præstanti doctrina Medicos & me querulæ vxoris precibus in consilium vocauit. Alius cancro hominem detineri, alius œdemate obsessam partem constanter affirmabat. Ego verò alium ab aneurismate affectum esse non posse mordicus sustinebam.

His autem rationibus neque cancerum, neque œdema esse demonstrabam. Cancer ab humore melancholico fit, œdema à pìuita aquosa fluxili & non resiccata. Cancri tumor durus est, rotundus, inæqualis, colore liuescens, aut nigricans, & molesto dolori copulatus, œdematis mollis, digito cedens, & indolens cum colore albidore. Cùm igitur harum notarum nulla in Scribæ tumore reperiretur, iure optimo concludere poteram,

174 *De Tumorib. præter naturam,*
ram, neque cancrum, neque œdema esse. Notæ verò aneurismate illum diuexari promittentes tam perspicuæ erant, vt me fallere minime possent. Nam quamuis hic tumor mollis esset & exigui doloris particeps, foueam in locum digito pressum, recurrente ad arteriam sanguine, non relinquebat. Præterea manifestus arteriæ pulsus percipiebatur, affectus arteriæ nuntius: quod præcedentibus tumoribus non accidit. Admota cordis regioni altera manu, & tumori altera, idem diastoles & systoles motus eodem tempore factus deprehendebatur. Sententiam de hac re meam confirmauit suo acri iudicio Michaël Heroardus præstantissimus Chirurgus, & in corporum dissectionibus maximè exercitatus, qui lynceis oculis tumore probè contemplato, ne latum quidem vnguem à mea opinione discessit.

Cæterum cum hic morbus iam altas radices egisset, essetque deplo-
ratus.

ratus, vitam cum morte commutavit. Vt autem & constitutionis morbi, & eius causæ certiores essemus, tumore tentatam partem dissecuimus, ex qua sanguis copiosus, sed olidus profiliit, quo planè euacuato & deterso, apparuit nobis prima arteria sub corde ex magna ad caput ascendente orta, maximè dilatata & dilacerata. Hæc descendens intercostalium musculorum regionem perreptat. In musculorum spatiis coaceruatus sanguis temporis diuturnitate putrescens, illius loci vertebam & costam ita labefactavit, ut à nobis cariosa visa sit. Magna & perseverans cordis palpitatio, sanguinis arterialis accedente copia, paulò superiùs recensitam arteriam dilaceravit, & aneurisma procreavit.

Constat igitur aneurisma à fracta & dilacerata arteria nonnunquam fieri: quæ si insignis sit, qualis illa fuit, curationem non admittit, ut disertè à Paulo fuit demonstratum. Neque silentio præ-

176 *De Tumorib. præter naturam,*
terire decreui, quò melius meam
sententiam firmem, quod superio-
ribus annis vidi. Quidam Sabau-
diæ nobilis recuperandæ salutis
ergò huc venit laborans tumore
magno pedis sinistri, suram vestien-
tes musculos detinente. Erat hic
tumor mollis & aneurismatis om-
nia indicia habens. Quem huius
Ciuitatis Chirurgus in artis operi-
bus parum exercitatus, admotis
priùs digerentibus medicamentis,
demum pus mouentibus, vt qui
hominem cedemate laborare exi-
stimaret candenti ferro secuit: se-
ctionem mox sequuta est talis hæ-
morrhagia vt sanguis ἐξέροε, &
cum saltu exiens crebras ἀποψυ-
χίας excitarit. Attonitus rei noui-
tate Chirurgus, puris potiùs quàm
sanguinis eruptionem expectans,
vt magnum sanguinis profluuium
sisteret, apocrousticis & maximè re-
frigidantibus remediis affectam
partem muniuit, meque cum alio
Chirurgo sequenti die accersiri
iussit, reformidans ne assiduo ani-
mi

mi deliquio detentus animam expiraret. Hominis pulsus erat parvus, languidus, & ex longis intervallis factus, ac sæpe intercidens, circa frontem & cervicem frigidi sudores versabantur, facies decolor & Hippocratica apparebat, quamvis iuuenis adhuc esset, vegeto & quadrato corpore. Pedis vincula copioso cruore madentia tollere, ut vulneratam partem nobis ostenderet, pertimescebat: & cum id facere tentaret, rursus tam magnum sanguinis profluvium rediit, ut non solum hominem cum Orco certare, sed iam è vita discessisse nostrum nemo dubitaret.

Contemplato probè vulnere, nostris conspectibus se obtulit pulsans arteria fracta atque dilacerata sanguinem tenuem euomens. Hæc ab arteria magna cum coniuge vena inferiori spinalis medullæ regioni incumbente in duos ramos ad poplitem tendentes diuarcata, ortum accipit.

Tandem perseverante hæmor-

H s rha

178 *De Tumorib. prater naturam,*

rhagia quam neque candente ferro, neque pyroticis medicamentis sistere ullus poterat ob magnam arteriæ dilatationem, vitam cum sâguine fudit. Omnibus itaque tam notum est quàm quod notissimum, non solum à dilatata, sed aperta & rupta arteria aneurisma fieri: ad-
 aperta enim arteriæ affectus aneurisma Galeno dicitur. Neq; tacendū hoc loco censeo quod 11. Feb. An. 1567. in nobili quodam Britone fuit observatum. D. de la Case nobilis Brito biliosus natura & sanguineus ex assumpto olim (vt narrabat) veneno, laboravit aliquot annos dyspnœa. Cùm verò à duobus ferè mensibus sanguinem tussiendo reiecisset floridum spumosumque ab initio per intervalla 12. vel 15. dierum, postea verò trium aut quatuor, coepit tandem sentire circa mediam sterni regionem & ex aduerso in mediis omoplatis, intensissimum dolorem qui vix intermittebat.


Postremò valde consumptus & affi

lib. de
 Tumo.
 prater-
 na.

assidua febricula laborans, cum se meliusculè habere diceret, inter prandendum suborta tussi, ex sanguinis largiore quàm antea reiectione mox suffocatus est. Illius iussu apertus fuit thorax, sinistra pars aqua crocea fuit plena, quæ non ita multo post extracta concrevit mellis instar. Ex eadem parte pulmo fuit subniger & quasi retorridus: ex altera subcineritius, flaccidus & spumofus. Pulmone extracto simul cum corde & suis vasis, deprehensa est caries in tribus vertebrais dorsi corde superioribus, qua incumbibat aorta ascendens.

Hæc verò tam ampliter dilatata fuit: ex aneurismate, ut pugnū crassissimum exciperet mox à cordis egressu, & eiusdem sub pulmonibus incessu. Ea fuit referata, velut grumis aut carne corrupta maximis portionibus, cui simile quippiam die præcedenti per tussim cum sanguine reiecerat. Mirum quanta fuerit plenitas venæ

180 *De Tumorib. præter naturam,*
cauæ ascendentis & iugularium,
quasi maxima pars sanguinis in
iis partibus contineretur, eò al-
lecti ex contentione quam fre-
quentissima difficillimaque tussis
efficiebat.




De Aneurismatis indicis.

C A P. XLIV.

Aneurisma consequentes no-
tæ sunt, tumor, sæpe par-
uus, nonnumquam magnus,
indolens, concolor, maximè mol-
lis & spongiositatis cuiusdā ideam
præferens, & ita pressioni digito-
rum cedens, vt omnino euanescere
videatur; & rursus amotis digitis
promptè rediens, vt superiori capi-
te ostendimus. Hoc in aneurisma-
te à sola arteriæ dilatatione orto
euenit. Sed in eo quod à vulnera-
ta arteria fit, coalescente iam cute
tumor non adeo mollis apparet: eo
quod tumorem extendens sanguis
qui iam in grumos degenerauit,
spiritu est copiosior, manifesta
insu

insuper in tumore percipitur pulsatio, doloris expers. Sæpe ex aneurismate sphacelus oritur.



De Aneurismatis curatione.

C A P. XLV.

Aneurismatis guttur, aut alas, aut caput infestantis curatio deplorata censetur, cui ne mali Medici nomen subeamus manus non est admonenda. Nam si secetur tumor, tanta sanguinis & vitalis spiritus eruptio fit, ut æger sæpe in Medicorum manibus deficiat. Curationem etiam contemnit id, quod insignibus & magnorum musculorum spatia perrepantibus arteriis fit. Curari autem potest, quod à dilatata parua arteria, vel à vulnerata, adglutinata tamē carne & cute ipsam tegēte scaturit, ut ex Gal. historia perspicuū euadit. Dilatatae arteriæ adstringentia emplastra sunt admouenda, qualia sunt quæ ex malicorio, acacia, hypocisthide, gallis, rosis, rhucoria

182 *De Tumorib. præter naturam,*
coriacorum, baccis & foliis myrti,
pini cortice, lemnio sigillo, aloë, la-
pide hæmatite, manna & thuris
cortice parantur. Topica hæc re-
media non sunt vsurpanda, nisi prius
sit toti corpori consultum. Arcta
ligatura vincienda est affecta pars
apposito prius emplastro adstrin-
gente. Chirurgia etiam curari po-
test, præsertim quando est dilacera-
ta arteria, nouacula carne dete-
genda & duobus funiculis qui non
facile putrescant, tum in superiore,
tum inferiore parte firmiter est li-
ganda: quod autem medium est &
ruprum per transversum præscin-
dere, oportet. Demum aliorum
vulnerum more aggredienda erit
agglutinatio.



De Batracho siue Ranula.

C A P. XLVI.


Batrachus tumor inflamma-
tioni similis, sub lingua erū-
pens pueros maximè defatigare so-
litus, quem Ranunculum aliqui
vocant,

vocant, id est, carnosum tumorem, oblongum, sub lingua genitum, illiusque functiones impediens, & figuram alterius linguae retinentem, fit à sanguine, venas sub lingua sitas (qua raninas vocant) & eius carnem spongiosam replente. Cum autem sit morbus in numero adaucto præter naturam, sui ablationem efflagitat. Quapropter habitus prius totius corporis ratione, digerentibus atque astringentibus medicamentis illum demoliri oportebit. Qualia sunt malicorium origanum resiccatum, sabina combusta, hermodactylorum puluis, tragacanthum, pastilli Andronis, albumine ouorum excipiantur, & sub lingua detineantur, cauendum ne horum aliquid transglutiatur.

Quod si horum medicaminum usus nihil conferat, ad valentiora erit transeundum, atque ad chirurgiam properandum, & nouacula optimè secante post exactam à reliquis partibus separationem dissecare erit opportunum. Secto loco calcitin

184 *De Tumorib. præter naturam,*
calcitin admouebimus, ad hæmor-
rhagiam sistendam: posca postea
colluatur, vel vinò in quo decocta
sit myrrha. Optimum etiam reme-
dium est venas sub lingua diuide-
re. Quod si ranulæ color liuidus
vel niger appareat, & sensus sit ex-
pers, cum cancræ naturam oleat,
ferro non erit irritanda, sed potius
mitioribus medicamentis lenien-
da. Est enim ab Hippocr. scriptum,
cancros ocultos non curare, &c.

Aphor.
38. l. 6.



De Parulide & Epulide.

C A P. XLVII.

QUamuis horum affectuum
nomina similia esse videan-
tur, diuersas nihilominus
res significant. Est enim Parulis in-
flammatio circa gingiuarum ali-
quam partem, cum tumore facta,
quæ vbi non dissoluitur suppura-
tur. Epulis verò iuxta anteriorem
dentem molarem hyperfarcorsis
luxuriante partis alimento oborta.
Paruli

Parulidem epulis sequitur. Oritur parulis iuxta quamlibet gingiuā, illius nomenclatura hoc indicante. Auicennas Parulidem apostema in gingiuis cauum & profundum suo idiomate Berules vocauit, quod quando medicamentis digeri non potest purulentum euadit. Carnosos tumores Parulidem, Epulidem & Thymum Gal. vocauit.

*lib. de
Tumo.
præter
natur.*

De Parulidis & Epulidis causis,
indiciis & curatione.


C A P. XLVIII.

A Sanguine ad gingiuas fluente fit parulis, phlegmonem gignente. Epulis etiam à sanguine in carnosum tumorem verso excitatur. Epulidi quandoque copulatur febris cum dolore. Affectus ij sensibus facile deprehenduntur, ob id magna perscrutatione non egent. Inflammatio enim à sanguine excitata haud difficile visu & tactu deprehenditur. In profliganda

186 *De Tumorib. prater naturam,*
ganda parulide venam tundemus,
vel purgatorium medicamen por-
rigemus (si vitioso succo corpus
sit oneratum) ne ad gingivarum la-
xam carnem defluat sanguis & de-
fluxus putrescat , & in pus conuer-
sus abscessum faciat. Post sectam
venam , si corpus sit plethoricum,
humorem digerentes oris collutio-
nes præscribemus: quales sunt quæ
ex lini seminis , aut hordei integri
decocto, mulla calida , œnomelite
parantur. Quod si parulis discutiē-
bus medicamentis non pareat , ca-
rica pinguis tosta & calida , quo
melius inflammationem commit-
tens humor suppuretur, ore erit de-
tinenda. Iam suppuratum tumo-
rem acuto venæ incisorio rumpe-
mus, & ex linteoli rasura confectā
turundam melle rosato, vel aliquo
moderatè detergente medicamen-
to saturatam sectioni imponemus.
Epulis ex parulide progenita sic-
cis & carnem exedentibus medica-
mētis, post illorum vsū quæ proflī-
gādæ parulidi sunt cōgrua, erit ex-
pugnā

pugnanda. Calcitin, fori, cadmiam,
 æs vstum Paulus & Aërius com- ca. 49.
 mendant. Sed cum illa medicamē- 3. lib.
 ta in ventriculum possint facile de-
 ferri suspecta habentur, quorum
 loco combusti aluminis & gallæ
 vsus tutior erit.

Quod si mādibulæ interior pars
 læsa sit, ac cum molestia os aperiat,
 totam maxillam cataplasmate ex
 lini semine & aqua mulsa simul
 coctis integemus, anthera arida vl-
 ceri erit inducenda. Magnam ve-
 rò putrilaginem gingiuis obortam
 si ad id dicatis medicamentis cu-
 rari non possit, candenti ferro
 aduremus.




De Thymo & Condylomatis.

C A P. XLIX.

THymus carnosum est ru-
 berculum (vt diximus) dolo-
 ris ferè expers, nunc in glā-
 de, nunc in præputio, nunc manuū
 & pedum plantis, nunc scēminarū
 puden

188 *De Tumorib. præter naturam,*
 pudendis concrefcens, ac fanguinẽ
 quandoque fundens. Cui ob eam
 quam cum thymĩ corymbis simili-
 tudinem habet nomen tale fuit in-
 ditum Thymũ Auicennas ſub vteri
 bothore, moro & clauo cõprehen-
 dit, quem falſò inter verrucas re-
 poſuit. Nonnũquam per vteri
 ambitum extolluntur tubercula
 quædam fanguinem fundentia, quę
 à ſimilitudine extremorum in pu-
 gno clauſo in quatuor digitis no-
 dorum à Græcis κονδυλίματα vo-
 cantur. Hæc hæmorrhoidibus anũ
 defatigantibus, respondent, qua-
 rum ſæpe ſunt cauſæ.



*De Thymi & Condylomatum
 cauſis & curatione.*

C A P. L.

Hymorum & condylo-
 matum cauſa corporea,
 eſt ſanguis craſſus in vte-
 ri ceruice, aut ani circu-
 lo coaceruatus. In thymo eſt emi-
 nentia

nentia quædam rubra à reliqua cute recedens. In condylomatis sunt rugarum quæ circa os vteri, aut extrema recti intestini parte existunt excrescentiæ, quæ inflammationem dum perpetiuntur, incuruantur, & induratur. Sæpe speculo muliebribus pudendis appposito, & ipsa vulva dilatata vterque affectus deprehenditur. Thymus si pusillus & mitis sit, ex millefollij, parietariæ, simul tritis cataplasmate addita salis parua quantitate sæpe curatur.

Quod si magnus sit, ad chirurgiâ properandum erit, & instrumento, quod volsellâ vocant, à basi amputabimus, & acidum medicamentum sistendo sanguini idoneum apponemus. Quale est quod ex argenti spuma, leuigata galla, alumine scisso, amylo, bolo armenico, cortice thuris & ouorum candido conficitur. Pertinaci autem ac malefico thymo cauterium adigemus, & ex eo progenitam escharam butyro vel tetrapharmaco depellemus. Colleticis tandem præsidii illum curabi

190 *De Tumorib. præter naturam,*
curabimus. Condyloma, quod non-
nunquam propter acrium humorū
defluxum inflammationem ipsam-
que extensionem, rhagades in mus-
culo anum claudente, sphincterem
vocant, gignit, sequentia remedia
exposcit.

℥. gūmi ammoniaci, thuris, lapi-
dis hæmatitis sing. ʒ. iiij. aluminis,
croci, gallarū an. ʒ. ij. terebinthinæ
ʒ. j. olei ros. ʒ. iiij. ceræ citrinæ q. s.
fiat vnguentum liquidum. Aliud.

℥. thuris ʒ. vj. aluminis scissilis
ʒ. iiij. cerusæ ʒ. ij. β. croci ʒ. β. aloës
ʒ. ij. æsopi ʒ. j. olei chamom. ʒ. iiij.
ceræ q. s. fiat vnguentum. Vel sic.

℥. hermodactylorum vstorum,
summitatum myrti vstarum sing.
ʒ. ij. sabinæ resiccatae ʒ. iiij. chalciti-
dis, aluminis scissi sing. ʒ. iiij. olei
citoniorum ʒ. iiij. ceræ q. s. fiat vn-
guentum, adde auripigmenti rubri
ʒ. j. Quod si his remediis condylo-
mata non cedant, quæ in conspe-
ctum veniunt aliquo instrumento
comprehensa ferramenti acie quod
ex dimidio spatham refert, excin-
demus.

demus. leuigatam gallam aut scissum alumen apponemus. Vel filo aut equino pilo arcte basim vinciemus donec sponte decidant. Nucces cum absynthij semine, & rubi succum cum rosaceo cerato, ac aloës puluerem inspersum condylomata curare credit Plinius 23. lib. nat. historiæ.



*De Tumoribus indiscriminatim
omnes corporis partes obfi-
dentibus, quos Auicennas
Essere vocat.*

C A P. L I.

Multi falsò existimarunt Arabum Esseras Græcorū Epinyctidibus communes esse: quod Esseræ præsertim pituitosæ noctu magis & oriantur, & hominē infestent quàm interdiu: sed hoc falsum esse vtriusque mali figura demonstrat. Nam dicente Paulo, Epinyctides vlcuscula sunt sua spō-
te

lib. 4-
cap. 10.

192 *De Tumorib. præter naturam,*
te erumpentia pustularum specie &
subrubra, quibus apertis cruenta san-
ies defluit, per diemque non ma-
gnopere excruciant: per noctem
verò graui magis quàm præ ratio-
ne vlceris, dolore torquent, Essera
verò pustulæ plures sunt vaporu-
lentæ, puriginosæ, ad aliquam rube-
dinem procliues, & rarissimè in vl-
cus degenerantes.

Præterea illos existimamus in-
ter se differre morbos quorum cu-
ratio varia est. Nam vt ex Auicen-
na liquet, alia est Epinyctidum, alia
Esserarum, vt inferiùs ostendemus,
medela. Adde quòd cùm illæ no-
ctu excitètur aut moueàtur, ab Es-
seris distingui possint. Dicemus igitur
Esseras esse pustulas, vel tuber-
cula repentè per totum corpus ap-
parentia cum putritu, similia apum
puncturis, vel quæ ex vrticarum
crebro confictu fiunt. Non desunt
qui ad exanthematum classẽ Es-
seras reuocent, de quibus nihil à
Galeno & Paulo definitum com-
peritur.

De



De Esserarum causis & indicis.


C A P. LII.

EXcitatur Esseræ sæpius à sanguinis satis tenuis, rariùs à pituitæ falsæ vaporibus ad cutem protrusis. Hi enim inter cutem & carnem contenti tumores fabarum magnitudinem æquantes cum pruritu excitant. Procatarctica causæ corporeas mouere possunt, vt quæ à sanguine tenui aut pituita falsa vaporem mouent, & ad cutem propellunt, qui in ea retentus tumores procreat.

Hyeme & in frigidis regionibus magis quàm calidis accidit. Quia frigiditas cutim condensat & transpirationem impedit. Essera à sanguinis tenuis vapore excitata magis rubet, magisque pruriginosa existit, sed minis quæ à pituita, præsertim insulsa. Esseras vlcerosa lassitudo vel phlegmonosa præcedere solet: quemadmodum eæ fe-

I bres

194 *De Tumorib. præter naturam,*
bres tertianas intermittentes aut
continuas anteire. Reliquæ notæ
Efferas indicantes cum sensum non
lateant altiore scrutinio minimè
egent.



De Efferatum curatione.

C A P. LIII.

CVM soleat hic affectus à co-
pia vaporulenti sanguinis
procreari, curationem præ-
scriptâ priùs infrigidante atque hu-
mectante diætâ, qualis est quæ ter-
tianis intermittentibus vel conti-
nuis instituitur, à venæ sectione,
supposito priùs clysmate, vel pro-
pinato eccoprotico medicamento,
auspicabimur, tantum sanguinis
detrahentes quantum ætas & la-
borantis natura perferre possunt,
non circa initia, sed in incremento,
& quando iam multas corporis
partes occupat.

Mox post sectam venam præscri-
bendum erit cholagogum medica-
men

mentum ex thamarindorum pulpa, myrobalanis citreis, rhabarbaro, medulla cassiæ fistularis, fructuum decocto paratum. Mouendi postea erunt sudores, iucundæ frictiones quoque adhibendæ, ut vaporulenta materia per insensilem transpiratum euacuetur.

Cum hæc scriberem venit quidam Aurelianensis mercator, me obnixè rogans ut nulla interposita mora cognatum quendam itineris socium in publico diuersorio decumbentem inuiserem. Iuuenem carnosum vix vigesimum annum prætergressum innumerabilibus escis obsessum reperi, cum rubicunda facie, & siti ob febrem tertianam inexhausta. Quem cum rogassem an præsentiret in esseris pruritum. Protinus respondit, se vehementissimo calore & punctiombus, ac si acutis flagris cæderetur distorqueri, meamque ne denegarem operam anxius orabat. Misertus illius molestæ ægritudinis, supponi aluum emollientem & eluen-

196 *De Tum.pr.na.Lib.I.Cap. 53.*
tem clysterem mane iussi. Tandem
circiter horam quartam pomeri-
dianam secta fuit illi vena, missæ
sanguinis 3. vij. Nocte accedente,
reuulsione facta & vaporibus in
cute comprehensis discussis, à pru-
ritu & punctiõibus immodico-
que calore planè liberatus securus
in vtramque aurem dormiuit. Pur-
gatoque postea corpore à febre
fuit liberatus.

*Finis Libri primi de Tumoribus
præter naturam.*

D E



DE
AGNOSCENDIS
CVRANDISQVE
TVMORIBVS
præter naturam.

Auctore

ANTONIO SAPORTA
Doctore Medico.

LIBER SECVNDVS.

*De inflammationibus à bilioso
humore excitatis.*

C A P. I.



BSOLVTO de pro-
priè dicta Phlegmo-
ne, ac de aliis tumori-
bus præter naturam à
sâguine profectis ser-
mone, properandum nunc est ad

I 3


alias

198 *De Tumorib. præter naturam,*
alias inflammationum species, quæ
cum Phlegmone non exiguum
commercium habent : eæ autem à
sanguine bilioso , aut à bile à san-
guinis sodalitis secreta scaturiunt.
A sanguine & flava bile iusto cali-
dioribus , vel à feruido & substan-
tia tenuissimo sanguine fit erysipe-
las, quod ignem sacrum appellant.
Hoc parvi & non impellentis tu-
moris , alterum magis perspicui
particeps existit. A nonnullis Ery-
thropelas, à rubore scilicet dicitur,
quod pars erysipellate tentata rubo-
re non vacet. Spinam Avicennas
vocavit , similitudine usus , quod
biliosus humor partem vellicet &
pungat spinæ & aculei more. Ali-
qui erysipelas quod cuti hæreat
appellant, sed hoc neque affectum
locum, nec efficientem causam Gal.
2. meth. autore significat.

Gal. 13.
metho.

Porro erysipelas duplex esse ex
Galeni ratiociniis constat. Alterum
exquisitum & legitimum , alterum
illegitimum. Legitimum ex sincera
bile , illegitimum ex alieni humo-
ris

ris permixtione scaturit, cuius tres sunt species. Rursus legitimum duplex, aliud vlceris experts, aliud vlceri copulatum ad naturam herpetis vergens, de quo & eius differentiis inferiùs disseremus.



De Erysipelatum causis.

C A P. I I.

QUamuis causæ prægressæ potiùs Phlegmonas quàm Erysipelata excitent : nihilominus hæc procreant, quæcunque iecur immodicè calfaciunt, biliosumque sanguinem gignunt, vt calida acriaque edulia, vel partem suo vehementi calore labefactant. Qualia sunt asperæ & assiduæ frictiones, Solis vehemens calor, acris & pyrotici medicamenti vsus creber. Corporeæ verò sunt biliosi succi in partem delabentes, siue sint sanguini mixti, siue sinceri, multitudine potiùs quàm noxia qualitate infensi. Cùm autem sua tenuitate

200 *De Tumorib. præter naturam,*
 in carne non subsistant, sed illam
 peruadant & à compacta duraque
 cute diffluere sudoris ritu pro-
 hibiti in hac retineantur; his de
 causis potius vtriusque cutis quàm
 carnis affectus iudicatur erysipe-
 las, quod aliquando illam exulce-
 rat, aliquando solo rubore & ardo-
 re sine exulceratione est molestum.



De Erysipelatis indicitiis.

C A P. III.

Huius indicia sunt, vrens ca-
 lor, inflammatae partis mor-
 dicatio, tumor minimè per-
 spicuus, color ex rubro flauescens,
 qui digitorum pressu subterfugit
 statimque redit, dolor acutus &
 pulsus magno priuatus, faciem &
 corporis partes sublimiores potius
 quàm inferiores impetit. Nonnun-
 quam exta, vt cerebrum eiusque
 velamina, pulmones, vterum graui-
 ter afficit. In osse denudato triste
 prognosticum promittit. Extra dif-
 fusum

Hippo.
 Apho.
 19.7.1.

fusum si intrò vertatur, magnum malum portendit. Illegitimi notæ à tumore & magis remisso feruore desumuntur, quibus omnibus addere oportet ætatem, cæli statum & eam quæ præcessit victus rationem. Exquisitum erysipelas magna ex parte digestionem curatur; quatuor habet tempora, varia prælidia efflagitantia; animantem alternis diebus magis infestat, cum humoris à quo originem trahit analogiam sequatur. Suppuratum non suppurato deterius, & capiti oboriens periculo non vacat, Celso autore.

Apher.
25.6.1.

Guido
Caulia.
cap. de
Aposte.
perio-
du.
li. 5. ca.
26. &
28.



De Erysipelatis exquisiti curatione.

C A P. I V.

Cum vera Phlegmone cum exquisito erysipelate multa communia habeat, horum affectuum curatio non omnino dissimilis est statuenda. Erysipelas igitur exquisitum quatuor observatis

I s sco

202 *De Tumorib. præter naturam*
scopis profligabitur. Quorum pri-
mus est, vt laboranti frigidam &
humidam victus rationem præscri-
bamus. Quapropter eligendus erit
aër frigidus & humidus, aërisque
temperamento respondens regio.
Rosacea aqua aceto mixta, vel fri-
gida sola herbisue infrigidantibus,
frigidis floribus cubiculi pau-
imenta aspergenda: lactuca, cicho-
rio utroque, lupulo, oxalide, bu-
glossa, borragine utendum. Orizæ
(quamvis ea calida sit) amyli, ptisa-
næ non negligendus vsus. Talis (vt
breuiter concludam) est victus ad-
ministrandus, qualem tertianæ ex-
quisitæ conferre constat. Immode-
rata tum repletio, tum inanitio no-
xia, ipsaque inedia, præsertim si pi-
crocholos naturâ æger sit. Furori,
iræ, & aliis animæ pathematis san-
guinem calfacientibus minimè in-
dulgendum. Noxij labores, aduer-
sæ iuges vigiliæ, ac maximè con-
traria Venus.

Secundus scopus nos monet, vt
defluentem in locum affectum hu-
morem

morem reuellamus & euacuemus, quod sæpe cholagogis, nonnunquam venæ sectione, aliquando acris & acuto clysmate fit. Nam si morbus sit vehemens, & totius corporis habitus biliosus, alterantibus & purgantibus medicamentis erit vtendum. Quod si affectus sit exiguus, & corpus minimè biliosum, clysteris acris & acuti vsu solo contenti esse debemus.

Nec oportet aliquem existimare Pauli sententiam nostro & Galeni decreto contrariam esse, qui in erysipellate faciem distorquente venæ sectionem commendat, quam Gal. spernere est visus. Paulus enim ca. 21. 4. li. & cels. l. 5. ca. 26. de phlegmonoso erysipellate loquutus est. At Gal. de exquisito, cui purgatio venæ sectione est salubrior, ob rationes ab eo traditas. Iniiciatur itaque sequens clyster antequam alia præsidia vsurpentur, præsertim si astricta sit aluus.

℞. Maluæ, viol. althææ cum rad. fol. lactucæ, cucurbitæ an. M. j. quatuor sem. frig. ma. contusorum

I 6 sing.

204 *De Tumorib. præter naturam,*
sing. 3. ij. prunorum dulcium, passularum exacinatarum sing. pa. xij. florū buglos. viol. nymphaeæ sing. p. j. fiat decoct. Et in colaturæ quart. v. dissolue cassiæ à siliqua nuperime euulsæ 3. j. Diaprun. simpl. 3. β. olei viol. 3. iij. mellis viol. sacchari rub. sing. quart. β. fiat clyster, supponatur.

Si adeò morosus sit æger, ut clysterem respuat, præscribenda erit sequens medicata potio.

℞. Foliorum utriusque buglosi, utriusque cichorii, extremitatum lupuli, salictarij, fumariæ sing. M. β. pulpæ tamarindorum recentium 3. vj. passularum exacinatarum & prunorum dulcium sing. pa. viij. florū buglos. viol. sing. p. j. β. fiat decoctio in aqua hordei perfectè cocti. cape de colatura 3. iij. in quibus dissolue catholici 3. β. diaprun. solut. 3. ij. syr. ros. solut. 3. j. β. misce, fiat potio.

Si siti magna prematur, sequenti præsidio utetur.

℞. Conseruæ florū cichorii, conf. viol.

viol. sing. \mathfrak{z} . j. confer. acetosæ \mathfrak{z} . vj.
confer. rad. buglossi \mathfrak{z} . β . pulu. elect.
triasantali \mathfrak{z} . iiij. pulueris diarho-
don abbatis \mathfrak{z} . j. sacchari albissimi
q. s. fiat conditum auro cooper-
tum, vtatur cum aqua fontis tem-
pore sitis.

Nonnunquam Erysipelas phle-
gmonosū esse iudicamus, ad cuius
depulsionem, post iniectum cly-
sterem paulo superius præscriptū,
vel deuoratum eccoproticum me-
dicamentum ex medulla filiquæ
Ægyptiacæ, acetosis dactylis, fru-
ctuum decocto paratum, secunda
erit oppositæ partis vena, seruata
semper rectitudine, mittendæque
sanguinis minor copia quàm in
phlegmone vera.

Tertius scopus apocrousticorū,
& eorum quæ phlegmonæ congrua
sunt vsu perficitur. Frigidioribus
autem in principio, & non admodū
adstringentibus, magna enim ad-
strictio Erysipelata lædit; vt. quæ
calorem, ipsorum, cutem densando
concludat, obseruatis semper his
regulis

206. *De Tumorib. præter naturam,*
regulis quæ ca. de phlegmones cu-
ratione traditæ sunt. Præsidium ve-
rò huic negotio vtile in sequentem
modum parabitur.

℥. succi plantag. succi solani,
vmbilici veneris, semperuiui, vuæ
omphacis ad aliorum succorū at-
tenuationem sing. ℥. iij. misce, linatur
affecta pars, admoueatur actu frigi-
da. Frigidæ perfusionem Auicennas
laudat. Vel sic.

℥. aquæ fontanæ ℥. j. aceti for-
tissimi ℥. iij. agitentur simul for-
titer. Vel sic.

℥. succi palustris lenticulæ, suc-
ci lactucæ, succi endiuix, solani,
psyllij, alterci an. ℥. iij. vtere vt di-
ctum est.

Reliqua medicamenta apocrou-
stica quæ phlegmones initio vsur-
pantur, profligando Erysipelati sunt
opportuna; sed hæc frigidiora &
humidiora & sine adstrictione, alia
minus frigida, sed sicciora esse de-
bent. Et quemadmodum à sangui-
ne probo profectæ inflammationi
euacuatio magis est necessaria, ita

Erysi

Erysipelati alteratio commodior. Celsus cerusam aut cimoliam ^{lib. 5.} terram solani succo, aquaue pluuiali ^{cap. 26.} exceptam probat. Multi fœlicibus successibus cerato albo Galeni vtuntur. Sæpe Erysipelas ex intempestuo repellentium medicamentorum usu in scirrhum degenerat. Infrigidationis terminus esse debet coloris mutatio. Quoties enim infrigidantium remediorum opera pars liuorem contrahit, ea prius leniter scarificata & aqua calida sponsa lota, ad digerentia migrare oportebit, imponendumque ex hordeacea & fabacea farina cataplasma calidum, vel ceratum aliquod digerendi vim obtinens. Vtile existimatur id quod ex cerato rosaceo calcis & sulphuris momento fit. Aëtius brassicam cum polenta ^{cap. 60.} illitam, aut hirundinum nidum ^{lib. 14.} tritum, cribratum & melle mixtum, ad faciei præsertim Erysipelata, scribit.

Pro variis Erysipelatis temporibus, variis modis sunt præscribenda

208 *De Tumorib. præter naturam*,
da medicamenta, apocroustica nõ-
nunquam digerentibus inæquali-
ter, sæpe æqualiter misceri debent,
interdum sola digerentia sunt vsur-
panda. Ulcerato Erysipelati se-
quens præsidium præscribi debet.

℞. plumbi vsti aqua fontana di-
ligenter loti ℥. iiij. collyrij albi
Rhasis ʒ. j. β. caphuræ ʒ. β. pom-
pholis ʒ. ij. olei rosati omphacini
ʒ. iiij. ceræ albę parum. fiat vnguen-
tum molle.

Ad quartum scopum accedentes,
symptomata quæ huic morbo co-
pulari solent, lenire fas est. Quæ
2. ad
Glanc. interdum, docente Galeno, tam
molesta sunt, vt potiùs causæ mor-
bum adaugentis rationem quàm
Guido
Cau. c. verorum symptomatum obtineant.
de eu. In inflammationibus maximè re-
phlegm. formidandus est dolor, docente
Galeno, quem si anodynis lenire
nequeamus ad narcotica transeun-
dum erit, tamen illa sua vehe-
menti frigiditate sunt noxia, illo-
rum nihilominus vsus non est con-
temnendus: nam præstat malam
illam

illam qualitatē membro cōmunicare, quā perpeti vt homo doloribus confectus miserē intereat, vt præcedenti libro ostensum fuit. Erit itaque in sequentem modum parandum medicamentum.

℥. vnguenti populei ℥. iij. sem. alterci diligenter contusi ℥. j. croci ℥. β. olei de sem. cucurbitæ, lactucæ aut seminis papau. albi ℥. ij. misce.

Aliis Erysipelatis speciebus mista quoad fieri potest curatio est adhibenda, atque ei quod magis superat resistendum,




De Herpete.

C A P. V.

EΡΠΗΣ & à symptomate, & à serpente bestia nomen adeptus, per summam cutem serpit, quamuis hoc aliquibus aliis affectibus sit commune: modò hanc eius partem, modò proximā occupat, quod semper priore laborante

210 *De Tumorib. præternaturam,*
 rante perſanata propinquâ eius la-
 bem excipiat: nō ſecus quàm ignis
 qui proxima quæque depaſcitur,
 vbi ea quæ prius accenſa erant de-
 ſiciente iam idonea materia, ex-
 tinguntur. Magnum cum Ery-
 ſipelate præſertim vlcerato com-
 mercium habet, ſola humoris te-
 nuitate ab illo discrepans. Qui
 ſimpliciter herpes dicitur generis
 nomen obtinet, duas ſub ſe ſpe-
 cies complectitur, quarum altera
 herpes *νεγξις*, altera eſthiomenos
 dicitur, ſola humoris tenuitate,
 vt infrà docebimus, à Cancro dif-
 ferens.

Gal. 2.
ad Gl.



De Herpetes cauſis & indiciiſ.

C A P. VI.

H Erpetū cauſæ prægreſſæ ſūt
 ſimiles iis quæ Eryſipelata
 cōmittere ſolent. Nā herpes
 ab Eryſipelate ſola tantum humo-
 ris tenuitate differt: Eſt enim ad-
 modum tenuis humor, qui herpe-
 tem

tem generis nomen obtinentem gignit, adeò certè vt non solùm omnes internas partes carnosam substantiam adeptas transeat, sed etiam cutim ipsam ad summam vsque cuticulam; solàmque propterea quod in ea remoratur erodit atque excedit, nam si sudoris vice transiret, minimè vlcus excitaret. Herpes miliaris propter eam quam cum milio similitudinem habet, sic dictus, à bili & pituita scaturiens pustulas exiguas milio similes facit, quæ mox in vlcus non abeunt, sed interposito spatio.

Herpes esthiomenus à feruida bile sincera & à flammeo calore crassiorē substantiam nacta, fit. Non solùm cutim, sed subiectam carnē exulcerat, formicam ambulatiuam Auicē. nōminis similitudine deceptus vocauit, herpeti quod myrmecis verrucis sessilibus proprium est ascribens. Sub herpete Hippocrates tertio Epidemiōn comprehendisse visus est affectum pueris familiarem, quem Exanthema Græci,

212 *De Tumorib. præter naturam,*
Græci ; morbillum Latini vocant,
de quo capite superioris libri fuit
disputatum.

Ab ulcerato Erysipelate Herpes
differt , quod Erysipelas conspicua
fluxione subitò emergat : Herpes
sensim multoque tempore. Herpe-
tis pustulæ aridæ sunt , è quibus
ruptis nec pus, nec sanies exit: Ery-
sipelatis magnæ, exulceratæ & hu-
midæ saniem effundentes, Herpes
cum pruritu, Erysipelas cum dolo-
re & ardore , herpes diutinus est
morbus & febris expers, Erysipelas
præceps , cuius febris asseda est, &
breui temporis curriculo curatur.



De Herpetis curatione.

C A P. VII.

Herpetis simpliciter dicti cu-
ratio non alia ratione ab Ery-
sipelatis curatione differt, nisi quod
Erysipelas præfertim circa initia
infrigidantibus & humectantibus
remediis eget : Herpes infrigi-
dantibus

dantibus & siccantibus. Nam docente Hippocrate, cū humiditas vlcera sordidiora efficiat, siccis præsidiiis sunt profliganda. Nec sunt topica præsidia, vt diximus, vsurpanda, nisi prius toti corpori sit consultum. At herpetis excedentis curatio quatuor perficietur scopis.

Quorum primus in ea victus ratione consistit, quæ Erysipelati, vel tertiana febre laborantibus est opportuna, de qua cap. 4. egimus. Secundus considerandam defluentis humoris tum copiam, tum crassitudinis, tenuitatis modum obseruandum suadet. Nam si protinus vlceratam cutem cicatrice obducere studeamus, quamuis hæc per sanata appareat, quæ tamen propinqua est & continua exulceratur, neque serpere desinit malum donec noxius humor sit euacuatus. Vt de illa Romana muliere in malleolo herpetem habente tradit Galenus. Quapropter ante horū ^{14.} medicamentorū applicationē ^{Meth.} corpus euacuandum erit, mox quæ influentem

214 *De Tumorib. præter naturam,*
fluentem humorem reprimant re-
gerantque vtemur. Sequenti itaque
medicata potione quæ venæ se-
ctione est tutior, corpus euacuabi-
mus.

℥. catholici ℥. β. rhabarbari opti-
mi in aqua endiuiae infusi & ex-
pressi ℥. j. β. syr. ros. solutiui ℥. j. β.
decocti folior. vtriusque bugloss.
fumariæ & vtriusque intybi ℥. iiij.
fiat potio danda horis antelucanis.

Quod si laborantis corpus vali-
dus fuerit, cuius aluus non facile
præscripto medicamento subduci
possit, sequens propinabitur.

℥. elect. de succo rosar. ℥. β. dis-
solue in seri caprini ℥. iiij. vel scam-
monij puluerisati ℥. β. seri caprini
℥. iiij. Poterit ex interuallis in se-
quentem modum corpus à noxio
humore expurgari.

℥. catholici ℥. ij. tripherae per-
ficæ ℥. j. β. elect. de succo ros. ℥. β.
rhabarbari optimi puluerisati &
aqua endiuiae parum macerati ℥.
iiij. syr. ros. solutiui q. s. fiat in mo-
dum opiatae, de qua singulis diebus
capiat

capiat circiter ℥. j. per se vel dissolutam in ℥. iiij. decocti foliorum buglossæ & intybi.

Medicamenta astringentia tertium scopum perficiunt, præsertim circa initia quæ in actiuis qualitatibus Erysipelati conferentibus similia esse debent, in passiuis plane contraria. Quæ Erysipelati conferunt frigida & humida esse oportet, vt lactucæ, intyborum, portulacæ, semperuiui succus. Quæ herpeti sunt idonea frigida & sicca, vt polygonij, plantaginis, solani, vitis capreolorum, teneritatum rubi succus, horum medicaminum vires supplebit sequens cataplasma.

℞. putaminum malorum granatorum ℥. iiij. rhu coriariorum ℥. ij. farinæ hordei ℥. iiij. decoquantur simul in vino austero, terantur optimè, fiat cataplasma. Vel huius loco.

℞. foliorum plantag. solani an. M. j. lentium contusarum p. j. decoquantur probè in hydromelite, terantur, fiat cataplasma parti ad-
mouen

cap. 20.
4. lib.

216 *De Tumorib. præter naturam,*
mouendum. Vel iuxta Pauli præ-
ceptum capienda erit polenta mel-
li mixta. Huic etiam operi vtile
est glaucium passo dilutum. Est
autem glaucium memithæ succus
resiccatus, herbæ cuiusdam similis
papaueri corniculato, non succus
chelidonij, vt perperam multi exi-
stimarunt. Vtilis quoque acacia
aceto, mulso, vel succo plantaginis
mixta.

Quartus scopus, medicamine
nonnunquam mediocriter, nonnū-
quam strenuè exiccante perficitur.
Tandiu enim vtendum est apo-
crousticis, quamdiu humorem in
affectum locum defluere censebi-
mus. Cùm verò iam totus in ipsum
humor decubuit, euacuandus est
detergentibus & digerentibus nai-
tioribus, & non asperis iuxta Hip-
pocratis præceptum, si herpes ab
humoris non admodum maligni
defluxione, acribus & acutis, si à
peruicaci & mordaci proueniat.

Ad malignos & veteres herpes
myfi, chalcitide, sandaraca, calce,
pastillis

pastillis Andronis, Polyidæ, musæ Bithini vel Faustini in sapa dilutis vtendum erit. Mitioribus & recentioribus verò herpetibus sequens præsidium ex vsu est.

℞. Lanæ veteris illotæ & combustæ donec in pollinem tenuissimum redigi possit ʒ. ij. corticis pini vsti ʒ. j. β. plumbi vsti & diligenter loti ʒ. iij. adipis caprini quart. β. olei myrtillorum ʒ. iij. ceræ parum, fiat vnguentum. Vel sequens.

℞. Lithargyri auri ʒ. j. β. antimonij optimè loti, coralli rubri & lapidis hæmatitis an. ʒ. iij. æris vsti & loti ʒ. j. β. pompholigis præparatæ ʒ. ij. succi plantaginis & solani an. quart. β. olei ros. omphacini ʒ. iij. agitentur in sole, ducantur probè in mortario & pistillo plumbeis. fiat vnguentum.

Huic rei vtilissima est bractea plumbi, quæ priùs longo tempore in aqua aluminosa maduerit, aut fuerit lithargyro saturata. Ablui etiam poterit vlceratus locus sequenti decocto.


K

℞. fo

218 *De Tumorib. præter naturam,*

℥. Foliorum bursæ pastoris, centinodiæ, plantaginis, solani, summitatum rubi & lentisci sing. M. j. rosarum rub. siccarum, baccarū, & foliorum myrti sing. p. j. acaciæ, hypocistidos, psydia balaustiorum sing. ʒ. j. nucum cupressi, calicum glandium, gallarum viridium sing. pa. x. myrrhæ, thuris, eius corticis sing. ʒ. v. fiat decoctio, abluatur vlcus. Quando ad acrium medicaminum vsum necessitas nos impellit, inungenda erit herpetis superior pars oxycrato, aut vnguento ex bolo, ne ob horum medicamentorum acrimoniam fiat in morbosam partem humorum confluxus. Quod si his omnibus morbus non cedat, confugiendum erit ad actuale cauterium, tanquam ad sacram anchoram. Poterit etiam aqua aluminosa frequenter ablui vlcerata pars.

Herpe



Herpetis miliaris curatio.

C A P. VIII.

G Vm herpetis miliaris à bile diluta ex humoris pituitosi perfusione progenita scaturiat, huic victum infrigidantem & exiccantem præscribemus ; dabimusque operam , vt mixtus morbum excitans humor mixtis subducentibus alium medicamentis euacuetur. Euacuabitur commodè præsidio sequenti.

℥. Glycirrh. recentis & rasæ ʒ. j. seminis carthami contusi ʒ. ʒ. p. asfularum exacinatorum pa. viij. agarici albi fæminini ʒ. j. seminis melonum, cucurbitæ, contusi an. ʒ. j. sem. anisi ʒ. ʒ. florum buglossi viol. an. p. j. fiat decoct. de colatura cape ʒ. iiij. in quibus dissolue diaphœnici ʒ. ij. catholici ʒ. ʒ. syr. ros. laxat. ʒ. j. misce, fiat potio.

Clysmate emolliente & attrahente sollicitanda nonnunquam

K 2 erit

220 *De Tumorib. præter naturam,*
erit alius, vel diureticis medica-
mentis leuiter mouendæ erunt vri-
næ. Post humoris noxiæ euacuatio-
nem vsurpanda erunt repellentia.
Si nihil vitiosi succi amplius in
ægotantem partem influat, mo-
dicè digerente medicamento vte-
mur, quale est emplastrum de ar-
noglossò, vel de duobus grana-
tis. Vel sequenti.

℥. Lanæ æsopatæ in pelui vel
cacabo sic combustæ, vt in tenuissi-
mum pollinem redigi possit, misce
cum aqua calicum rosarum, & ita
paretur vt attramento, siue incau-
sto (vt aiunt) simile sit medicamen-
tum. Vel sequenti.

℥. Æruginis rasilis, sulphuris
viui an. 3. j. aquæ ligni quod com-
buritur, vel aquæ fermentorum
cum cremantur vi ignis expressæ
q.s. ad incorporanda, misce, linatur
pars affecta. A multis commendan-
tur capita piscium salitorum com-
busta & in tenuissimum pollinem
reducta, vinoque parū diluto mixta.
Vtile erit & sequens remedium.

℥. Gal

℥. Gallarum viridium ʒ. β. rad. aristolochiæ rotundæ ʒ. ij. β. myrrhæ, thuris, aloës sing. ʒ. ij. aluminis fissi ʒ. j. β. puluerentur subtilissimè, & in vino austero excipiantur, facti circuli siue pastilli cum aqua mellis dissoluti illinantur.



De Phlyctenis.

C A P. I X.

Φλυκτίνæ vesicæ sunt à feruore & ebullitione sic nominatæ, quæ ab æstuantibus & acerrimis humoribus scaturiunt, his quæ ab igne aut feruenti aqua generationem accipiunt similes. Arabum turba sahaphati appellat. Fiunt nonnunquam in corporis extima cute, nonnunquam in ceratoidæ oculi membrana, cum sublimis & elata intra se acrem humorem collegerit tunc ipsam excoariat, & oculum purulentum reddit. A ὤσπριον differt, quod à frigidio-

222 *De Tumorib. præter naturam,*
 ri humore scaturiat ; phlyctena à
 calidiori & toto corpore nascatur:
 ὤδερματιον verò proprius sit capitis
 affectus, sæpe in facie & puerorum
 capite apparens. Cutis infectionem
 Chirurgorum plerique vocant.



De Phlyctenarum causis.

C A P. X.

QUæ serosum, tenuem acrim-
 que humorem falsæ pituitæ,
 aut humori melancholico mixtum
 ad cutim commune totius corpo-
 ris emunctorium propellunt, vel
 hunc generant, causæ prægressæ di-
 cuntur. Æstus igitur immodicus,
 vehemensque frigiditas constri-
 gens ac protrudens hos humores
 ad cutim, causæ sunt procatacticæ.
 Corporeæ verò serosa ac pallida
 bilis, sæpe, ut iam dictum est, pi-
 tuitæ falsæ, sæpe humori melan-
 cholico mixta : pruritum maxi-
 mumque ardorem in cute promo-
 uet.

De



De Phlyctenarum curatione.

C A P. XI.

Phlyctenarum curatio tribus scopis perfici potest. Quorum primus victus congruam rationem præscribit: secundus humoris noxij purgationem: tertius topicorum præsidiorum vsum instituit. Ab eduliorum dulcium, falforum, amarorum vfu abstinendum. Solent enim dulcia facile bilefcere, sicuti amara & salsa acres humores procreare. Indulgendum frigidis, & corpus humectantibus, & his quæ morbis ex biliosis humoribus contractis conferunt.

Porro ad secundum scopum properantes, Epithymi in aqua lactis macerati & expressi ꝑ.j. sorbendam dabimus, vel ex myrobalanis citrinis & acidis in aqua fumarix infusis & expressis potionem parabimus, cui scammonij ḡ. v. addemus, potissimum si laborantis aluus sit astricta.

224 *De Tumorib. præter naturam,*

Topicorum præsidiorum vsum tertius scopus perficit, quæ à nobis in sequentem modum poterunt parari.

℥. Muccaginis sem. psyllij ℥. viij. succi portulacæ, succi solani an. ℥. iij. misce. vngantur partes affectæ, præsertim si æstus in affectis partibus sentiatur, vel hominis ieiuni salua illinantur. Confert & oleum de Iuniperò, quo pecudum scabies curatur. Aliud præsidium præcedentibus non minus efficax.

℥. Succi scabiosæ, succi radice lapati acuti sing. ℥. iij. olei ros. tb. β. axungia porci veteris cum succo limonum dissolutæ ℥. viij. bulliant simul ad succorum vsque consumptionem. Adde postea cineris cucurbitæ & sulphuris viui sing. ℥. j. lithargyri auri ℥. j. β. terebinth. ℥. vj. hydrargyri in prædicta axungia ante puluerum mixtionem extincti ℥. ij. agitentur in mortario marmoreo & pistillo buxco.

Aliud.

℥. Olei nymphaeæ & ros. sing. ℥. iij.
succu

succi cyclaminis , succi chelidonij
maioris sing. ℥. ij. axungia porci lb.
℔. Decoquatur simul vsque ad suc-
corum consumptionē, postea misce
chalcitidis & facis vini tostæ sing.
℥. j. ℔. cerusæ aqua rosarum lotæ ℥.
ij. sulphuris viui ℥. ℔. agitentur pro-
bè simul in mortario marmoreo.



De Impetigine.

C A P. XII.

Lichen, quem saphatum Aui-
cennas , nos verò impetigi-
nem veram nuncupare pos-
sumus , est cutis asperitas dura &
sicca cum ingenti prurigine, pustu-
lis siccis & satis magnis acriter cu-
tim corrodens, latéque per ipsam se
extendens:& quemadmodum pfora
frequenter in lepram , & lepra in
elephantem; ita hic ex feris papulis
progenitus in pforam vertitur.

Lichenem nouum morbum Pli-
nius putauit Tiberij Claudij Cæ-
saris Principatu Romæ fuisse vi-

K s sum,

226 *Dè Tumorib. præter naturam,*
 suū, qui Græco nomine Lichen,
 Latine verò, cum à mento ferè ori-
 retur, ioculari primū lasciuia,
 mox & usurpato vocabulo menta-
 gra sit vocatus, occupans in multis
 primò mentum, postea totum vul-
 tum, oculis tamen immunibus, des-
 cendens verò in colla, pectus & ma-
 nus fædo cutis furfure. Mentagra
 composita dictio affectum & lo-
 cum, vt *χερπάρεξ, ποδάρεξ*, significat.

lib. 7.

*Diosco.
 ca. 48.
 li. 4.
 lib. de
 morbo
 Gall.*

Lichen non sic appellatur quod
 linctum humana salua curetur,
 quamuis Paulo teste continua sali-
 uæ defricatio huic maximè confe-
 rat, sed quod lambendo proserpat
 veluti etiam lichen herba quam
 hepaticam aliqui vocant, quod li-
 chenas serpentis morbi genus im-
 posita sistat & curet, nudis petris
 adhærens musci modo. Extergen-
 tis, refrigerantis, & resiccantis est
 facultatis. In Plinium Leoniceus
 Medicus, ad miraculum usque do-
 ctus, non temerè insurgit, aper-
 tèque ostendit Hippocratis seculo,
 qui ante Claudium vixit, hunc
 mor

morbum Græcis fuisse cognitum.

Sunt & in equorum genibus & super ungulas, docente Dioscoride, indurati calli lichenes vocati, qui triti & cum vino poti, non solum comitialibus mederi traduntur, sed per aurem cum oleo infusidentium dolorem lenire, & ex vino aut mulso poti calculos expellere. Ad quem libet animalis morsum etiam ab aliquibus vsurpantur.

lib. 2.
ca. 41.



De Lichenum causis & curatione.

C A P. XIII.

EX acri tenuique sanie crassioribus aliis mixta, impetigines siue lichenes contrahuntur, ex siccis pustulis excitari solent ex contagio etiam. Solebant enim Romani ciues sese osculari, quemadmodum nunc Venetiis fit, ob eam rem tanta foeditate serpsit turpissimum malum, vt nullus reperiretur qui huic mederi sciret.

228 *De Tumorib. præter naturam,*
Oritur aliquando, cum viscus princeps à vitioso humore labefactatum noxium humorem ad cutim transmittit. Fit etiam à deprauata victus ratione, à frequenti scilicet amarorum, salforum & acrium, linguanque ferientium eduliorum usu. Sæpe ab ambientis nimio calore qui humores in cute vrit, nonnunquam à frigiditate immodica aëris cutis meatus constipantis, & recrementis exitum denegantis, vnde aliquando hyeme oriri solet.

Inter veris morbos annumeratur. Nam solet natura vere ex alto corpore ad cutim excremēta transmittere. Et sicuti morbus varius est, ita varia curatio; nam aliquando is mitis est, aliquando ferus, ita curatio aliquando mitis est, aliquando valida. Proponatur primò mitis curatio, vt ea quæ fit ex ieiunæ salinæ frictione, vel ex lapati acuti radice aceto acri macerata & leni. Seruata prius victus ratione ad curationem herpetis institu

instituta, sectaque vena, si corpus plenum sit, purgatoque per medicamenta, mixto humore, sequentibus etiam medicamentis vten- dum suademus.

℞. Thuris, ammoniaci thymia-
matis sing. ℥. j. succi perdicij & bras-
sicæ sing. ℥. j. β. olei de vitellis ouo-
rum & Iuniperi sing. ℥. iiij. ceræ
citrinæ parum, fiat vnguentum.
Vngantur partes affectæ. Linire
affectum locum liquore ex oleæ
ligno dum comburitur erit ex
vlu. Prodest & veratri albi suc-
cus, quo pertinacem pecudum sca-
biem pastores curare solent. Non
minus utilis est ex viticis & cappa-
rum foliis acerrimo aceto decer-
ptus succus, aut ex his probè con-
tusis cataplasma.

Aliud.

℞. farinæ cicerum alborum, fa-
rinæ lupinorum & lentium sing. ℥.
ij. aceti acris ℥. iiij. olei Iuniperi &
de tartaro sing. ℥. iiij. bulliat cum
prædictis oleis acetū ad ipsius con-
sumptionem, fiat cataplasma. Ad
perti

230 *De Tumorib. præter naturam,*
pertinaces diuturnosque lichenas
salubris erit sequentium medica-
mentorum vsus.

℞. alcyonij vsti sulphuris ignem
non experti sing. ℥. j. β. rad. pyretri,
nitri sing. ʒ. iij. asphodelorum ℥.
β. terantur & in tenuissimum polli-
nem redacta cum aceti & succi
limonum pari quantitate miscean-
tur, fiant pastilli in vmbra resicca-
ti, & cum vtendi tempus accedet,
teratur vnus atque alter, supra co-
tem aceto subige & vtere. Ad feras
impetigines,

℞. calcitidis vstæ, sulphuris viui
& muscerdæ sing. ʒ. ij. farinæ erui.
& fabarum sing. ℥. j. succi malorum
punicorum ℥. ij. olei Iuniperi ℥. iij.
ceræ parum, fiat vnguentum.

Aliud.

℞. farinæ lolij ℥. j. β. sem. staphi-
sag. ʒ. iij. spumæ argenti ʒ. x. ceru-
sæ ʒ. ij. β. plumbi vsti & antimonij
aqua plantag. lotorum sing. ʒ. ij.
axungie suillæ veteris ℥. j. β. succi
scabiosæ & limonum an ℥. j. hy-
drargyri in axungia extinct. ʒ. vj.
olei

olei de vitellis ouorum & de tartaro sing. ℥. iij. fiat linimentum.

Quod si præscriptis medicamentis non cedat affectus, sed callosus efficiatur, sequendum erit Galeni consilium, à quo monemur vt excoriatiã cutim, lepras tollentia medicamenta, ἐκδύειν vocata affecta *lib. de p. tr. 2. facit.* parti adinoueamus: qualia sunt ea à Pamphilo Romæ vsurpata ex acribus & acutis medicamentis, squāma æris, sc. arsenico, sandaraca, combusto ære, cantharidibus. Repurgatis tandem vlceribus medicaminibus ad id dicatis, colleticorum vsum non negligit.



*De Sudaminibus à Græcis ἰδρωμα
vocatis.*

C A P. XIV.

Iδρωμα sudamina in Aphor. vocauit Rhasis Alhasaphū, papulas Plinius. Sunt autem sudamina pustulæ quædam genitalium partium summam cutim *deri*

232 *De Tumorib. præter naturam,*
 detinentes, mordentes & exasperantes, & sensum (ac si acubus pūgeretur cutis) pruriginosum efficiētes. Philoteus in Aphorismorum commentariis sudores esse ait biliosiores, qui cutim vellicant ac mordent, pruritumque excitant, qui cum collum, scapulas, dorsum & pectus nonnunquam impetant, frequentius tamen circa pudendum & anum versantur. Et quamvis eæ partes sint siccæ, quia tamen continuò humiditas per illas delabatur, putredinem accersit.



De Sudaminum causis.

C A P. X V.

Sudaminum causæ prægressæ sunt æstas calida & humida, potissimum quando nullis in ea flauerit ventus: quorū 2. & 3. Epid. meminit Hipp. vel calidiorum & acrium eduliorum vsus frequens, labores solito maiores, in loco calido & humido non
 disfla

diffilabili habitatio, vestium, subuculæ præsertim, immunditia, sudoris spreta deterfio, ex quo dum corpus diuexat magna suboritur molestia, æstate præsertim. Nam sordes multas inuehit, & de se tetrum odorem præbet. Pueris & iuuenibus familiaris morbus, & his qui gracilem biliosamque corporis constitutionem nacti sunt. Tenuis biliosi humores cutim ipsam peruadentes, eam, retenti, scabram efficiētes, & pruriginosas pustulas excitantes, corporeæ causæ statuuntur. Mali huius tam perspicua sunt indicia, vt ad illius ampliorem notitiam maiore scrutinio minimè egeamus.



De Sudaminum curatione.

C A P. XVI.

Affectus huius curatio tribus scopis perficitur. Quorum primus nos monet ad diætæ frigidæ & humidæ per omnes res non
nata

234 *De Tumorib. præter naturam,*
naturales à Medicis vocatas discur-
rentes , institutionem. Omnibus
quæ humores eliquare , attenuare,
corpus rarefacere , sudores ciere
queant, abstinendum. Grauib. pô-
derosiss.que vestib. corpus mini-
mè onerandum, vestim. mundarũ,
& omnium quæ corpus contingũt
crebra mutatio salubris , sudoris
quoque levis deterfio molli & no-
ua sponsia facta erit ex usu. Secun-
dus cholagogi medicamenti admi-
nistrationem in sequentem modum
præscribit.

℞. Florum viol. bugl. & cichor.
sing. p. j. pulpæ tamarind. elect. ʒ. vj.
iuiubarum, sebesten, prunorum aci-
dorum sing. pa. xx. myrobalanorum
citrearum & indarum sing. ʒ. j. ʒ.
sem. endiuia & acetosæ sing. ʒ. ij.
glycirrhizæ ʒ. ʒ. fiat decoctio in
aqua hordei perfectè cocti & in co-
laturæ ʒ. iij. infunde rhabar. opti-
mi ʒ. j. ʒ. facta expressione dissolue
tripheræ persicæ ʒ. ʒ. syr. ros. so-
lutiui ʒ. j. ʒ. misce, fiat potio. Vali-
diori corpori adde diapruni soluti-
ui

ui 3.ij. Vel capiat bis in hebdomade Epithymi in 3.iiij. aquæ hordei, endiuia, vel borraginis, vel lupuli infusi leuiter decocti & expr. 3.ß. fyr. ros. solutiui 3.ij. fiat potio.

℥.conser. florum nymphaeæ, viol. sing. 3.j. conser. rosarum & acetosæ sing. 3. vj. sem. melonum, cucurbitæ mundati & minutatim incisi sing. 3.j. pulu. elect. triasantali 3. iiij. pulu. diamarg. frigidi 3. ij. fyr. de succo endiuia q. s. ad incorporandū, fiat opiata, de qua alternis diebus capiet ad quātitatem vnius castaneæ horis duabus ante prandium. Bibat postea cochlearia duo aquarum endiuia & cichorij.

Ad tertium scopum properantes, hunc affectum si mitis sit, naturæ solius ope, si paulò vehementior, sola aquæ rosaceæ aut plantaginis perfusione curari experientia est comprobatum, aut aquæ tepidæ & dulcis.

Si molestior extiterit, euacuandum erit corpus venæ sectione, si corpus sit plenum, vel potione sequenti.

℥.elect.

236 *De Tumorib. præter naturam,*

℞. Elect. de succo rosarum ʒ. iij. decocti prunorum, iuiubarum, sebesten ʒ. iiij. syr. ros. laxatiui, vel infusionis florum persicorum ʒ. j. misce, fiat potio. Vel sic.

℞. Scammonij ḡ. vj. lactis caprini ʒ. iiij. misce, fiat potio.

Purgato corpore, monendus erit ægrotans vt à coitu quàm maximè abstineat. Nam cum is humores ad exteriores partes moueat, calidum vaporem ad superficiem corporis protrudit, ex quoolidum redditur corpus. Quapropter vsus balnei sequentis non erit inutilis.

℞. Radicis serpentariæ maioris, bryoniæ & liliorum alborum sing. ℥. j. maluarum, violarū, acanthidis, ebisci cum rad. parietariæ, siclæ acetosæ, turionum lupuli, salictarij sing. fasciculum vnum, lentium parum contusarum, pisorum alborum contusorum sing. p. iij. furfuris bene à farina repurgati ℥. ij. florum fabarum, nenupharis sing. p. ij. rosarum rub. p. j. β. fiat

fiat decoctio in aqua pluuiæ pro balneo. In exitu balnei sequenti vnguento inungendum erit corpus.

℥. Olei salicum, viol. rosar. & nenuph. sing. ℔. s. cerusæ ʒ. s. capthuræ ʒ. ij. lithargyri auri ʒ. ij. succi limonū ʒ. j. agitentur simul fortissimè in mortario marmoreo, fiat linimentum. vngantur partes affectæ, & rursus manè balneum præscriptum ingrediatur. Vel sic, plumbi vsti, molybdenæ siue plumbaginis sing. ʒ. j. cerusæ ʒ. s. mastiches ʒ. iij. baccarum, foliorum myrti sing. ʒ. ij. ol. ros. omphacini & lentiscini sing. ʒ. iij. ceræ albæ parum, fiat vnguentum.



De Epinyctide.

C A P. XVII.

E Pinyctis in pustularum genere reponitur, incognita Romanis vox, sed Latinis, vt Plinio & Celso, familiaris, & fre


238 *De Tumorib. præter naturam,*
 frequens. Græci à nocte huic no-
 men dedere, quod noctu enascatur,
 & interdiu ægrotantem molester,
 sed noctu hominem magis dolore
 conficiat; idque acriter. Paulus ait
 Epinyctides vlcera esse sponte sua
 erumpentia, pustularum subru-
 brarum figuram obtinentia, qui-
 bus apertis cruenta defluit sanies
 hominem per noctem miserè di-
 storquens. Celsus scripsit maiorem
 faba Epinyctidem non esse, & in
 eminentibus, hoc est, corporis ex-
 tremis partibus excitari testatur.
 Auicennas sudamina, plantam no-
 ctis, cum Epinyctide confu-
 disse est visus. In oculo epinycti-
 dem nasci scriptum posteritati re-
 liquit Plinius, vlcus esse existi-
 mans oculi aciem hebetans, ex
 cuius angulo perpetuò humor
 emanat. Gal. in methodo Epiny-
 ctida quod noctu sit enatum, dixit.

lib. 4.
cap. 10.

lib. 5.
ca. 28.

2. Met.

De



De Epinyctidum causis & indiciis.

C A P. XVIII.

NOctis frigus cutis poros obstruens, facta iam alimenti in corpus anadosi, causa est procatarctica: vel immodicus diurni aëris calor, immoderatique labores ad superficiem humores trahentes, qui ob nocturnam frigiditatem, corporisque quietem sub cute retinentur. Quod facilius accidit his quorum cutis suapte natura astricta est & densa: tunc commouetur nonnunquam talis pruritus, ut post multam frictionem dolores vehementes oriantur. Biliosus sanguis ab alimentis calidis genitus, & in superficiem corporis protrusus, vel salsa pituita; pruritum, vlcuscula & pustulas faciens causa est corporea.

Notæ à molestia, tumore fabis simili, vehementissimo ardore & dolore sunt petendæ. Quinquagesimum

240 *De Tumorib. præter naturam,*
sumum iam prætergressus annum,
memini me tali morbo semel fuisse
corruptum; sed cum humoris bilio-
si propter ætatē magna non esset
pertinacia, mutata in frigidam tē-
perie victus ratione & pacato ani-
mi mœrore, qui affectui causam
præbuerat, citra aliud remedij ge-
nus sine pustularum vlcere aliquo,
euacuato quippe per insensibilem
transpiratum humore, euasi.



De Epinyctidis curatione.

C A P. XIX.

C Vratio sic erit aggredienda.
Primum monendus ægrotus,
vt interdiu minimè calido, sed tē-
perato, vel ad paruum frigiditatem
inclinante aëre fruatur, sed noctu
tepedo. Acrium, acidorum, salforū,
& linguam ferientium esum vita-
bit, ac erit illi vino interdican-
dum, potissimum generoso, cuius
loco ptisana vtetur, omnia animi
pathemata quæ iram commouent,
& san


& sanguinem calfacere possunt, acutum tanquam scopulum fugiet. Minuendus erit cibus, ambulatio & moderatum exercitium erit ex usu. Quod si succulentum & ætate florida sit corpus, euacuatis clysmate aut eccoproctico medicamēto communibus récrementis, tundenda erit iecoraria, ac tanta sanguinis copia mittenda, quantam laborantis vires & ætas perferre poterunt. Pro topicis præfidiis vsurpandus erit oleæ sylvestris succus aut coriandri. Ex balneo non admodum calido utilis desudatio.

℞. Maluarum, violarum, lenticulæ, aquæ vtriusque bugloss. foliorum solani, lactucæ, acanthidis cum radicibus sing. P. iij. sem. altheæ ℥. iij. sem. quar. frig. ma. parum contusorum sing. ℥. j. florū nenuph. viol. & borrag. sing. p. ij. rosarum rub. p. j. fiat decoct. in aqua dulci pro balneo. Post cuius vsum super pustulas nitrum insperges, oleum, vinumque miscebis; & has tali medicamento inunges. Imponi etiam

L pote

242. *De Tumorib. præter naturam,*
poterit sulphurij liquor aqua solutus;
nam citra roſionem, Paulo teſte,
deſiccat. Remedium etiam quod
ex cicuta foliis melle in leuorem
detritis inducitur vtile eſt. Id etiam
quod ex viridi coriandro & oleæ
ſylueſtris foliis decocto fit, vel
adiantum ex melle tritum. Vlceri-
bus ex puſtulis procreatis commo-
dum erit ſequens medicamentum.

℞. Ceruſæ ʒ. iij. lithargyri auri
ʒ. j. β. roſarum rub. ʒ. j. β. ſucci endi-
uiæ, donec mellis craſſitudinem ac-
quirant.



De Angina.

C A P. X X.

A Ngina, *κύναγχη*, aliàs *σύναγχη*
Græcis à ſuffocando dicta,
(quod intercepta respira-
tione, ſtrangulatu promptiſſimum
vitæ diſcrimē inferre ſoleat) Phleg-
mone eſt guttur aut fauces ten-
tans: cuius quatuor ſunt ſpecies ſeu
differentiæ ex ipsis locis deſumptæ.
Prima

Prima est quando muscoli interni laryngis inflammatione laborant, tunc neque in interna, & externa parte aliquis apparet tumor, & ea omnium est perniciosissima, quæ eodem die 2. 3. aut 4. hominem strangulat, ut tradit Hipp. quod subito & non sensim facit, quando-^{16. Apho. 3. li.} quidem sunt aliæ ab angina affectiones quæ non repente, sed sensim strangulant, ex quarum numero est peripneumonia.

Secunda non minore dolore afficit, in faucibus tumorem, ruborem excitans, præcedenti non minus periculosum, longius tamen spatium habet.

Tertia quando gutturis partes tum internæ, tum externæ sunt inflammatae.

Quarta cum solæ fauces inflammationem patiuntur: ab ea secunda valetudo contingit, modò ad interna non recurrat erysipelas.

His addi potest quinta, quæ fit ex luxata ad interiora vertebra, in qua locus cauus apparet: ex casu

244 *De Tumorib. præter naturam,*

4. de lo.
aff. Et
Gal.

sæpe pueris euenit, & medicam
opem respuit; hanc plerique lor-
dosim siue excauationem vocant.
Immedicabilis censetur, quòd luxa-
ta vertebra extremam asperæ arte-
riæ partem comprimens, in suam
naturalem sedem reponi non po-
tèst.




De Angina causis.

C A P. XXI.

Anginæ causæ externæ sunt
immodica cali. hu. fundens
& eliquans, ventorum frigi.
comprimens & fluxionem promo-
uens, fungorum vsus creber, assi-
duus ceraforum vsus, omne insu-
per quod caput replere aptum est,
& fluxiones ipsas proritare. San-
guis copiosus calidus & tenuis
præter naturam ad commemoratas
partes confluens, causa est interna,
aut pituitosus humor has replens.
Capitis magna plenitas, phrenitis
nonnunquam translato ad has par-
tes


tes humore, vt in metastasi sine crisi permutationis contingit, huic malo ansam suppeditat.



De Angina indicis.

C A P. XXII.

QRthopnea anginosos adortur, transglutiendi mira adest difficultas, in facie & collo perspicuus apparet rubor, hos febris assidua sæpe comitatur, aperto ore æger hiat, æremque haurit: cum bibere tentat potus ad nares recurrit, vitiata & catulina vox, linguæ emissio ex laborioso motu.



De Angina cura.

C A P. XXIII.

QUoniam hic affectus sit ex maxime acutorum contubernio, victus ratio tenuissima esse debet, qualis est quæ fit ex hor-

246 *Dé Tumorib. præter naturam,*
dei cremore, hydromelite: ouorum
lutea procedente morbo sunt ex
vfu. Fractis viribus ex pullo dan-
dum iusculum: violacei syrupi ad
arcendam sitim gutturque lenien-
dum administratio utilis. Somnus
vt in aliis partium internarum in-
flammationibus maximè fugien-
dus, quod humorum ad patientem
locum defluxum augeat; quod si
ex sanguine tenui aut bilioso oria-
tur affectus, iniecto in aluum prius
emolliente clysmate, si ea sit astri-
cta, secunda erit cephalica partis
affectæ consultis prius viribus, quæ
si imbecillæ extiterint, affigenda
erit regioni ceruicis cucurbitula
aliquando cum scalpellatione, sæpe
sine ea: mox à venæ sectione re-
creato paululum alimêto corpore,
vulnerandæ erunt ad continentis
causæ euacuationem, quæ sub lin-
gua sitæ sunt venæ, vt præcepit
Hip. proximam venam proximum
ventrem euacuare docens; parcè &
non confertim, pluribus interpo-
sitis vicibus, ne ex larga euacuatio-
ne

ne vires conuellantur detrahendus est sanguis, dandâque opera vt inflictu vulnus fit modicè diductum, quippe quod ex vulnere paruo vires multò melius persistere possunt.

Repellentia interiùs vsurpanda; exteriùs, ad superficiariam partem humorem trahentia & digerentia medicamenta, nam quæ circa initia vsurpantur, si valde repellant succos ad pulmones trudendo, grande suffocationis periculum afferant, quapropter ea mitiora esse expedit, quæ in sequentem modum à nobis sunt excogitata.

℞. Summitatum myrti, plantaginis, solani & rubi sing. M. j. rosarum rub. baccarum myrti sing. p. j. antiræ 3. ij. florum viol. p. j. β. fiat decoct. in aqua hordei optimè cocti, & in col. lb. j. β. dissolue succi malorum granatorum & rosarum depurati sing. 3. ij. β. misce, fiat gargarisma, parum calidè vtatur.

Aliud fortius.

℞. Summitatum oleæ sylvestris, lentisci, rubi, myrti, cornu, piri
L 4 sylue

248 *De Tumorib. præter naturam,*
syluestris, sorbi, cupressi sing. M.j.
corticis malorum granatorum, hy-
pocistidos, acaciæ, nucum cupressi
sing. ʒ.j. sem. plantag. acetos. sing.
ʒ.ß. ros. rub. p. ij. fiat decoct. in dua-
bus partibus aquæ pluuiæ, & vna
plantaginis, cape de col. ʒb. j. ß.
dissol. dianuci, si in principio, vel
diamori si inflammatio in incre-
mento extiterit ʒ. iiij. fiat garga-
risma.

Clysmata ex acribus & acutis
medicamentis salubria, quod ex re-
motis partibus humorem attra-
hant, censentur, ex quorum nume-
ro est sequens.

℞. Rad. liliorum alborum, al-
theæ sing. ʒb. j. herbarum emollien-
tium com. bethon. melissæ sing. M.j.
caricarum pinguium, prunorum
dulcium sing. pa. xx. medullæ car-
thami contusæ sing. ʒ. ij. florum
centaurij minoris, chamomillæ,
meliloti, sambuci, & vtriusque stœ-
chados sing. p. j. fiat decoct. & in
col. quart. v. diss. hieræ pieræ Gal.
ʒ.ß. cathol. ʒ. vj. olei de lilio ʒ. iiij.
mellis

mellis rorismarini, succi mercurial.
facch. rub. ling. quart. ℞. salis
gemmei 3. j. fiat clyster, suppona-
tur vbi erit opus.

Frequens & sensim facta ex vio-
laceo syrupo aut de papauere trans-
glutitio, præsertim in materia ca-
lida & tenui, & circa phlegmones
initia, est ex usu.

Regioni colli admouenda sunt
quæ epispasticam & digerentem
facultatem habent, vt oleum fusi-
num, chamæcum cœsykata lana,
aut vnguentum resumptiuum, cum
eadem, vel ex nido hirundinis in
oleo elixo parabitur emplastrum.

Ad causæ antecedentis euacua-
tionem simul & reuulsionem,
commodè sequens cholagogum
medicamentum administrabitur.

℞. Rhabarbari optimi 3. j. ℞.
infundatur in 3. iij. aquæ endiuæ
expressione facta. diss. diaprun. so-
lut. vel elect. de succo rosar. 3. ij.
syr. viol. vel ad fortiùs subducen-
dam aluum rosar. solut. 3. j. ℞.
fiat potio danda postridie à clystma-

250 *De Tumorib. prater naturam,*
te supposito. Vel sic.

℥. Glycirrhiz. rec. & contusæ
℥. j. passul. exacinatarum, iuiubarum, sebesten & caricarum ping. sing. par. xx. sem. melonum & cucurb. contusi an. 3. ij. sem. maluæ, bombacis mundati sing. 3. j. florum viol. buglos. & nenuph, sing. p. j. fiat decoctio in aqua hordei opt. cocti. Cape de col. ℥. iiij. in quibus infunde rhabarbi opt. 3. j. β. spicæ ḡ. vij. facta express. dissolue oxilaxatiui 3. ij. syr. ros. solut. ℥. j. β. misce, fiat potio.

℥. Conseruæ viol. florum nymphaeæ sing. ℥. j. conser. florum borrag. 3. vj. pul. diapap. recentē confecti 3. iiij. pul. diatra. frig. 3. ij. syr. viol. q. s. fiat opiata. Cap. ad quantitatem vnus castaneæ singulis matutinis.

℥. Amygd. dulc. depilatarum ℥. β. elect. diatrag. frig. ℥. iiij. pul. diapeni. sine speciebus 3. iiij. succi glycirrh. 3. iiij. conser. viol. 3. x. cum syr. viol. fiat Eclegma, teneat sæpe in ore sensum transglutiendo.

Mor

Morbo ad incrementum prope-
rante gargar. sequens erit ex vsu,
qui recipit myrrhæ selectæ ʒ. ij.
summitatum & baccarum myrti
sing. ʒ. j. β. rosar. rub. p. j. florum
viol. nymphææ sing. p. β. croci ʒ. j.
passularum cum gigartis pa. xij.
fiat decoct. in aqua hordei, & in
collat. lb. j. dissol. diamori ʒ.
iij. fiat gargar. Cùm verò ad
summum vigorem ventum erit,
vsurpandum erit præsidium se-
quens.

℥. Cineris hirundinis ʒ. iij. spi-
cæ nardi, myrrhæ, croci sing. ʒ. j.
caricarum pinguium & passula-
rum sing. par. xv. florum viol. &
nymphææ sing. p. j. fiat decoctio
& in col. lb. j. dissol. vini malo-
rum granatorum ʒ. iij. fiat gar-
gar. In ipsa declinatione sequen-
tium vsus erit salubris.

℥. Rad. cyperi ʒ. β. glycyrrhæ
contusæ ʒ. j. fol. hyssop. & cala-
menti sing. M. j. morsus diaboli
M. β. passul. repurg. ab acinis, ca-
ricarum pinguium sing. pa. xx. hor-

252 *De Tumorib. præter naturam,*
dei integri p. j. fiat decoct. & in
col. lb. j. diss. sapæ ℥. iij. mellis
rosati col. ℥. j. β. misce, fiat gar-
garismus.

Canum stercus ossibus nutri-
torum, quemadmodum puero-
rum qui pane & lupinis biduo
sunt nutriti, probatur interiùs
exhibitum, aut exteriùs admo-
tum, & sulphurum siue assa foeti-
da collo appensa. Quod si an-
ginam faciens humor digeri non
possit, suppurante medicamento
tunc erit vtendum.

℥. Maluarum, altheæ cum to-
to sing. M. j. sem. lini, fœnugræ-
ci, altheæ sing. ℥. j. passularum, iu-
iubarum, sebesten caricarum pin-
guium sing. pa. xx. florum chamo-
mil. p. j. fiat decoct. & in col. lb.
j. diss. mellis despumati ℥. iij. muc-
cag. sem. psyllij ℥. ij. fiat garga-
rismus.

℥. Facum prædicti decocti, pi-
stentur in mortario marmoreo, per
colum medicum transfundantur,
adde butyri recentis sine sale ℥. iij.
axum

axungiae gallinae ℥.j.β.olei amygd.
dulc.fæcis olei de lilio sing. ℥.ij.β.
croci ℥.ij.misce, fiat cataplasma, re-
gioni colli applicetur, & vbi aper-
to ore vomicae perspicua appare-
bunt, indicia, tunc ferro acuto vel
vngue aperiendus erit abscessus, &
utendum detergentibus vlcusque
eluentibus medicamentis, vt ceno-
melite, demum apij succo.

Si ab humore pituitoso scaturiat,
propinandae erunt pillulae cociae;
sed cum has deglutire facile non
possit, dissoluentur in aqua melif-
sae, betonicae vel maioranae. Affi-
gendae partibus posterioribus &
origini spinalis medullae erunt cu-
curbitulae. Parandi gargarismi ex
minime astringentibus & modice
calfacientibus. Procedente morbo
muccago sem. lini, althaeae cum
sapa conferet, sed corporis & faciei
situs pronus sit oportet, ne resupi-
no existente corpore pus in pul-
mones aut in ventriculum feratur.
Ex sequentibus parabitur garga-
rismus.

℥.Rad.

254 *De Tumorib. præter naturam,*

℞. Rad. liliorum ebischi & ireos sing. ℥. j. myrrhæ ℥. iij. caricarum ping. num. xij. dactylorum detractis nucleis num. vj. croci ℥. j. β. fiat decoct. & in col. ℥. j. diss. sapæ ℥. iij. mellis rosati colati ℥. ij. fiat gargarismus.

℞. Porrorū ℥. iij. rad. althææ ℥. ij. caricarum ping. num. x. decoquantur, & diligenter pistentur, adde pinguedinis suillæ ℥. iij. croci ℥. ij. olei de lilio ℥. iij. fiat cataplas. applicetur collæ. Vel sic.

℞. Axungia anatis, anseris & gallinæ sing. ℥. iij. mucaginis fœnugræci, citoneorum sing. ℥. ij. butyri recentis & sine sale ℥. ij. β. farinæ hordei ℥. ij. olei de lilio, irini sing. ℥. iij. ceræ q. s. fiat unguentum. Si digestionem non pareat humor his suppurabitur medicamentis, & rupto abscessu in eum quem superius ostendimus modum sequenti garg. utatur.

℞. aquæ mellis ℥. j. vitellorum ouorum recentium num. iij. lactis vaccini ℥. iij. fiat garg. si propter
mea

meatum angustiam deglutiri non possit cibus, hora assumptionis affigantur cucurbitulæ origini spinalis medullæ, & tamdiu affixæ teneantur quamdiu cibum assumet.

Secundi Libri finis.



DE



DE
AGNOSCENDIS
CVRANDISQVE
TVMORIBVS
præter naturam.

Auctore

ANTONIO SAPORTA
Doctore Medico.

LIBER TERTIVS.

De Oedemate.

C A P. I.



Vmorum à bile proge-
nitorum , & externas
corporis partes mole-
stantium causas , indicia
& methodum curatiuam , qua po-
tuimus breuitate superiori libro
tradidi.

tradidimus. Nunc ordinis ratio efflagitat vt de his qui à pituita emerferunt agamus, qui οἰδήματα à Græcis, œdemata à Latinis vocantur.

Est œdema homonyma dictio; aliquando; docente in Aph. Hipp. omnem tumorem contra naturam à quouis humore natum significat, cuius sententiam secutus est cap. de melanthio Pedac. Dioscorides. Cōtracta postea fuit à posterioribus Medicis eius nominis significatio ad eum tumorem nobis significandum, quem pituita procreauit, ὄγκον à Græcis vocatum. Et quemadmodum Græci omnes inflammationes Phlegmonas appellare solebant, ita omnes tumores præter naturam οἰδήματα.

Est itaque œdema, vnduma ab Auicēna vocatum, de quo agimus, tumor laxis, indolens & prementi digito cedens, & caloris, vt placuit Auicennæ, expers. Quod duplex existit, legitimum scilicet, & illegitimum. Quod illegitimum est in varias.

Hipp.
lib. 5.
Aphor.
65.

Gal. cō.
in 34.
4. Aph.

Hipp.
Aph.
30. l. ix.
p. 095.

258 *De Tumorib. præter naturam,*
varias species scinditur.

Verùm simpliciter dictum œdema certa corporis parte definitum circumscriptumque est, quod propriè morbus propriam curationem exposcens dicitur. Et quamvis tumores in hydropicorum, & tabidorum pedibus apparentes veris œdematis videantur similes esse; ab his tamen maxime differunt, quod morbi non sint, sed morborum propria symptomatica, propria curatione minime egentia. Nam his satis erit, crura perfricare oxyrrhodino, aliàs oleo cum sale, aut etiam oxyrrhodino sal habente. Oedema verùm non in omnibus corporis locis fieri potest, sed solum in laxis. Thoracem & iecur raro impetit.

De



De Oedematis causis.

C A P. II.

QUæ fluxilem & tenuem pituitâ gignere possunt, causæ oedematis sunt procatactica: ut in frigida & humida regione habitatio, austrina temporis constitutio, assiduus frigidorum & humidorum eduliorum, ut olerum, leguminum, piscium, lacticiniorum usus, frequens crapula, intempestius aquæ frigida potus, longa quies. Nam ob otium in corporis partes fluit pituita, quæ cum à languido calore concoqui non possit, mollem atque laxum tumorem gignit. In pedibus præcipuè & scroto. Hic enim affectus rheumaticus est, neque ut arbitratus est Cauliacensis Guido, semper sit per viam synatrismi siue coaceruationis, quod tumore molli interdum tentati pedes qui noctu à lecti calore evanescit, ostendunt.

Corpo

Corporeæ causæ habentur, hepatis frigida & humida intemperies pituitosum sanguinem procreans, senilis ætas, quæ quavis aliâ huic morbo magis obnoxia existit. Mensium ob graviditatem aut aliam ob causam in mulieribus suppressio, aquosa tenuis & *ἀραια* pituita, quantitate potius quàm qualitate noxia, poris carnis spongiæ more impacta, huius mali causa est continens. Ex aliis non naturalis pituitæ speciebus fiunt œdema phlegmonodes, œdema scirrhomodes, œdema erysipelatodes, ventrosus humor, *ἐμφύσημα* Græcis dictus; aquosus, à nonnullis eleuatio; & plures alij, de quibus suis locis agemus.



De Oedematis indicis.

C A P. III.

A Frigida & humida corporis temperie, moribus & ea quæ præcessit victus ratione petendæ sunt

sunt notæ. Oedematis tumor laxus est, frigidus, doloris & ruboris expers, mollis, prementibus quippe digitis tumor cedit, & pars ipsa foueæ modo excavatur, nullus ut in aneurismate pulsus sentitur, & eo partis color albicantior apparet. Præterea œdema longè latius est & maius aneurismate (nisi quando ex sanguine ab arteria egresso grummosus effectus sphacelum siue syderationem efficit,) carnosas partes potius quàm alias, ut phlegmone, œdema magis infestat.



De Oedematis curatione.

C A P. I V.

Huius tumoris præter naturam curatio tribus scopis absolvitur. Quorum primus opportunam victus rationem consulit. Secundus fluentis humoris castigationem. Tertius topica præsidia docet.

Quod

262 *De Tumorib. præter naturam,*

Quod ad primum scopum attinet, calidum & siccum, & tenuium partium victum præscribemus. Sit aer tenuis, clarus, ad siccum vergens, sicca habitatio, à paludibus, statariis & cœnosis aquis procul distans. Panis coctus & fermentatus, vinum non oligophorum, sed generosum parcè dilutum est ex usu. Cicerum & brassicæ decoctū, repudiata horum substantia, utile, Veruecis caro assa; inutiles pisces, præterquàm saxatiles, qui vino sunt incoquendi, piperis, cinamomi, vel caryophyllorum puluere condien-
Aphor.
59. 1. 7. di, frugaliùs solito edat, parciùs bibat, & iuxta Hipp. sententiam inedia corpus demaceret. Somno breui indulgeat, intempestiuūque & diurnum tanquàm venenatum anguem vitet; Veneri parcat, labores cibos præcedant. A balneis & omnibus rebus humectantibus abstineat, caseum & fructus fugaces ne gustet, & solutam aluum habere quàm maximè studeat, supposita glande, vel clystere iniecto.

Comple

Completur secundus scopus antecedentis humoris ad expulsionē præparatione. Offerenda itaque consentanea erunt, quæ incidere & detergere delitescentem in corpore pituitam nata sunt, qualia esse sequentia comperies.

℞. Oxymelitis & mellis rosati sing. ℥. iij. decocti foliorum betonicæ, melissæ & maioranæ ℥. xij. pulu. cinamomi interioris & selecti ℥. iij. misce, fiat zulapium clar. & arom. capiat in quatuor dosibus de mane. Vel sic.

℞. Syr. acidi simp. syr. de stœchad. sing. ℥. iij. aquarum maioranæ, beton. & melissæ sing. ℥. iij. pul. elect. diamb. ℥. iij. misce, fiat zulapium clar. & arom. pro trib. dosibus de mane.

℞. Syrupi de menta, syr. de acoro sing. ℥. iij. aquarum saluix, bugloss. sing. ℥. β. pulu. nucis moschatæ & macis sing. ℥. ij. fiat zulapium clar. & arom. pro 4. dosibus. Vel sic.

℞. Rad. galangæ crassioris, acori vulgaris

264 *De Tumorib. præter naturam,*
vulgaris sing. 3. vj. rad. petrosel.
& apij sing. 3. j. corticis citri ficci
3. ʒ. foliorum beton. melissæ, cha-
mepiteos, primulæ veris, maiora-
næ, saluiæ sing. M. j. herb. capil. com.
vtriusque bug. vtriusque cichorij
sing. M. ʒ. caricarum pinguium,
passularum exacinatarum sing. pa.
xx. sem. anisi, fenic. carui sing. 3. j. ʒ.
medullæ carthami contusæ 3. iij.
florum genistæ, cicerum rubrorum
sing. p. ij. florum bugloss. stæch. ro-
ris mar. sing. p. j. fiat decoctio, & in
col. tb. j. ʒ. diss. sacch. solidi & mell.
ros. col. sing. 3. iij. pulu. elect. arom.
ros. de gal. & macis. sing. ʒ. ij. misce,
fiat apozema clar. & arom. capiat in
4. dosibus de mane.

Humoris iam concocti expul-
sionem phlegmagogis medicamen-
tis tertius scopus ostendit; (nam
venæ sectio nequaquam est ten-
tanda, eo quod sanguine euacua-
to adaucta pituita magis refrige-
rari corpus experiremur,) quæ in
sequentem modum parari pote-
runt.

R. Dia

Liber III. Cap. IV. 265

℞. Diaphœn. ʒ. ij. indi maioris ʒ. j. β. syr. ros. solut. ʒ. j. β. aquarum beton. & maioranæ sing. ʒ. ij. misce, fiat potio, detur prima luce cum custodia & artis regimine. Vel sic.

℞. Elect. diacarth. ʒ. β. aut elect. de psylio tantundem. capiat ut iam dictum est. Vel sic.

℞. Agarici tro. ʒ. j. medullæ sem. carthami contusæ ʒ. β. fol. sennæ oriental. mund. ʒ. ij. florū stœchad. rorismar. sing. p. j. fiat decoct. facta col. ad ʒ. iiij. infunde rhabarbi optimi ʒ. j. β. cinamomi ʒ. vij. express. facta diss. elect. de citro solut. ʒ. ij. syr. ros. solut. ʒ. j. fiat potio : vel si magis catapotiis delectetur, deglutiet sequentia.

℞. Massæ pill. de agarico, aggreg. ma. sing. ʒ. ij. malaxentur cum aqua beton. fiat pillulæ vj. quas deglutiet hora secunda post mediam noctem cum custodia, & regimine artis. Vel sic.

℞. Massæ pill. cocciarum, & fœtidarum maiorum sing. ʒ. β. vel ʒ. ij. si robustum sit corpus malaxen-

M

tur

266 *De Tumorib. præter naturam,*
tur cum aqua saluæ , fiant pill. v.
aut vj.

A multis commendatur vomitus,
quod censeant ventriculum pitui-
tæ esse promptuarium & ergasti-
rion , modò pectore nec angusto,
nec macilento sit ægrotus , neque
naturam ad tabem pronam habeat,
quem hydrælco tepido , vel penna
oleo saturata in os immiſſa prouo-
cābimus. Vel ſic.

℞. Sem. atriplicis, naſturtij & ra-
parum ſing. ꝑ. ꝑ. ꝑ. ſem. erucæ. ꝑ. ij. ca-
ricarum ping. num. xv. decoquan-
tur in aqua raphani , facta col. ad
ꝑ. x. diſſol. ſyr. acidi ſimpl. ꝑ. ij. ꝑ.
miſce , tepidum detur. Quæ enim
vomitus ciere debent , tepida ſint
oportet, & larga quantitate ſuman-
tur. Dari etiam poteſt alicuius ani-
malis cerebrum ciborum omnium
poſtremum, pinguiſſimo iure con-
ditum , quod ciendo vomitui vtile
veteres ſcripſerunt. Roboranda erit
poſtea ventriculi facultas præſidiis
ſequentibus.

℞. Conſer. ſtæchad. florum ro-
riſmar.

rismar. sing. ʒ. j. corticis citri saccharo conditi, & zingiberis viridis facc. pariter conditi sing. ʒ. β. myrobalanorum eimblicarum sac. conditarum, & generoso vino lotarum ʒ. iij. pulu. elect. ros. nouel. ʒ. j. β. pulu. elect. de cinamomo ʒ. j. cum syr. confer. corticis citri concorporentur, fiat in modum opiatae, de qua capiat per horas duas ante prandium ad quantitatem castaneae, bibendo postea parum vini clari aqua absynthij diluti. Vel sic.

℞. Confect. arom. maioris ʒ. iij. vtatur vt dictum est. Theriacae sesquidrachma horis quatuor ante prandium exhiberi poterit, vel duabus horis ante pastum elect. sequens.

℞. pulu. elect. arom. ros. d. gal. pul. diagalangae sing. ʒ. β. coral. rub. ʒ. ij. corticis citri sacch. conditi; confer. ros. veteris sing. ʒ. ij. sacch. albisimi dissoluti in aquis menthae & absynthij quantum suff. fiat elect. in tabellis ponderantibus ʒ. ij. β. Marini herinacei ventriculum ad ex-

268 *De Tumorib. præter naturam,*

lib. 9.
cap. 30.
§ 31.

citandam emortuam ventriculi appetentiam, & ad addendum huic visceri robur, Ætius commendat.

℞. Coriandri præparati ℥. iij. panis albissimi igni lento & sine fumo assi ℥. j. corall. rub. vsti. & aqua absynth. loti, rasuræ eboris sing. 3. ij. cinamomi ʒ. iij. corticis citri sicci 3. ij. anisi, fœniculi sing. 3. vj. sacch. ros. tabulati ad pondus omnium. fiat pulvis tenuis, capiat cochlear vnum post suos pastus, nihil desuper comedendo & bibendo.

Quartus scopus nos admonet, vt pro variis œdematis temporibus varia à nobis præsidia statuantur. Quapropter in œdematum principio leniter repellentia & adstringentia medicamenta, & partem ipsam roborantia sunt ex usu, hæc enim materiam euacuant. Nam fluens in aliquem corporis locum humor euacuari trifariam solet: vel tractione, quæ sanguinis missione, vel ad proximas partes deriuatione, aut cucur

Gal. in
arte
medicinali.

curbitularum appositione perficitur.

Secundo modo, impulsione, quæ fit ad motis parti frigidis & adstringentibus medicamentis. Hæc enim inflammationibus calidis, seruatis tamen à nobis superius recensitis legibus, conuenit.

Tertio modo; transmissione, quæ medicamentis à Guidone Cauliacensi improprie apocrofticis vocatis absoluitur, robur parti addentibus, & humoris ap-
cap. de
cura
apoc.
in 8. l.
pulsus ad partes affectas verantibus, quæ hoc non sua frigiditate, sed adstringente potius facultate præstant; & tumoribus frigidis sunt utilia. Quocirca œdemati in principio existenti sequens præsidium erit ex usu.

℞. Aceti acerrimi ℥. iij. aquæ ℥b. β. misceantur probè simul, & tali liquore imbuatur sponsia noua; quod si tali careas mittenda erit in aquam in qua colliquatum erit nitrum, vel aphtonitrum, aut salis aliqua species. Hanc poscam

M 3 tepi

270 *De Tumorib. præter naturam,*
tepidam tumori admovebis. Nam
frigida actu affectam partem of-
fenderet frigiditate sua, & primo
occurfu materiam incrassaret. Ni-
miùm autem calida humorem po-
tius attraheret quàm repellet. Cor-
pori molliori minor, duriori ma-
ior quantitas aceti miscenda erit,
temperato æqualis. Hanc etiam
stillatio lixiuio lauare poteris si
vetus sit.

Auicennas non temerè prædi-
cti medicamenti frigidi perfusio-
nem damnat, quia cedemati tum
sua frigiditate, tum humiditate
officit, illudque digestionì non
cedere affirmat, quod medica-
menta frigida digestionì sint ma-
ximè aduersa. Vincienda denique
erit fascia à partibus inferiori-
bus incipiente, ad superiores pro-
grediente has leniter adstringen-
te. Possumus etiam sequenti præ-
sidio vti.

℞. Boli armenici pul. acaciæ
sing. ʒ. j. rad. cyperi ʒ. β. croci
orientalis ʒ. ij. aloës succocitrinæ,
myr

myrrhæ electæ sing. ℥. v. succi
caulium rub. ℥. ij. aceti acerrimi
q. s. olei ros. ℥. iiij. ceræ parum,
fiat vng.

Ab Auicenna monemur vt ante
horum medicamentorum vsum,
leuiter tumorem fricemus, præ-
sertim si suapte natura homo pi-
tuitosus sit. Oedemati ad incremen-
tum properanti sequentia quàm
maximè profunt.

℥. Sulphuris ℥. ij. salis com-
munis ℥. j. aceti acerrimi ℥. iiij.
olei chamæ. ℥. iiij. misce, fiat
adinstar cataplasomatis. Vel sic.

℞. Foliorum acanthidis elixo-
rum & diligenter tritorum lb. β.
cineris ficus ℥. iiij. axungia suil-
læ veteris ℥. iiij. aquæ pluuiæ,
& aceti acerrimi sing. ℥. ij. misce,
fiat in modum cataplasomatis.

Oedema in summo vigore &
inclinatione sequentibus remediis
profligari debet.

℥. Foliorum thamaricis, fol.
rorismarini & rutæ sing. M. j. bul-
liant in duabus partibus aquæ plu-
uiæ,

272 *De Tumorib. præter naturam*,
uiæ, & vna vini generosi, teran-
tur postea diligenter, & per co-
lum medicum transfundantur.
Quibus adde farinæ cicerum, fur-
furis frumenti sing. ℥. ij. stercoris
vaccini & axungię anatis sing. ℥.
iij. mellis optimi ℥. iiij. fiat cata-
plasma. Vel sic.

℥. Aluminis qu. suff. sulphuris
℥. j. styracis & lacrymæ thuris
sing. ℥. ij. stercoris vaccini ℥. iiij.
spicæ nardi ℥. iiij. foliorum rutæ,
calamintæ, absynthij siccorum
sing. ℥. ss. glasti siue isatidis ℥. j.
succı arthanitæ ℥. iiij. olei costi-
tini & cheirini sing. ℥. iiij. olei
sambucini ℥. ij. ceræ citrinæ q. s.
donec ad cerati consistentiam re-
ducantur. fiat Magdalcen, de quo
conformentur emplastra magnitu-
dinis debitæ, adde aquæ rutæ pa-
rum. Vel sic.

℥. Sabinæ, maioranæ, roris-
marini, origani, calamenti sing.
M. j. lupinorum contusorum ℥. iiij.
calami odorati, schœnanti, spi-
cæ celticæ sing. ℥. vj. flor. cha-
mæm.

mæm. anethi, meliloti & storachad.
sing. p. j. rosarum rub. p. ss. fiat de-
coct. in aqua pluuiæ, & paucò
aceto, & spongia recenti vel panno
glasto infecto foveatur tumor, ad-
moueatür deinde sequens præsi-
dium.

℥. Cineris fagi, ilicis, & cine-
ris truncorum caulium rub. sing.
℥. ij. axungia suillæ veteris, &
salitæ ℥. iiij. concorporentur cum
paucò oleo cheirino. fiat linimen-
tum.

℥. Emplastri oxycrocei ℥. iiij.
formetur emplastrum (unctis prius
manibus oleo irino) magnitudinis
debitæ. Aliquando humor œde-
ma procreans tam pernicax est, vt
digestioni non obediat. Tunc ad
pus mouentium medicamento-
rum vsu migrandum erit, quæ
in sequentem modum parari pos-
sunt.

℥. Rad. liliorum alborum, al-
theæ sing. ℥. ij. rad. bryoniæ, cu-
cumeris asinini sing. ℥. ij. olei de
lilio ℥. viij. vini generosi lb. ss.

M 3 bul

274 *De Tumorib. præter naturam,*
bulliant simul ad vini consumptionem usque, terantur diligenter in mortario marmoreo, & per cribrum medicum transfundantur, miscendo deinde farinæ sem. fœnugræci, sem. lini sing. ℥. iij. fermenti acris ℥. ij. axungia anatis, anseris sing. q. j. misce, fiat in modum cataplasmatris. Vel sic.

℥. Massæ emplastri diachylonis minoris creati ℥b. β. malaxentur manibus inunctis oleo irino. fiat emplastrum, ut iam dictum est. Vel sic.

℥. Maluarum, acanthidis, malvaïsci cum rad. sing. M. j. florum meliloti & anethi sing. p. j. sem. lini, fœnugræci contusi sing. ℥. j. β. olei de croco cheirini sing. ℥b. β. succi ebuli, sambuci & lapati acuti sing. ℥. iij. decoquantur ad succorum consumptionem usque, terantur & per colum medicum trahantur. misce butyri ℥. iij. vng. dialth. ℥b. β. fiat ad instar vnguenti. Vel sic.

℥. Cæparum sub prunis coctarum


rum num. iij. cochlearum cum testis tritarum ℥. ij. olei rutacci, facis olei de lilio sing. ℥. iij. misce, fiat cataplasma. Oedematis humore iam in pus verso, cauterio aperiendus erit locus. Humoris ipsa maturatio ex primo libro scriptis notis innotescet. Adigendum erit rutilans ferrum decliuiori tumoris sedi, aut sectionem acuto ferro, vel pyrotico medicamento molieris. Vlcus verò derelictum, quod sordidum est, præfidiis sequentibus erit detergendum, ac curandum.

℥. Sebi vaccini ℥. iij. galbani, ammoniaci thymiamatis in paucis aceto dissolutorum sing. q. s. picis naualis ℥. ij. terebinth. ℥. iij. β. myrrhæ electæ ℥. iij. olei veteris ℥. iiij. corticis thuris vel mannæ thuris ℥. j. β. ceræ citrinæ parum. fiat vnguentum. Vel sic.

℥. Massæ emplastr. diachalcteos ℥. iiij. Vel sic.

℥. Massæ emplastri fusci siue nigri tantundem, malaxentur ma-

276 *De Tumorib. præter naturam,*
nibus inunctis oleo rosato. fiat em-
plastrum. Quod si caro flaccida,
mollis & putris appareat, vnguen-
to apostolorum vel Ægyptiaco erit
tollenda, vel pulvere præcipitati
erit colliquanda.




*De Oedemate illegitimo, phlegmo-
node, erysipelatode, &
scirrhode.*

C A P. V.

SI quis exactam, vt primo
libro ostensum fuit, affe-
ctuum simplicium notitiam
habeat, & illi sit horum curatiua
methodus perspecta, facilè omnes
à coniugatis causis profectos &
agnoscat, & curabit. Quare bre-
uitati studentes ad aliorum tumo-
rum descriptionem, & curationem
nos conuertemus.

De




*De Oedemate flatulento , vel de
inflatione.*

C A P. VI.

Flatulentus tumor non ab
aëre , sed in nobis incluso
spiritu emergens , illius in aliqua
interiore parte collectionem signi-
ficat. Hic tumor oculos, ipsorum-
que palpebras molestando, à nonnul-
lis propriè *εὐφύσκημα* dicitur. Vapo- 2. ad
Glant.
rosus ille spiritus nonnunquam
sub cute, sæpe in ossa ambientibus
membranis , interdum in ventre,
quandoque in intestinis, aliquando
in spatio quod est inter peritoneū
& intestina , quandoque sub mus-
culorum membranis & membra-
nosis tendonibus colligitur.

Apostema ventosum eleuatio-
nem, aut inflationem Auicennas
appellat , ostendens eleuationem
ab inflammatione differre materia
& situ , eo quod eleuatio fit à fla-
tu pituitæ vaporis permixto , per
vapo

278 *De Tumorib. præter naturam,*
 vaporem nihil aliud nisi tenuem
 pituitæ humiditatem intelligens.
 Inflatio verò ex flatu alteri substā-
 tiæ permixto. Situ, quia causa
 eleuationem faciens per membri
 substantiam est dispersa; & premēti
 digito cedit, vt in cachexia, leuco-
 phlegmatia in inflatione est accu-
 mulata, & à membri substantia se-
 creta, cui copulata est renitentia, vt
 in hydrope tympania, & ramice
 ventoso.



De flatulenti ædematis causis.

C A P. VII.


EXternae causæ huius affectus
 sunt, ingesti cibi suapte na-
 tura flatulenti, cuius gene-
 ris sunt legumina omnia, & ex
 cerealibus nonnulla, olera, fructus
 horarij & præcoces, magna frigidi-
 tas ventriculi concoctricem facul-
 tem labefactans, vsus creber atque
 intempestius aquæ potus, frequēs
 radicula, raparum, & bulbosarum
 radicum

radicum usus, crapula, & largus vini usus non solum flatus, sed fluxuationem procreas. Caloris nativi imbecillitas in materia pituitosa ad excitandos flatus disposita, causa est corporea & antecedens. Potest enim huiusmodi calor ex humida & attenuata materia vaporem suscitare, sed non discutere.

Quod doctè Gal. similitudine 2. ad
Glauc. quadam usus variis locis docet, dicens; quemadmodum in externis rebus, & frigida aëris constitutione, flante borea, videmus aërem sereniorē reddi, & calidissimo per æstatem aëre nos ambiente purum cælumque sudum; ac tranquillum effici, in mediis verò aëris constitutionibus, turbulentum cælum nebulasque procreari: ita in animantibus accidit. Neque enim calor maximè imbecillus, neque admodum validus, sed cū inter has qualitates medium obtinet, flatum gignere potest. Nam impensè frigidus humidam materiam in flatum nequaquam resoluit, sed illam
cogit,

280 *De Tumorib. præter naturam,*
cogit, quam maximè calor externus
abiorbet. Temperatus verò & hu-
mori proportionè respondens ca-
lor, tantum vaporis suscitatur quan-
tum digerere potest, ob eam rem
flatum non parit.

A debili igitur calore flatum,
qui cruditates sequitur, fieri statuën-
dum est, quem dissolvere non po-
test, eo quod partes in quibus est
coaceruatus, in frigidantur, in frigi-
datae hos servant & optimè conti-
nent. Tria igitur ad flatus genera-
tionem concurrunt, caloris imbe-
cillitas, humida materia, & partis
pororum densitas. Flatus in par-
te contentus illam replens & ex-
tendens, continens est causa.



De tumoris flatulenti indicis.

C A P. VIII.

Signa sunt tumor. tactui re-
nitens, cum quodam lucido
splendore, & dum talitro aut
baccillo percutitur, sonum tympa-
no aut vtri similem representans.

Sæpe

Sæpe percipitur flatus per totum corpus, modo in hanc, modò in aliam partem oberrans, tensumque dolorem pariens, qui si vaporosus & crassus existat, non facile discutitur, & multa parit incommoda. Reformidandus est maximè quando huc aut illuc per corpus vagatur, dolores & lipopsychias comites habens: nā cum à venenato humore attolli videatur, sæpe ægro- tantem in maximum vitæ discrimen vocat.



De tumoris flatulenti curatione.

C A P. IX.

T Ribus scopis huius affectus curatio perficietur, qui à tribus causis excitari solet, nempe ab humido succo, caloris imbecillitate, & meatuum partis flatum continentis densitate. Primus igitur scopus nos hortatur, vt humidam & crassam materiam exrenuemus calefaciēte & resiccante victus ratione, vt iam genitum flatum

282 *De Tumorib; præter naturam,*
tum discutiamus. Abstineat oportet ægrotus ab omnibus eduliis crudis, lentos, viscidos humores & flatus generantibus, & leguminibus, castaneis, fugacibus fructibus, radícula, rapis, napis, suilla & agnina carne, crudo melle, & aliis cibis dulcibus, vino dulci & turbido. Fruatur cremore cicerum, in quo incocta sit cæpa, petroselinum, mētha, calamēthum, vel cuminum. Affas carnes euchymas prosequatur, elixas & pingues respuat. Sit panis ex æquis partibus selecti tritici & hordei paratus, mediocriter salitus, sed bene coctus & fermentatus: cui anisi & fœniculi quantitatem exiguam miscere non erit absurdū. Deliget vinum album aut giluum: generosum, crassum & nigrum noxium; & vino aromatite nonnunquam indulgebit, vel phalerno, ab aliquibus maluatico vocato.

Concoquetur pituitosus humor flatui ansam suggerēs, & euacuabitur his medicamētis, quæ c. de œdematum curatione fuere descripta.

Secun

Secundus scopus nos docet, ut caloris imbecillitati occurramus, illorum præsertim viscerum quibus credita est altrix facultas. Quod exhibitis interioribus & exterioribus admotis perficiemus. Et cum ventriculi & hepatis imbecillitas flatui generationem suppeditet, utrumque viscus præcedente purgatione erit sequentibus medicamentis firmandum.

℞. Confect. arom. maior. ℥. ij. confer. florum rorismar. ℥. vj. zingiberis viridis saccharo conditi ℥. ℞. pulu. diagalang. ℥. iiij. syr de mentha q.s. ad incorporandum, fiat opiata, de qua quolibet mane capiat ad quantitatem unius castaneæ duabus horis ante prandium, bibat postea cochlearia duo (ut ocyus in viscera digeratur medicamentum) vini vermiculi parum diluti cum aqua menthæ.

℞. Massæ pill. de aromatis aut de hiera simp. ℥. j. malaxentur cum aqua menthæ, capiat pillulas duas per sesquihoram ante cœnam, semel

284 *De Tumorib. prater naturam,*
mel aut bis in hebdomade. Syr. de
absynthio cochlearia duo forbere
prima luce non erit incommodum,
modò priùs, vt Gal. docet, expur-
gatus & planè deterfus sit à pitui-
ta ventriculus. Non minus confe-
ret similis syr. de mentha admini-
stratio.

℞. sem. anisi, fœniculi an. ʒ. j.
sem. cumini ʒ. β. cubearum
zingiberis sing. ʒ. ij. cinamomi in-
terioris & electi ʒ. j. β. galangæ mi-
nutæ ʒ. iiij. cariophyllorum ʒ. ij.
sacch. albissimi ad pondus omniũ.
fiat puluis, de quo post suos pa-
stus capiet cochlear vnum, nihil
desuper comedendo & bibendo.
Magna etiam cucurbitula medio
ventri absque scalpellatione appli-
cata, totum vmbilicum comple-
ctens hominem à molestia citò li-
berat.

℞. anisi, carui & fœnic. sacch.
cond. sing. ʒ. iiij. elect. rosatæ nouel-
læ frustatim incisi ʒ. j. glycirrhizæ
rasæ ʒ. β. fiat drageta, vtatur vt di-
ctum est. Exterior ventriculi pars
emen

emendante vitia ventriculi cerato,
Gal. descriptione erit roboranda,
vel oleo de spica, nardino, de ab-
synthio, de mentha, mastichino,
rutaceo, vel sequenti epithemate
& vnguento.

℞. Rad. iridis florentiæ ℥. ij. cort.
citri sicci ℥. j. foliorum balsamitæ,
absynthij, menthæ siccorum sing.
℥. j. β. sem. anisi, cumini, rutæ sing.
℥. ij. florum chamæm. meliloti,
sambuci, & stœchados sing. p. j. fiat
decoctio in duabus partibus aquæ,
& vna vini albi opt. de qua spon-
gia vel filtro foueatur regio affe-
cta cal. inungatur post fotum se-
quenti vnguento.

℞. Ladani purissimi ℥. β. nucis
mosch. cariophyllorum & macis
sing. ℥. j. styracis calamitæ ℥. j. β.
moschi pro diuitibus ℥. j. olei co-
stini & rutacei sing. ℥. iiij. ceræ ci-
trinæ q. s. fiat vnguentum. adde vini
generosi aut aquæ vitæ parum vn-
ctionis tempore: poterit ex præ-
dictis medicamentis parari in ru-
bra sindone sacculus interpunctus
scuti

286 *De Tumorib. præter naturam,*
scuti figuram referens, qui suo ad-
hæsu ventriculum roborabit.

14. Met. Tertium scopum topicis præsi-
diis assequeris, quæ mixtam facul-
tatem habeant oportet, digeren-
tem scilicet & modicè adstringen-
tem, & dolorem nequaquam adau-
gentem. Quæ fusissimè à Gal. sunt
tradita, ea autem calida & tenuium
partium sunt; quapropter noua
spongia lixiuio aut sapone imbu-
ta parti erit applicanda. Sed vrgen-
tè dolore vtendum erit aliquo
chalastico & relaxante oleo quod
dolorè leniat, quale est oleum fu-
sinum, chamæm. amygd. dulcium,
vel œsipata lana in sapa, oleo &
aceto infusa; minuenda tamen erit
aceti quantitas, olei & vini augen-
da dolore ægrum distortente.

14. Met. Quod si tumor in summo vigo-
re, vel declinatione fuerit, medi-
camento à Galeno tradito, à Pau-
lo & Aëtio recepto erit vtendum,
quod sic parari volunt. Capienda
sunt strigmenta gymnasiarum sic
feruefacta & percolata, vt pura ef-
ficientur,

ficiantur, quæ viuæ calci optimè pulueratæ miscebis (quamuis Paulus restinctam esse velit.) ex his parandum erit emplastrum.

Quò fit vt hoc loco manifestus sit Guidonis Cauliacensis lapsus, qui capite de curatione apostematis ventosi; saponi & calci præcipit miscendum esse lutum tenax (quod argillâ appellant) cuius medicamēti inuentorē fuisse Gal. falsò asserit. Constat enim tale lutum emplasticam consistentiam habens, repellens emphracticum & stegnoticum esse, flatuum digestionem maximè impediens. Sunt autem strigmenta trium generum, balneorum scilicet, palæstræ, parietum & statuarum. Balneorum, ex sudore, oleo & sordibus in balneo ab hominibus defrictis constant. Palestræ, ex iam dictis accedente puluere: parietum & statuarum sunt sordes ex oleo magna sui parte constantes, ex materia cui inherēt aliquid assumētes, velut æruginē ex æreis statuis. Erāt in gymnasiis statuæ quædam & va-
sa

288 *De Tumorib. præter naturam,*
sa ærea oleum ipsum quo se lucta-
ruri oblinerent continentia. Hæc
enim tubercula discutiunt & calci
mixta ad parotidas discutiendas
vtilia esse Archigenes scripsit. Ex
oleo, vasorum ærugine & ex parie-
tum materiæ qualitate constant.
Poterit etiam hic flatulentus tu-
mor in sequentem modum discuti.

℞. terebinthinæ, visci quercini
sing. ℥. iij. resinæ pini ℥. j. adipis
leonis, illius loco taurini veteris
℥. β. olei cui incoctum sit piper
pyrethrum, yua taminea siue sta-
phisagria ℥. v. aquæ vitæ aut vini
generosi ℥. x. decoquantur vsque ad
vini consumptionem, quibus per-
colatis & expressis misce thuris in
tenuissimum pollinem redacti q. s.
lumbricorum terrestrium in clyba-
no non admodum vrente resicca-
torum ℥. β. hermodactylorum ℥. vj.
ceræ q. s. fiat malagma siue magda-
leon, vsui seruetur. Vel sic.

℞. Emplastri diachalciteos ℥. ij.
emplast. de meliloto q. s. rad. cy-
cla. ℥. ij. pyrethri puluerisati ℥. j. β.
mala

malaxentur manibus vnctis oleo
irino. fiat emplastrum magnitudi-
nis decentis. Vel sic.

℞. Milij lb. j. β. salis fossilis leui-
ter assi lb. j. furfuris à farina opti-
mè spoliati p. j. fol. arthemisiæ, ma-
ioranæ sing. M. j. florum chamæm.
meliloti, rorismar. stœchad. vtriuf-
que sing. p. j. β. sem. fœnugræci,
carui, cumini sing. ʒ. β. torreantur
omnia in sartagine, fiant sacculi
quadrati iuxta membri magnitudi-
nem, & vino generoso perfusi tepi-
di parti admoveantur, vtatur po-
stea sequenti vnguento.


℞. Origani, cala. siccorum sing.
ʒ. β. rad. gentianæ ʒ. vj. rad. rubiæ
maioris ʒ. iij. foliorum agrimonie
siccorum. ʒ. ij. β. scœnanthi, masti-
ches sing. ʒ. j. β. croci, spicæ nardi
sing. ʒ. iij. olei anethini, nardini &
de castoreo sing. ʒ. iij. aquæ vitæ
ʒ. β. ceræ q. s. fiat vnguentum, vn-
gatur locus affectus cal.

Si ex vehementi partis æstu &
mobili dolore, lipopsychia flatum
à pernicioso atque venenato hu-

N

more

290 *De Tumorib. præter naturam,*
more excitari cogites, vincienda
erit superior atque inferior arcto
vinculo pars, vt in illius medio re-
tentus turbidus ille flatus sectione
nouacula aut rutilante ferro facta
liberè exeat, replendum tandem
erit vulnus aloë, bolo armenię,
oleo rosaceo & aceto, sic mixtis vt
substantiam glutinosam adipiscan-
tur. Demum agglutinandum erit
medicaminibus ad id dicatis, priùs
tamen à plethora, sectione venę: ca-
tochymia, purgatorio medicamen-
to, liberandum erit corpus. Danda
erit theriaca, aut cardiacum ali-
quod medicamentum à nobis pri-
mo libro descriptum, ne extis prin-
cipibus quibus insidiatur pestilens
ille vapor, officiat.



De Tumore aquoso.

C A P. X.

Aquosus tumor mollis, &
prementi digito cedens, do-
loris omnino expers, frigidas & de-
cliues

cliues partes impetere solet. Aquo-
si tumores, quorum materia sobo-
les est pituita, Græcis ὄγκος ὑδατώ-
δης dicuntur.



De Tumoris aquosi causis.


C A P. XI.

Alimentorum prauitas ad
aquositatē inclinans, immo-
dicus frigidæ vel vini (quod
per accidens morbos frigidos exci-
tat) potus, ex immoderata repletio-
ne cruditas, porcellorum victima-
rum interanearum partium, & il-
larum extremarum frequens vsus,
lactis, piscium, iusculorum & lacti-
ciniorum omnium assiduus atque
intempestiuus vsus, causæ proca-
tarcticæ habentur. A distemperie
frigida labefactata alteratrix facul-
tas causa est corporea, maior enim
frigiditas requiritur ad aquosæ
substantiæ generationem quàm fla-
tulentæ. Et cùm calor quantumvis
exiguus aliquam humidæ substan-

292 *De Tumorib. præter naturam,*
tiæ partem in vaporem conuertit,
fit, vt aquosa pituita flatu omnino
priuari non possit, quemadmodum
flatulenta seroso humore.

A prædominanti facimus deno-
minationem, tacentes quod exi-
guum est. Nam si vtriusque sub-
stantiæ par esset portio, tumor mix-
tum & non sincerum nomen reti-
neret. Serosum abundans recremen-
tum in corporis parte aliqua colle-
ctum illam replens & distendens,
causa est continens. Si enim pitui-
ta refrigerato iecore in vniuerso
redundet corpore vt bilis icterum,
ita hæc leuco phlegmatiam siue
sarcitem efficit, in qua hydropis
specie videtur corpus innumeris
œdematis esse obsessum in deter-
minata corporis sede aggregata
œdema parit, vt iam fuit demon-
stratum, si serosa in corpore recre-
menta abundant aquam intercu-
tem ascitem vocatum procreare so-
lent, si in aliquam partem delapsa,
vt genu, articulos, illam repleant
atque distendant, aquoso tumori,
de

de quo agimus, ansam præbent. Quem iure optimo illegitimum œdema vocare possumus.



De Tumoris aquosi signis.

C A P. XII.

SI quis notas œdema legitimum ostendentes in memoriam reuocet, facile quæ huius affectus sunt nuntiæ percipiet, cum vtriusque morbi signa ferè eadem conspiciamus. Hac tamen ratione differre videntur, quod aquosus tumor magis laxus sit, quàm œdema legitimum, in quo maior apparet renitentia, percussus insuper aquosus tumor non tympani sonum, sed potius vtris aqua aut liquore alio semipleni edit.

Porro aquosi tumores frequentius in pedibus magnas capacitates habentibus, scroto, capite & iuncturis quàm in aliis corporis sedibus accidunt. Tum quia sua gravitate aquosus humor in illas delat-

N 3 bitur,

294 *De Tumorib. præter naturam,*
bitur, tum quod natura frigida à
caloris natiui fonte sint maximè
semita.



De Tumoris aquosi curatione.

C A P. XIII.

Cum isti tumores per rheu-
matismum fiant, fluxio à no-
bis, vt i. libro cap. de Phlegmone
scripsimus, est inhibenda, quod au-
tem iam fluxum est euacuandum.
Medentis igitur consilium duplex
sit oportet. Primum ad præcautio-
nem, postremum ad curationem
dirigitur. Vt autem hæc exequaris,
quatuor intentiones ob oculos pro-
positas habeas oportet.

Quarum prima te victus ratio-
nis huic morbo necessariae admo-
net. Secunda, vt defatigatam con-
coctricem facultatem instaures,
hortatur. Tertia in humoris serosi
per aluum & vrinas euacuatione
versatur. Quarta, vt topicis reme-
diis humorem parti impactum
eua

euacues , te docet.

Primum exequeris repetita ea victus ratione , quæ œdemati & flatulento tumori est commoda, modò vberius calfaciat & exiccet. Secunda præcedentibus dissimilis haud esse debet. Tertia sequentibus præfidiis vtendum suadet.

℥. Rad. liliorum alb. & althææ sing. ℥.iiij. maluarum, viol. branchæ vrsinæ, parietariæ, siclæ, mercurial. an. M. β. calament. puleg. origani sing. M. j. β. rutæ, cumini, anisi & feniculi sing. ℥. ij. caricarū pinguium num. xx. florum centaurij minoris, stœchados, roris marini an. p. j. furfuris macri p. j. fiat decoct. & in col. quar. v. dissol. hieræ picræ Gal. ℥. β. olei chamæm. amygd. amar. sing. ℥. j. β. mellis ros. col. sacch. rub. sing. ℥. j. vitellorum ouorum recentium num. ij. fiat clyster qui supponatur ante omnia.

℥. Glycirrhizæ recentis & rasæ ℥. j. menthæ, beton. melissæ, mercurial. sing. M. j. herb. capil. philipendulæ, primpinellæ, an. M. j. grano-

296 *De Tumorib. præter naturam,*
rum halicacabi pa.x.sem. anisi, fa-
niculi, milij solis sing. 3. j. fol. sennæ
& medullæ sem. carthami contusæ
sing. 3. iij. florum genistæ, cicerum
nigrorum, florum stœchados & ro-
rismar. sing. p. j. fiat decoctio & in
col. tb. j. β. dissol. mellis ros. colati &
sacch. albissimi sing. 3. iij. β. pulu.
nucis moschatæ & cinamomi inte-
rioris & electi sing. 3. j. fiat apoze-
ma clarificatum & aromatizatum,
capiat in 4. dosibus de mane.

℞. Elect. diacarth. 3. β. syr. ros.
solut. 3. j. aquarum asparagi & be-
tonicæ sing. 3. ij. Misce, fiat potio
danda post præcedentis apozema-
tis vsum cum regimine artis. Cata-
potia superius descripta sunt utilia.
Utilis etiam theriaca Andromachi
non recens, sed vetus, vel aurea
Alexandrina, pulvis pliris arcoti-
con, diamoschi dulcis utile & mi-
thridatium. Ciere lotium sequen-
tium medicaminum opera poterim-
us.

℞. Agrimonix, chamæpytheos,
chamedryos, pylofellæ, pimpinellæ
herb.

herb. capil. com. saxifrag. sing. M. j.
rad. diureticarum com. sing. ʒ. j. gly-
cirrhizæ recentis & rasæ ʒ. x. lein.
petros. apij, alkekengi, anisi, fœnicu-
li sing. ʒ. ij. rad. pæoniæ & rad. asa-
ri sing. ʒ. ʒ. flor. genistæ & cice-
rum nigrorum sing. p. ij. fiat decoct.
cape de col. t̃b. j. ʒ. in qua diss. syr.
capill. veneris, syr. de hyss. sing. ʒ. iiij.
ʒ. cinamomi interioris & electi, nu-
cis moschatæ sing. ʒ. ij. fiat apöze-
ma clarum & arom. capiat in 4.
vicibus prima luce, vel huius loco
vtatur sequenti.

℥. Pul. elect. tria fantali, rhabarb.
& seminib. duplic. ʒ. j. ʒ. seminis
apij, fœniculi & asparagi pulu.
sing. ʒ. j. ʒ. conser. capil. flor. ge-
nistæ & rad. apij. sing. ʒ. j. cinamo-
mi pul. ʒ. iiij. syr. de duab. radicib.
q. s. ad incorporandum. fiat opiata
de qua singulis matutinis capiet
ad quantitatem vnius castaneæ ho-
ris duabus ante prandium. vini al-
bi montani & exilis potus non erit
respuendus. Addendū erit sequenti-
bus medicamentis robur ventriculo.

N 5 . ℥. Pa

298 *De Tumorib. præter naturam,*

℥. Panem vnum nuperrimè è
clibano extractum & adhuc ca-
lentem, per medium diuisum gene-
roso vino madefactum sequenti
pulvere insperges.

℥. Galangæ minutæ, piperis al-
bi sing. 3. ij. sem. aneti, cumini sing.
3. iij. cariophyll. nucis moschatæ,
cardamomi, cyperi & calami odo-
rati sing. 3. ij. β. mastiches 3. iij.
misce, fiat puluis, applicetur ven-
triculo. Parandus erit hac arte al-
ter qui priore infrigiditato admo-
uebitur.

℥. Zingiberis non cariosi, ga-
langæ minutæ sing. 3. j. macis 3. j. β.
cinamomi electi 3. β. cardamomi
& cariophyllorum sing. 3. j. sacch.
albissimi ad pondus omnium, fiat
puluis de quo in suis ferculis ca-
piet 3. j.

Quartam intentionem perficie-
mus adhibitis medicaminibus ex-
siccantibus & digerentibus, vt est
oxyrhodinum salī mixtum, vel
spongia recens lixiuio saturata, cui
aliquid salis, aluminis, aphronitri,
aut

aut sulphuris miscere debemus: vel admouendum erit emplastrum ex apostolico Chirurgico paratum, vel sequens.

℞. Bdellij scytici, ammoniaci thymiamatis in aceto forti diss. sing. ʒ. j. β. sem. vrticæ, sulphuris viui, sem. sinapi, aristolochiæ rotundæ, salis nitri sing. ʒ. β. pyretri ʒ. ij. olei veteris, picis naualis & ceræ citrinæ sing. q. s. fiat Magdaleon, de quo conformetur emplastrum magnitudinis necessarię. Si his medicamentis non curetur tumor ferro aperiendus erit, & vlcerum sordidorum modo curandum erit à tumore factum vlcus.



De Strumis.

C A P. XIV.

Strumæ quas multi scrophulas appellant, Græcis *χολπιδες* dicuntur à charadibus petris per marinas aquas transparentibus: vel à porcis, in quo-

300 *De Tumorib. præter naturam,*
rum gutture frequentes reperiun-
tur; vel à porcorum multiplici par-
tu nomen desumpserunt. Indurati
sunt adenes, in ceruice, alis & in-
guinibus reperiuntur; rariùs in mu-
lierum mammis & mesenterio:
membrana includuntur, vt steato-
mata, atheromata, & melicerides,
de quibus quinto huius operis li-
bro differemus.

Plinius inter *χολράδες* & *δυσίμνες*
nullum discrimen ponens fœdissi-
mè lapsus est: constat enim hæc in-
ter se longo interuallo differre;
nam strumæ à crassa & quasi resic-
cata membrana inclusa pituita ori-
ginem trahunt, *δυσίμνες* à sanguine
crasso, quos paruas phlegmonas
antiqui vocabant. Præterea cerui-
cem, inguina chœrades molestant,
sed furunculi toto corpore in car-
nosis partibus fiunt: in chœradis
durities magis quàm tumor, in
furunculo cum tumore abscessus
est.

De



De Strumarum causis.

C A P. X V.



Truma pessimus, turpis ac sordidus (vt aliquibus placuit) morbus à casu, percussione, vel incauta victus ratione excitatur. Quò fit, vt pueri qui magni sunt comedones, & raram corpus habent, huic diro morbo sint obnoxij, non minus qui humidis & crassos succos gignentibus cibis aluntur, & gelidæ potu gaudent.

Ad hunc etiam morbum sunt valde propensi, qui carnosio & magno sunt capite, compressis & latis malis, collo crasso & breui, & qui in aëre turbido ac caliginoso versantur, regionesque cœnosis & statariis aquis finitimas incolunt, & pomeridiano somno atque comestationibus indulgent: & intempestius in phlegmone apocrousticorum medicamentorum vsus, lenta & crassa

302 *De Tumorib. præter naturam,*
& crassa pituita causa est corporea
& antecedens.

Accidit nonnunquam, quamvis
rarò, non ex pituita glutinosa, sed
carne ipsa resiccata duritiem con-
trahente, quod Medicarum defini-
tionum autor scripsisse visus est,
dicens : Struma est caro sicca, quæ
difficilè soluitur. Humor prædi-
ctus in parte aliqua corporis coa-
ceruatus, & frequenter membra-
na (quam plerique chystin vocant)
inclusus causa est continens. Stru-
ma sua duritie, & renitentia ad
scirrhum maximè accedit, vt 4.
libro vlteriùs demonstrabitur.



De Strumarum indiciis.

C A P. XVI.



Ignis à corporis habitu, ab
ea quæ præcessit victus
ratione sunt petenda, nec
non à tumoris figura, duritie & cu-
tis separatione, nam quæ mobiles
sunt, & veluti à carne secretæ, hu-
morem

morem membrana circumseptum esse significant. Recentes & rara corpora molestantes digeri sæpe videmus, inueteratas autem nunquam, aut ægrè, futuram harum suppurationem portendunt dolor, vehemens calor, in sinuosum tandem vlcus aut cancrum conuertuntur.

Quò plures apparent, & per membra prædicta oberrant, maiorem in internis partibus noxam subesse testantur. Aliæ sunt pendulæ, aliæ ita carni insertæ fixæ, vt digeri nequeant, neque sine magno periculo & molestia diuelli.



De Strumarum curatione.

C A P. XVII.



Strumarum curatio ab ea quæ scirrhus debetur, non est admodum varia. Nascitur enim scirrhus albus, cuius in com. simp. med. meminit Gal. à resiccata pituita. Harum itaque

ca. 16.
5. lib.

304 *De Tumorib. præter naturam,*
que curationem sic aggrediemur
institutis priùs 4. scopis : quorum
primus præcipit, vt probam & mor-
bi causæ aduersam victus rationem
præscribamus, qualis est ea quæ
calfacientem & resiccantem facul-
tatem, attenuantem & incidentem
habet, & multis aliis tumoribus
à frigido sicco ortis est commu-
nis.

Quocirca ab alimonia frigida
& humida abstinebit ægrotus, cui
utilior existit inedia repletionem.
Alimentis exsiccantibus fruatur,
hydromel aut medicatas aquas alu-
minosas, aut sulphurei saporis phā-
tasiā repræsentantes bibat, quarum
usus ab Arnaldo illa Vnouano ma-
ximè commendatur, & non solūm
strumis, sed herniæ gutturali sunt
salubres.

Secundus in humoris noxiij ap-
paratu consistit ac in lotij prouo-
catione. Concoquetur igitur in se-
quentem modum humor.

℞. Syr. de s. rad. mell. ros. col. &
syr. de stœchad sing. ʒ. ij. aquarum
fcenic.

fœnic. enulæ campanæ & hyssopi
sing. ʒ. iiij. zingiberis ʒ. iiij. misce,
fiat zulapium clar. & aro. pro 4.
dosibus. Vel sic.

℥. Ramentorum ligni gaiaci-
ni ʒ. vj. corticis eiusdem pul. ʒ. ʒ.
bulliant in x. lb. aquæ pluuiæ, do-
nec redeant ad medias, in deco-
ctum percolatum mittantur se-
quentia.

℥. Rad. fœnic. petroselini, apij,
ireos, enulæ câpanæ sing. ʒ. j. corticis
citri sicci, galangæ crassioris sing.
ʒ. vj. marrhubij viridis, melissæ, be-
tonicæ, summitatum thymi, herb.
capil. com. cristæ marinæ sing. M. j.
caricarum pinguium pa. xx. sem.
anisi, fœnic. petros. apij, fœseli mas-
sil. & dauci sing. ʒ. ij. passularum ab
acinis repurgatarum num. xxx. me-
dullæ carthami contusæ ʒ. ij. turbit
gummosi in melle ros. col. mace-
rati ʒ. ʒ. agarici optimi ʒ. iiij. zin-
giberis, salis gemmei sing. ʒ. j. flo-
rum centaury minoris, stœchados,
rorismarini & saluæ sing. p. j. fiat
decoctio, & in col. lb. j. ʒ. diff. mellis
optimè

306 *De Tumorib. præter naturam,*
optimè despumati & sacchari rub.
sing. ʒ. iiij. fiat apozema clar. & aro.
cum pulu. pliris cum moscho &
diagalangæ sing. ʒ. j. pro 4. aut
5. dosibus.

Tertius scopus nobis insinuat
præscribendum esse purgatorium
medicamen in sequentem modum.

℞. Elect. diacarth. & de citro so-
lut. sing. ʒ. ij. Vel sic.

℞. Turbit resinosi ʒ. j. zingiberis
ʒ. ʒ. sacchari albiss. ʒ. ij. fiat pulvis
tenuissimus, detur cum ʒ. iiij. iu-
ris galli nigri veteris. Vel sic.

℞. massæ pill. de hiera, pill. de aga-
rico & hermodact. maiorum sing.
ʒ. j. malaxetur cum melle ros. cola-
to. fiant pil. sex, quibus adde scam-
monij. ʒ. ij.

℞. Turbit selecti ʒ. j. ʒ. agarici ʒ.
iiij. scammonij ʒ. ʒ. aloës succoci-
trinæ ad pondus omnium, mala-
xentur cum succo marrhubij viri-
dis. fiat pasta pil. ex ʒ. j. fiant pillulæ
v. quas capiat hora 2. post mediam
noctē, cœna parca aut nulla præce-
dente, à qua si abstineat omnino,
erit

erit vtilissimum. de pil. residuo capiat sing. x. diebus 4. hora prædicta.

Quamuis in pituitosis morbis vomitus, ventriculum huius humoris cloacam expurgans, ab omnibus commendetur, quia tamen humorem à capite ad colli partes fluere facit, inutilem præsertim in principio & corpore non bene purgato, censemus. A gargarismatis etiam tunc erit abstinendum.

Euacuatio quæ fit secta vena in struma sine dolore, rubore, & corpus plenum non diuexante, quia detracto sanguine corpus magis refrigerat, damnatur, quæ concedi debet in corpore plethorico, struma rubra admodum tumida & dolente ex cephalica, si collum, ex iecoraria, si alas vel inguina discruciat.

Euacuato ex interuallis corpore, potionis vrinam cientis vsus à Guidone Cauliacensi commendatus erit ex vsu, quod noxium humorem in inferiores partes reuul-
sione

*cap. de
gland.*

308 *De Tumorib. præter naturam,*
sione quadam protrudat, quæ in
eum qui sequitur modum para-
bitur.

℞. Rad. s. diureticarum in oxy-
melite per horas xij. maceratarum
sing. ℥. j. rad. glycyrrhizæ recentis
℥. x. rad. spatulæ foetidæ, rad. ra-
phani & aristolochiæ rotundæ
sing. ℥. vj. scrophulariæ, philipen-
dulæ, pimpinellæ, pilosellæ, tanace-
ti, caulium rub. rubiæ maioris sing.
M. j. sem. vrticæ granorum iuniperi
sing. ℥. iij. cicerum nigrorum, flo-
rum genistæ sing. p. j. fiat decoctio,
facta col. ad lb. j. β. dissolue mellis
despumati ℥. viij. clarificetur. cap.
ieiunus ℥. iij. tribus horis ante
cibum. Galenus in curatiua me-
thodo veterem theriacam athana-
siam, ambrosiam commendat 14.
Meth.

Quartus scopus ad sequentia
medicamenta nos vocat.

℞. Ficuum pa. xx. maluarum,
viol. althææ cum toto an. M. j. flo-
rum chamom. meliloti, sambuci
sing. ℥. ij. decoquantur, pistentur,
& per

& per cribrum medicum transfundantur, adde postea farinę sem. lini, fœnugræci sing. ℥. ij. olei amygd. amar. olei de lilio sing. ℥. iiij. pinguedinis porci ℥. iiij. fiat cataplasma. Vel sic.

℞. massæ emplastri diachilonis minoris ireati ℥. iiij. malaxetur inunctis manibus oleo de lilio, fiat emplastrum. His medicamentis agendum est quando struinæ incipiunt, & parvæ apparent, ne medicamento calido maior fiat attractio. Sequentibus verò quando maiores conspiciuntur, & iam processerunt.

℞. Adipis suilli veteris ℥. iiij. resinæ pini ℥. iiij. æruginis rasilis ℥. j. farinæ lolij ℥. j. β. picis navales, & olei cheirini sing. q. s. ad malaxandum, fiat magdaleon, de quo necessaria emplastra formentur. Vel sic.

℞. Stercoris bubuli aceto incocti lb. j. calcis viuæ ℥. iiij. strigmentorum balnearum ℥. iiij. olei rutacci vel castorei q. s. fiat ad instar cataplasma

310 *De Tumorib. præter naturam,*
plasmatis. Vel sic.

℞. Rad. maluaufci, ebuli & ireos,
dracunculi & gladioli sing. ℥. iij.
sub prunis cocta pistentur diligen-
ter, & per colum medicum trans-
fundantur, addendo postea sulphu-
ris viui ℥. j. β. castorei ℥. j. salis gem-
mei ℥. x. olei de lilio aut huius fæ-
cis ℥. iiij. fiat cataplasma. Vel
sic.

℞. Diachilonis magni cum gum-
mis, & massæ emplastri chirurgici
sing. ℥. iij. amurcæ olei de lilio q. s.
ad malaxandum. fiat mag.

℞. Olei veteris lb. j. galbani, la-
dani qu. vnum lithargyri ℥. x. æru-
ginis rasilis ℥. viij. picis aridæ lb.
β. redigatur in pollinem tenuis-
simum lithargyrum, & cum oleo
coquatur, & vbi inspissatum erit,
superponatur pix cum rasili æru-
gine, & in fine ponatur ladanum
cum galbano, reducantur ad cera-
ti consistentiam. Vel sic.

℞. Sulphutis viui, sem. sinapi,
urticæ, rutæ sing. ℥. iiij. lithargy-
ri auri ℥. iij. muccag. sem. fœnu-
græci,

græci, althææ, lini sing. \mathfrak{z} . j. β . axungia porci veteris, anatis & anseris sing. \mathfrak{z} . iiij. bulliat lithargyrum cum oleo, rudicula buxæ semper agitando, postea mixtis muccagimbus iterum decoquantur, & in descensu ab igne misce rad. iridis \mathfrak{z} . ij. fiat magdaleon, quod experientia demonstrante est optimum. In aures etiam mittemus cum bombace sequens præsidium.

\mathfrak{R} . Fellis testudinis \mathfrak{z} . j. diss. in oleo de lilio guttas aliquot calidas, vel ol. amygd. amar. vel de croco tantundem. Potest etiam vnguentum sequens præscribi.

\mathfrak{R} . succorum rutæ agrestis, agrimonie sing. \mathfrak{z} . iiij. sem. vrticæ \mathfrak{z} . ij. ammoniaci thymiamatis, bdellij in forti aceto dissoluti sing. \mathfrak{z} . iiij. lapidis pūmicis, aristolochiæ rotundæ, & sulphuris viui sing. \mathfrak{z} . β . Euphorbij \mathfrak{z} . j. β . axungia taxi, vulpis sing. \mathfrak{z} . iiij. olei de castoreo, de lateribus sing. \mathfrak{z} . iiij. ceræ q.s. fiat vng. adde aquæ vitæ \mathfrak{z} . j. β .

312 *De Tumorib. præter naturam,*
j. β. ante huius vnguenti vsum fri-
centur strumæ, donec cutis rubere
incipiat.

Multa sunt medicamenta à ve-
teribus tradita, quæ à cæca pro-
prietate strumas discutere nata
sunt: qualia nasturtij semen, vn-
gula asini combusta, mustelæ cre-
mata cinis melli mixtus, radix
plantaginis collo appensa, tere-
binthina cum butyro, serpentis
senecta, viticis cinis, & multa
alia.

Quod si horum medicamentorū
opera discuti nequeant, tunc ad
chirurgiam confugiendum erit,
aut ad inuictissimum simul &
Christianissimum Galliarum Re-
gem, qui numine afflatus diuino,
suo contactu strumas persanat.

Strumæ quæ à frigido humore
scaturiunt, & illum membrana
conclusum habent, ægrius multò
his quæ à cal. & frigidi humoris
miscella fiunt, curantur. Cogi-
mur sæpe vbi malacticis & dige-
rentibus medicamentis non cedūt,
ad

ad suppurantes medicinas nos conuertere, candenti postea ferro aut medicamento caustico has aperire, detergere, & prædicto medicamento membranam totam absumere, ne etiam illius parte exigua manente rediuius morbus sit. Sed citra magnum ægroti periculum non facile fieri existimemus oportet, præsertim si abditæ & profundæ sint; nam his suppuratis & ruptis, metucendum est ne in pulmones defluens pus ægrum præfocet, si recurrentibus nervis, carotidibus aut sphagitidibus impactæ sint. Harum sectio ob grauissima quæ ex hac excitantur pathemata, est admodum reformidanda, nam illa Galeni parœmia in nos cudi posset: curato morbo vitam cū morte commutauit æger. Quod si pituitæ atra bilis sit permixta, ferocior maligniorque erit struma, quæ tandem & erosa & vlcerata, carcinomatis speciem æmulabitur, & carcinodes tum vocabitur.

Anno superiori memini ego no-
O bilcm

314 *De Tumorib. præter naturam,*
bilem quendam in pago Caufami-
ni à Carpenctoraëto & Auenione
tribus milliaribus distante educa-
tum, recuperandæ salutis gratia (ut
multi solent) ad nos venisse, qui
multis hisque inueteratis strumis
obsessus vnâ inter alias miræ
magnitudinis, in dextera colli in-
feriore parte prope clauiculam ha-
bebat, cuius magnus tumor durus
& renitens subobscurum colorem
repræsentans, in superficie cancri
simulachrum intuentibus præbe-
bat. Vocatus fui in consilium à
Guilelmo Lauterio Chirurgo do-
ctissimo simul & exercitatissimo,
cum Laurentio Iouberto Delphi-
nate, doctore Medico & professore
in hac Academia Regio. Et vbi
de morbi constitutione, causis, gra-
uissimis symptomatis (laborabat
enim febris, & maximè molestante
dyspnœa) deliberatum fuit, ad pro-
gnosticum conuersi affinibus &
amicis futuram mortem prædixi-
mus, quo mortuo & dissecto, in illa
magna struma inuenta fuit caro
alba

alba pituitosa, & ita dura, vt nouacula vix posset dissecari. In partibus verò internis circa pancreas & sinistram mesaræi partem magnus abscessus feroso cruore plenus, lienem & septum transuersum maxime comprimens.



*De Gangliis & alijs pituitosis
tumoribus.*

C A P. XVIII.

Ganglion, glandula, tumor qui à neotericis lupia dicitur, à pituitoso humore scaturiunt, sedibus, symptomatis & figura inter se differunt. Est enim ganglion à neotericis nodus vocatum nerui tumor, ex lenta crassaque pituita, quale neruorum nutrimentum, à vi externa, casu scilicet, laboribus excitatum: rarò enim sponte prouenit hic tumor, inæqualis extremis membris nascitur, rarò in cubito, capite & corpore reliquo, renitens est, & in latera

O 2 pressus

316 *De Tumorib. præter naturam,*
pressus diuertit, tunica includi Cel-
sus scripsit cap. 6. lib. 7. quod multi
negant.

Glandula, *αδένω* Græcis dicitur,
est corporis pars simplex, satis mol-
lis, spongiosa & friabilis. Est autem
glandularum genus duplex, usus
quoque geminus. Aliquæ enim
sunt veluti diuisionum vasorum
stabilimentum illa firmantes, sen-
sum & motum nequaquam haben-
tes. Aliæ ad utilis succi generatio-
nem procreatæ, arteriarum, vena-
rum, neruorum sensum suppedi-
tantium sodalitium admittunt.

Quæ ad succi utilis generatio-
nem sunt comparatæ, glandulosa
potius corpora quàm glandulæ vo-
cantur. Has nonnunquam inflam-
mari contingit, ut primo libro do-
cuimus, sæpe humore pituitoso im-
butæ tumidæ euadunt. Quam cer-
tè ob raritatem facillè recipiunt, &
receptam ob excretoriæ facultatis
imbecillitatem, retinent, figuram
oblongam cum rotunditate qua-
dam habent, strumis (quæ sunt
etiam


etiam serosæ glandulæ) molliores, neque vt illæ numerosæ in multis corporis sedibus sitæ, in emunctoriis magis emicant. Sunt hæc veluti principum partium cloacæ & emissoria.

Nascitur & ille tumor, à Guidone Lupia vocatus, in siccis partibus oui tumorem aut æquans, aut superans, qualem ego in Lodouico Saporta auo meo crudo & viridi sene, ac Medico doctissimo, vidi, cui à teneris annis obortus ille magnus in dextera capitis parte tumor glaber & pellucens doloris expers nullum negotium faceſſebat.: qui cum ad extremam senectutem peruenisset (occubuit enim nonaginta & octo annos natus correptus febris quartana) paulò ante mortem suppuratus non à medicamento, sed à natura in illo maximè valida, tumor in melliceridem versus & sponte apertus, humorem melli simillimum euomuit, à quo tam planè fuit liberatus, vt nemo tali affectu probum senem

318 *De Tumorib. præter naturam,*
laborasse putasset.

Iohannes cognomento Schiromius, non sine magna honoris præfatione à me nominandus (ob incredibilem in bonis literis & re Medica peritiam , nostræ Academiæ Cancellarius & primus Professor Regius dignissimus) tumorem Lupiam vocatum insignem in manus lævæ , & extrema radij parte versûs carpum habuit. Tumor hic à causâ pituitosa etiam trahit originem , quem cum ganglio plerique confuderunt. Halucinantur qui Lupiam cum Lupo carcinomatis specie eandem faciunt. Est enim vlcus malignum lupus ex phagedænæ sobole coxas & crura infestans , & subiectas carnes luporum animalium more depascens.

De



*De Ganglij & aliorum tumorum
à pituita procreatorum
curatione.*

C A P. XIX.

PRæsçripta hac victus ratio-
ne quæ præcedentibus tu-
moribus est congrua, & pur-
gato frequenter phlegmagogis me-
dicamentis corpore, ad topicorum
præsidiolorum usum migrandum erit;
quæ malactica magis, digerentia
minus sint oportet. Gangliis se-
quens remedium erit ex usu.

℞. Diachylonis minoris ireati
℥.iii. vel diachylonis magni tau-
tunlem. Vel utere sequenti.

℞. Aloës & myrrhæ sing. ℥.j.β.
lithargyri auti ℥.ij. ladani puri ℥. j.
ammoniaci thymiamatis, adipis vi-
tul & vulpini sing. ℥. j. β. olei de
lilib ℥. iiij. ceræ citrinæ q. s. fiat
Mgdaleon, ex eo construatur em-
plastrum magnitudinis necessariae.
Vt sic.

O 4 ℞. Adi

320 *De Tumorib. præter naturam,*

℞. Adipis anserini, æsopi sing. ℥. ij. mastiches, terebinthinæ, galbani & opopanax recentium sing. ℥. j. β. fæcis olei de lilio ℥. iiij. ceræ citrinæ q.s. fiat Magdaleon. Vel sic.

℞. Calcis viuæ, adipis anserini sing. ℥. ij. terebinthinæ ℥. iiij. simul bene mixta ganglion dissolunt. Vel sic.

℞. Galbani, ammoniaci thymiamatis sing. ℥. ij. adipis ciconiæ, arseris sing. ℥. ij. β. olei veteris ℥. iiij. ceræ q.s. fiat ceratum.

Multi plumbi bracteam ganglion totum comprehendentem parti al mouët, eamque arctissimè constringunt alligantque, facultatis quippe digerentis est plumbum, non solum aquosæ à frigido concretæ, sed æthereæ substantiæ particeps.

Similibus præsidiis glandula & lupia profligari possunt, à quibus si non vincantur, suppurantium vus erit salubris. Poterunt autem insequentem præscribi modum.

℞. Rad. liliorū alborum, ibiscæ & ebulorum sing. ℥. iiij. rad. filicis, pæ-

niæ & asphodelorum sing. ℥. ij. caricarum pinguium pa. xxx. rad. caulium & scyllæ sing. ℥. j. β. florum meliloti & sambuci sing. p. j. decoquantur in iure pedum & intestinorum veruecis, addita aceti pauca quantitate: pistentur postea diligenter, & per cribrum medicum transfundantur. Adde postea farinæ frumenti, lupinorum sing. ℥. iiij. axungia suillæ veteris, anatis & anseris sing. ℥. iiij. facis olei de lilio lb. β. fiat cataplasma.

Suppurato tandem tumori, cuius suppurationem ex notis primo libro traditis deprehendes, adigendum erit candens ferrum, aut apponendum pyroticum aliquod medicamentum, & pure euacuato, cum vlcus ex sordidorum sit classe, vng. ab Aui. & Chirurgorū schola apostolorum vocato, aut Ægyptiaco erit digerendum, & emplastro nigro, vel diapalma agglutinandum.

Reliqui tumores tam duri sunt & membrana circumsepti, vt medicamentorum facultatem asper-

322 *De Tumorib. præter naturam,*
nentur, ipsisque multo sint superiores. Tunc nouacula ineunda erit
sectio oblonga, & myrti figuram
referens. Et hac bene dilatanda cu-
tis, vt totus tumor tum membrana
extrahatur, nullaque illius portio,
si fieri possit, remaneat, ne irrita sit
curantis Chirurgi opera, astringenti-
bus medicamentis erit supprimenda
hæmorrhagia, donec citra sangui-
nis euacuatione cuelli possit. Quod
si aliquam membranæ partem re-
mansisse arbitreris, cathetico me-
dicamento præcipitati pulueris, vel
arsenici exigua quantitate in vali-
do præsertim corpore illam absu-
mes. Butyro aut tetrapharmaco,
aut pingui medicina escharæ ca-
sum procurabis, deterso postea ritè
ulcere agglutinationem huius mo-
lieris. Struma carcinodes medica-
minibus cancro ulcerato dicatis
curanda erit, vt quarto huius ope-
ris libro ostendetur.

De



De Varis.

C A P. XX.

IN faciei cute tumor durus & exiguus nascitur, à pituitoso & crasso humore originem trahens, ἰὸνθαῖς Græcis, Varus Latinis appellatus, faciem conspurcans, & maculis fœdans, non pruriginosus, neque ad scalpendum inuitans, à fifico tumore in mento nascente varius, quod hic non ab humore crasso solum, sed à tenui simul & sanioso nascatur, & cum facile vlceretur, siccioribus ipsis varis medicamentis eget. Varus duplex, callosus, & maximè durus vnus, alter minus.



De Varorum curatione.

C A P. XXI.

IN curandis varis post institutam victus rationem, cuius

324 *De Tumorib. pater naturam,*
superiùs meminimus, & corporis
vniuersi purgationem, indicatione
gemina vti oportet, vna quæ à du-
ritie desumitur, altera à tumore;
emollientibus durities, sed discu-
tientibus tumor indiget. Qui mol-
lior est, Critonis remediis in se-
quentem curabitur modum.

℞. Mellis optimi ℥. j. β. aceti acer-
rimi tantumdē, mixtis diligenter
varos inungito digito illinens &
perfricans. Vel sic.

℞. Lithargyri auri ℥. iij. terebinth.
℥. β. olei communis parum, misce,
& medicamentum vtrisque mani-
bus contritum varis circumlinito,
vel amaris amygdalis diligenter
tritis, & aceto dissolutis faciem il-
linito, & vbi manè è lecto patiens
surrexerit, monendus est vt lacte
faciem lauet, aut aqua aluminosa.
Callosos verò & duros sic proflig-
are tentabis.

℞. Saponis gallici ℥. β. ammo-
niaci thymiamatis ℥. j. β. thuris
tantumdē, aqua dissoluantur, do-
nec cerati crassitudinē assequantur,
varos

varos linito & aqua abluito transfactis duabus horis. Vel sic.

℥. Foliorum hyssopi, pulegij sicc. sing. ʒ. ss. salis fossitij, nitri rubri sing. ʒ. iij. aluminis scissilis, seminis ocimi sing. ʒ. ij. puluerentur subtilissimè, adipe anserino vel galinaceo excipiantur, fiat linimentū.



De Hydrocephalo, siue capitis aquoso tumore.

C A P. XXII.

A Quosus capitis tumor, quē ὕδρoκεφαλον Græci vocant, morbus est segnis & piger, in tribus capitis locis illius causa colligitur, & tres sortitur differentias: nā aut inter cutem & pericranium, vel inter hoc & caluariā: aut inter caluariam, & durā meningē aquosus tumorē faciens humor colligitur. Auicenn. aquam extra cranium vocat fen. 3. tertij, tract. 4. c. 11. Nuperrimè natis pueris hic affectus est familiaris & proprius, qui

iudicium ferente , quem nulla præsidia à morte vindicare potuerunt.

Fit etiam ex vnius vasis, aut multorum ruptura ab aliqua contundente re parta , & sanguine qui ex ruptis vasis manat , in peregrinam substantiam mutato ; sæpe etiam ob magnam vasorum raritatem tãquam per diapedesim is resudat, & inter cutem & membranam caluariã tegentẽ recipitur: tunc tumor apparẽs tactu mollis, indolens, turgidus, concolor, puluino similis (vť Paulus ait) exigua capitis parte prementibus digitis subsidens , facillè cedit, & rursus assurgit , & si inter pericranium & caluariã sit concretus humor, durior est tumor, & lentè cedit, vť qui etiam pluribus locis sublabatur, dolorque magis vrget. Si inter cerebri membranam & cranium contentus sit succus , tumor quidem erit, sed qui prementi non cedat , neque tactu sit mollis: dolor acrior est , frons ipsa foras producitur , & oculis inconniuentibus

328 *De Tumorib. præter naturam,*
uentibus cernunt, & crebriùs il-
lacrymant, quibus ob iam despe-
ratam salutem manus non est ad-
mouenda, quamuis plerique tere-
bra os eximere tentarint.



De Hydrocephali curatione.

C A P. XXIV.


AB alimentis multo humore
perfusis vaporulentisque, ip-
sumque caput tentantibus, abstine-
bit æger, in aëre sicco claro versa-
bitur. Nutrici euchyma ad siccita-
tem vergens victus ratio institue-
tur. Veneri interdicens, ne vi-
roso lacte nutritus infans ma-
iorem noxam subeat; vini loco
aquam hordei bibat, & à balneo
abstineat, præsertim si ex notis de-
prehendas tumorem caloris esse
participem. Exiguo tumori iuxta
Auicennæ præceptum admouen-
da erunt digerentia medicamen-
ta, in sequentem instituta mo-
dum,

℥. Mas

℞. Massæ emplastri de melilotto ℥. ij. massæ emplast. diachilon. minoris ℥. j. pulueris iridis florētiae ℥. β. florum sambuci ℥. ij. malaxentur inunctis manibus oleo keirino. fiat emplastrum; cui terebinthinæ parum addet.

In maioris tumoris curatione ad chirurgiam confugiendum erit, ipsiusque acutior pars rutilante ferro, aut nouacula secanda, vt quidquid humoris noxij coaceruatum est, possit euacuari. Partem infer-tis ligaturis commodè deligabimus, & tridui spatio æneleo perfundemus. Labia tandem post humidi humoris excretionem agglutinabuntur præsidis huic negotio dicatis, si subiectum os propter cariem carnem non recipiat, ferro illud leniter rademus.

De

*De Hydrope.*

C A P. XXV.

HVM hydrops fit in genere tumorum præter naturam, non erit à ratione alienum, vt de ipso & ipsius differentiis aliquid proferamus, doceamúsque causas hunc dirum morbum excitantes, & notas aperiamus, quibus apertis methodũ curatiuam trademus. ὕδρωψ ab ὕδωρ Græcis, aqua subter cutẽ fusa Latinis dictus, tres habet differentias, tametsi Hipp. 4. de rat. vict. in morb. acut. duas solum constituat, tympanitem & ascitem eiusdem naturæ, proferens & sarcitem siue leucophlegmatiam alteram.

Primam speciem hypofarcidion, anasarcam, sarcitem aut leucophlegmatiam: secundam tympaniã: tertiam ascitem seu vtriculariam Gal. affectu statuant. Et inter omnes species iure optimo anasarca propriè
hydrops

hydrops appellatur, eo quod toto corpore solidæ partes in aquæ naturam resolvuntur, cum in cæteris speciebus in aquam & flatum conuersuscibus inter intestina & tunicâ peritoneû vocatam, diffundatur.

Omni bus vna est communis causa, nempe hepatis insignis error, vel in sanguinis generatione diminutio. Nam quemadmodum feбри molestari corpus nequaquam potest, nisi cor viscus princeps afficiatur: ita neque oriri hydrops, nisi ex idiopathia aut consortij lege, iecur facultatis naturalis domicilium grauter laboret.




De Anasarca.

C A P. XXVI.

HYdrops sarcites vocatus, ad carnem tanquam ad præcipuam partem refertur, quoniam refrigeratum iecur non potest sanguinem probum gignere, sed pituitosum, frigidum & liquidum,

332 *De Tumorib. præter naturam,*
dum, qui per venas in singulas corporis partes distributus, habitum corporis frigidum & pituitosum reddit, sequiturque ipsa frigida & pituitosa nutritio, iam similis, & nouus succedens succus, corporis partes in tumorem attollit: apparetque corpus, ac si esset multis œdematis obsessum: quod si in aliquam partem digitum impingas, fossam remanere experieris. Fit autem hoc quod alimentum agglutinari non possit, neque vinci. Nam cum tres sint nutritoriæ facultatis operationes, quibus 4. facultates ancillantur, fit ut læsa priore, reliquæ ab hac prodeuntes lædantur, ut in atrophia, non tamen læsa secundâ (ut in hydrope primam) lædi, protinus veritati consentaneum est; neque tertiâ, duas priores, ut cum vitiligine, lepra, psora, & elephantiasi corpus afficitur, videre licet.

De



De Anasarca causis.

C A P. XXVII.

Anasarca causæ procatacti-
cæ plures statuuntur, ab his
quæ cachexiam hydropis
prodromum, & alias species pro-
creant sola vehementia dissimiles:
ex quarum classe sunt vehemens
aëris caliditas, calorem natium
hepatis deiiciens, vehemens frigi-
ditas, immoderata exercitatio,
quies assidua, balneum immodicè
infrigidans vel calfaciens, longus
& grauis somnus, corporis calorem
dissipantes iuges vigiliæ, mœror
maximus, cibi insuper pituitosum
humorem gignētes, vini meracio-
ris assiduus & intēpestius potus,
ac frigida & vitiosa vsus conti-
nuus, excrementorum suppressio,
coitus immoderatus; & omnia quæ
natium hepatis calorē absumere
possunt, & illius robur plurimum
deiicere, externæ causæ habentur.

Fru

334 *De Tumorib. præter naturam,*
Fructuum & lactucarum intempe-
stius vsus, præsertim dum æstu aut
exercitatione corpus incaluit.

Corporeæ causæ hydropisis &
antecedentes sunt hepatis intem-
peries impensè frigida, vel calida,
præsertim laborante primogenia
affectione hepate, ut ea quæ fit
Hipp. à morbo acuto, & lethalis est. In-
2. prog. signis huius visceris obstructio,
Apher. phlegmone, scirrhus, fit etiam con-
1. sentientibus hepati nutritioni di-
catis partibus, ut ventriculo, sple-
ne, mesaræo, renibus, graciliori-
bus intestinis, ex quibus cum sua
munia non exercent, hepar vehe-
menter refrigeratur, quod etiam
per sympathiam pori cholidochi,
pulmonum, septi transversi com-
municato ex his hepati malo ex-
citari frequenter videmus: nec
non ex suppressis, vel immodicè
fluentibus mensibus, mariscis, sup-
pressa vrina, vel immoderato san-
guinis ex naribus fluore, ipsoque
muliebri fluxu. Calor enim na-
tius per sanguinem consistentiam
habet,

habet, quo euacuato refrigerari iecur illius officinam oportet, retentis etiam naturalibus purgationibus, veluti in viridium lignorum copia ignis; nativus hepatis calor præfocatus albam & tenuem sanguinis probi loco pituitam generans, quæ anasarcae causa est continens, huic ansem suppetat, deducit enim carnem in sui naturam.

Quapropter explodenda est Erasistrati sententia, omnes hydropes ex solo hepatis scirrho fieri existimantis. Pueri hoc malo sæpe corripuntur, quo foeminae ob assuetas purgationes minus quàm viri tentantur.



De Anasarcae indicis.

C A P. XXVIII.


Signa hunc affectum commoſtrantia duplicia ſtatuuntur; communia alia omnibus hydropis ſpeciebus, propria alia

336 *De Tumorib. præter naturam,*
alia. Communia sunt pedum tumor, vesperi maximè, qui promptius brachiis, & manibus tument, tanquam partes à caloris fonte magis distantes, frigidiores, & magnas cauitates habentes, quibus impactus frigidus humor benè agglutinari nequit. Brachia & manus partes sunt exercitatiores, ob hoc calidiores & excrementa magis digerentes. Spirandi insuper difficultas, corporis grauitas, tumor & vitiatu color, ex virore, albicante ægro, cibi fastidium, potus largioris appetentia, vrinæ albæ & paucae, pulsus paruus & mollis, frequens & inæqualis: sensum & non *α' σπύης* omnis hydrops excitatur.

Propria sunt moles totius corporis, caro spongiæ instar madida & laxa, emortuo simile corpus, digito pressæ extremæ corporis partes foueam retinent. In pedibus propter humoris grauitatem tumor maior, quàm in reliquo
corpo

corpore , diutinos morbos & amphimerinas febres sequi solet , febris lenta & assidua corpus conficit. Sola magnitudine à cachexia differt.

Anasarcae vlcera curationem non admittunt, vt ab Hipp. Aph. 8. lib. 6. ostensum fuit. Hanc, cum siccis remediis ad cicatricem vlcera perducantur , fieri præpedit redundans humiditas. In ascite etiam curari non possunt non solum ob humidæ substantiæ copiam , sed quod corporis non exactè nutriti, facultates sint imbecillæ : vel si qua sit humiditas, ea est acrior quàm naturæ sit necessaria.



De Anasarca curatione.

C A P. XXIX.

Quemadmodum omnes hydropis differentiæ communes aliquas notas habent, quæ à nobis superius fuere recensitæ : ita communem habent curationem

P tio

338 *De Tumorib. præter naturam,*
tionis modum, nempe euacuationem catharticis & hydragogis, ascites, tympanias, nonnunquam venæ sectione anasarca depelli debet.

Sed antequam euacuationem aggrediamur, diligenter contemplanda est causa quæ hanc peperit, quippe quod pro causarum diuersitate varianda sit curatio. Qui à causa calida, vt à febre, vel hepatis calida intemperie scaturit hydrops, ægrius multò quàm qui à frigida, profligatur.

Quod si argutulus quispiam dicat, oportere effectum suæ causæ responderè. Atqui febris hydropem excitans morbus est calidus & siccus, hydrops frigidus & humidus, quî igitur fieri potest vt ex febre oriatur hydrops? Cui satisfactum volumus, hoc per accidens, & non per se fieri posse. Calidum enim præter naturam, docète Auerrhoë Mauritano, naturale extinguit, fitque hepar natiua caliditate frigidum, quæ res ab Arist. 4. Meteorologi

logicarum impressionum de putredine loquente fuit optimè ostensa.

Rursus infurget proferens contraria contrariis curari, vt disertè in Aph. de conuulsione loquens Hip. ostendit. Febris igitur tantum abest vt hydropem debeat excitare, vt hanc potiùs soluat, aut hydrops febrì contrarius affectus, febrì sit remedio. Porro vnum alterum, quamuis intemperie sit contrarium, tollere non potest. Carnosus nempe hydrops plurimum huius pituitosi in totius corporis habitu humoris habet, qui obstructis meatibus putrescit, febrem igitur adauget. Ventosus quoque discuti non potest. Calor enim præter naturam causam non tollit, sed potiùs flatus adauget, aquosus ab hepatis intemperie oritur, febris intemperiem maiorem efficit. Ergo hydropem nullo pacto tollit.

Ad leucophlegmatiaë itaque curationem tres nobis proponuntur scopi, quorum primus victus probam rationem, & aliis hydropis

340 *De Tumorib. præter naturam,*
speciebus communem instituit.
Versabitur igitur æger in aëre sic-
co, perspirabili, tenui, & loco ad
boream potius quàm austrum in-
clinante, præsertim si febris adsit,
vliginosam & statariis aquis pro-
ximam habitationem acutum tan-
quàm scopulum deuitabit. Sit pa-
nis clibanites ex semidalite, & pau-
co hordeo paratus, bene ferment-
tatus & coctus, cui salis, seminis
anisi, fæniculi, petroselini momen-
tum miscebis. Ex secale & aliis le-
guminibus constructus planè est
inutilis: siligineo quamvis probo
ægotantem saturari cauebis. Ex
oleribus vitanda quæ frigida &
humida sunt, vt lactuca, malua, por-
tulaca, borrago: quæ extenuandi,
euacuandi, calefaciendi facultate
sunt prædita prosequenda, vt sit in
cibo medicina. Quapropter apium,
daucum, fæniculi turiones, aspara-
gorum cacumina, erucam, pule-
gium, cæpas, porra, allia cæpis mi-
nus siticulosa, ex usu esse non am-
biges. Ex piscibus inutiles omnes,
præ

præsertim qui in cœnosis, & cloacarum colluie conspurcatis aquis versantur, quique molli & putredini obnoxia carne constant, quos Philotimus malacosarcos vocauit. Saxatiles squammis intectos, in libero altoque mari degentes, friabilem carnem habentes, vino vel paucò aceto incoctos, piperis, cinnamomi aut nucis myristicæ momento inspersos conferre non dubitabis, quorum esus parcus erit. Ex carnibus agnina, suilla, bubula, hircina, leporina, aquatiliū auium & omnium saginatarum vitanda. Sed pullorum, hœdi, vituli, siluestrium animalium potius quàm domesticarum, merularum, turdorum, perdicum montanarum, turturum, ficedularum concedenda; terrestribus erinacei resiccata cæca proprietate carnosò hydrope infestatos iuuat.

Sit in ciborum præparatione delectus, nam assa elixis sunt multò hoc malo detentis utiliora, offis & iusculis nequaquam est indulgendum.

342 *De Tumorib. præter naturam,*
dum. Viperæ caro utilis, nisi sitic-
culosa esset. Ex fructibus damnan-
tur qui humidi maximè sunt, qui
ad tertiam vsque coctionem in hac
specie maximè labefactatam flatu
seruant, qualia sunt poma; respuen-
dæ sunt castaneæ, iuglandes, & re-
liqui vaporulenti ac coctionis ope-
rosæ, vuæ passæ, amygdalæ, auella-
næ torrefactæ probantur, astrin-
gentium, vt pyrorum, mespilorum;
malorum cotoneorū vsus respuen-
dus, necnon casei & lactis ouilli &
bubuli. A leguminibus abstineto,
& maximè in tympanite, præter-
quàm nigrorum cicerum decocto;
in quo petroselini radices defer-
buerint.

Aquæ potus niue potissimum
infrigidatæ noxius, cuius loco de-
ligendum erit vinum non dulce
turbidum, sed vermiculum aut al-
bum, non montanum & oligopho-
rum, sed generosum & annosum,
aqua asparagi aut apij mediocriter
dilutum. Si à potu omnino absti-
nere posset, maxima ex ea re ori-
retur

retur utilitas , quod si nequeat, & inexhausta siti (ut solent) premere-
tar, parcè & non cum cibo biben-
dum erit, sed transactis duabus tri-
busue horis, aut iam plenè in ven-
triculo concocto cibo. Labores ci-
bum præcedant, & per maritima
loca sit illorum incessus. Vehe-
mentes frictiones conducunt qui-
bus corpus ab obstructionibus vin-
dicatur, & illius tumor digesto ali-
qua ex parte humore minuitur.
Sicionio costino aliquoue tenuium
partium oleo perfricandum corpus
erit. Somnus sit moderatus, debi-
tum naturæ tempus excedens, ut
insalubris est, ita iuges vigiliæ per-
niciosæ; à cibo statim somno cor-
pus non tradat, sed interpositis
aliquot horis. Pomeridianum tan-
quam venenatum anguem deuitet,
ex quo plerosque in cachexiam de-
cidisse experientia est confirma-
tum. Animi symptomata, iram præ-
cipuè coërceat, & his quæ ipsum
exhilarare possunt, fruatur.

Secundus scopus in causæ ab-

344 *De Tumorib. præter naturam,*
fiffione totus incumbit. Prius ta-
men accuratè expendendum est,
fiâtne anasarca laborante primogē-
nia affectione hepate, an ex men-
sium vel mariscarum suppressione,
aut ex veteri curata varice hæc
oboriatur. Tunc enim, vt solitæ
suscitentur purgationes, tundenda
erit paulo ante mensium eruptio-
nis tempus poplitis aut malleoli
interna vena, aut euacuato eo qui
sua quantitate hepatis calorem op-
primebat sanguine, hoc meliorem
& corpori vtiliorem hæmatosinfa-
ciat. Adstantibusque mittendi san-
guinis scopis, non copiosè, neque
semel, sed ex longis interuallis san-
guinem detrahemus, malleolorum
venas tundemus, vel vocatam ma-
riscam aperiemus. Erit omnino à
sectione venæ abstinendum, si fri-
gida hepatis intemperies morbo
ansam suppeditet. Tunc pituito-
sum humorem in corporis habi-
tum conspersum sequentibus me-
dicamentis & concoquemus, &
educemus, & clysterè supponemus.

℥. Rad.

℞. Rad. liliorum alborum ℥. ij. maluarum viol. althææ cum toto, siclæ sing. M. s. summitatum rutæ, origani, calamenti, pulegij, vtriufque abrotani, maioranæ, saluiæ sing. M. j. sem. anisi, fœnic. cumini, dauci, & rutæ sing. ℥. ij. caricarum pinguium num. xxx. medullæ carthami contrusæ ℥. j. agarici ℥. s. florum chamom. meliloti, sambuci & stœchados sing. p. j. fiat decoct. & in col. lb. j. diss. cassiæ cum melle ℥. vj. hieræ picræ ℥. s. olei rutacei, de lilio, mellis torismarini & sacch. rubri an. q. s. succi mercurialis ℥. j. misce, fiat clyster.

℞. Syr. rosati ex 9. rosarum infusionibus ℥. ij. catholici ℥. s. decocti cicerum nigrorum ℥. iiij. misce, fiat potio, quæ detur postridie ab iniectione clysmatis.

℞. Rad. filicis masculæ, rad. v. aperitiuarum com. in vino albo per xij. horas maceratarū sing. ℥. j. rad. asari & corticis citri sicci sing. ℥. s. glycirrh. recentis & rasæ ℥. x. brasseæ marinæ, agrimonie, pedis

P s colum

346 *De Tumorib. præter naturam,*
columbini; herb. cap. com. chamæ-
py. chamædryos, vtriusque cicho-
rij cum rad. fumarix, vtriusque
hepaticæ & mercurialis sing. M. j.
sem. anisi, asparagi, fæniculi &
dauci sing. 3. j. caricarum pin-
guum num. xx. foliorum sennæ,
polypodij quercini recentis & me-
dullæ carthami contusæ sing. 3. ij.
agarici in ligatura positi 3. ss. flo-
rum genistæ, cicerum rubrorum
sing. p. ij. florum bugloss. p. j. fiat
decoctio, cui adde sem. petro. apij
& cuscutæ sing. 3. ij. capiat in 4. do-
sibus de mane.

℥. Apozematis præscripti 3. iiij.
in quibus infunde rhabarb. opti-
mi 3. j. ss. cinamomi ḡ. viij. facta
leni expressione diss. diaphœni-
ci aut elect. de citro sol. 3. ij. syr.
ros. sol. 3. j. ss. misce, fiat potio.

Triphera persica quamvis my-
robalanorum ratione naturales
partes roboret, quia obstructio-
nes promouet & adauget, non est
propinanda; neque aloë, quando
macilentum est & biliosum cor-
pus

pus cum calida hepatis distemp-
rie, ob eam rem pill. aloën reci-
pientium vsus suspectus habetur,
nisi sit probè lota. Præterea medi-
camina liquidam consistentiam
nacta his quæ duram sortita
sunt, quia promptius & faci-
lius se in corporis partes insinuant,
magis sunt huic morbo consen-
tanea.

℞. Conser. rad. apij, florum
genistæ sing. ʒ. j. conser. capill. &
florum cichorij sing. ʒ. vj. corti-
cis citri sacch. conditi ʒ. iij. pul.
troch. diarhodon ʒ. j. pul. trochif-
corum de rhabarb. ʒ. iij. syru-
pi Byzant. qu. suff. ad incorporan-
dum. fiat opiata, de qua singu-
lis matutinis capiat ad quantita-
tem nucis comestibilis horis dua-
bus ante prandium, bibendo po-
stea cochlearia duo vini albi, aqua
asparagi & rubiæ maioris diluti.
Vel sic.

℞. Conser. eringij & scolopen-
drij siac ceterach sing. ʒ. j. con-
seruæ rorismarini, & florum cicho-

348 *De Tumorib. præter naturam,*
rij sing. 3. vj. hepatis lupi assi &
puluerati ʒ. β. cineris cicadarum
3. ij. pulu. elect. triasantali ʒ. iiij.
pulu. rosatæ nouellæ ʒ. ij. syr. de
duabus radicib. sine aceto qu. suff.
ad incorporandum. fiat opiata,
vtatur vt dictum est. In hepatis
calida distemperie quia præceden-
tia nimium calent, sequentia vsur-
pabis.

℞. Foliorum siclæ, mercuria-
lis, attriplicis, parietariæ sing. M. j.
sem. fœnugræci ʒ. j. sem. anisi, fæ-
niculi sing. 3. j. β. furfuris bene
macri p. j. florum rorismarini, cha-
mom. centaurij minoris sing. p. j.
β. fiat decoctio, & in colatur.
quart. v. diff. succi betæ, mellis ros.
col. sing. ʒ. ij. catholici 3. vj. olei
anethini ʒ. iiij. salis communis pa-
rum. fiat clyster, supponatur an-
te omnia, & tertio quoque die
capiat.

℞. Elect. de succo ros. 3. iiij. ca-
tholici ʒ. β. aquarum capit. ven. &
graminis sing. ʒ. ij. fiat potio, detur
sequenti die.

℞. Sy

℥. Syrupi endiuiae comp. syr.
Byzantini sing. ℥.ij.℔. syr.cap. ℥. j.
aquarum graminis, agrimoniae
& absynthij sing. ℥.iiij. pulu. dia-
rhod. ℥.iiij. misce, fiat zulep.clar.
& ar.capiat in 4. dosibus de mane.

℥. Rhab. optimi in ℥.iiij.aqua
endiuiae & modico vini albi infusi
& expressi ℥.j.℔.spicae nardi eodem
modo praeparatae gr.vj.diaphoenici
℥.ij. agarici in melle rosato colato
infusi & expressi ℥.j. syr.ros. solut.
vel ex infusionib. florum persico-
rum ℥.j.℔. fiat potio.

℞. Conseru.capill.ven. & scolo-
pend.sing.℥.j.conseru.flor. cichorij
℥.x. pulu. triasant.rhabar. duplica-
to ℥.j.℔.pulu.diarhodon.℥.j.rasurae
cornu cerui,& eboris sing. ℥.ij.syr.
de succo endiuiae q. s. fiat opiata,
de qua capiat singulis diebus ad
quantitatem vnus castaneae horis
duabus ante prandium. adde pul-
pa passularum bene ping. & alba-
rum sing.℥.vj.

℞. Olei citoniorum, rosar. sing.
℥.iiij.olei de absynthio ℥.j.℔.coralli
rubri

350 *De Tumorib. præter naturam,*
rubri & mastiches sing. ʒ. j. β. fanta-
li albi & rub. sing. ℥. iij. florum
nymphææ ℥. ij. sem. endiuivæ ʒ. ij. ce-
ræ q. s. fiat vnguentum, vngatur re-
gio hepatis cal. manè & serò, ad-
dendo vñctionis tempore aceti vi-
ni albi parum.

Si calida hepatis intemperies præcedat, & corporis totius tumor appareat, non solum præcedentibus medicamentis extinguenda erit intemperies, sed pituita in venoso genere contenta erit extrahenda, quod sequentium remediorum usu opportunè faciemus.

℞. Rad. iridis recentis, petro. apij,
asparagi sing. ℥. j. fumarie, mercu-
rialis, rostri porcini, agrimonie, be-
tonice, sing. M. j. passularum alba-
rum exacinarum pa. xx. fol. sennæ
℥. iij. glycyrrhiz. recentis cōtusæ ℥. j.
rad. asari ℥. sem. petro, apij sing. ℥.
ij. florum borrag. genistæ & thama-
risci sing. p. j. cicerum nigrorum p.
j. β. fiat deco. cap. de cola. lb. j. β. diss.
syr. ros. solut. ℥. v. syr. capill. ℥. iij.
pulu. diarhod. ℥. ij. fiat syr. clar. &
arom.

Liber III. Cap. XXIX. 351

arom. capiat in quinque dosibus de mane, in vltima dosi infunde rhab. \mathfrak{z} . iiij. spicæ \mathfrak{g} . vj. exprimantur.

\mathcal{Z} . Confect. dialac. diacurcumæ sing. \mathfrak{z} . ij. trochisc. diarhod. \mathfrak{z} . j. β . pulpæ passularum albarum, cōser. capill. eringiorum sing. \mathfrak{z} . j. carnis cuculi resiccatae, cineris intestinorum lupi & gallinarum vino albo generoso lotorum sing. \mathfrak{z} . ij. trochiscorum de capa. & pul. diarhod. sing. \mathfrak{z} . j. β . syr. de v. radicibus q.s. fiat opiata, vtatur vt dictum est, bibat postea cochlearia duo aquarum cichorij & capil. Frequens clysmatum vsus maximè utilis erit, paretur vnus in sequentem modū.

\mathcal{R} . Thymelex & chamelix, brassicæ marinæ sing. M. β . mercurialis, siclae, parietariæ, betonicæ sing. M. j. florum genistæ, centaurij minoris & hyperici sing. p. j. sem. anisi, petro. & apij sing. \mathfrak{z} . ij. fol. sennæ \mathfrak{z} . j. β . medullæ carthami contusæ \mathfrak{z} . vj. fiat decoctio, cape de col. \mathfrak{z} . x. dissol. benedictæ \mathfrak{z} . β . mellis ros. col. \mathfrak{z} . j. β . fiat clyster. Vel sic.

\mathcal{Z} . Cucu

352 *De Tumorib. præter naturam,*
℞. Cucumeris asinini, rad. cicla-
minis & asari recent. sing. ℥. iiij.
contundantur, decoquantur in sero
caprino, vel vrina pueri. expressio-
ne & col. facta cape ℥b. β. in qua
diss. fermenti acris ℥. j. β. fiat cly-
ster. Hæc remedia sunt asciti etiam
congrua.

Vomitus & sudoris prouocatio
anasarcæ necessaria, non tamen id
balneis chalasticis & corpus re-
laxantibus tentandum, sed assiduis
frictionibus aridis manibus factis:
ob hoc nonnulli consulunt vt cor-
pus vniuersum in cal.arena sepelia-
tur, vel soli aprico recto optimè ca-
pite exponatur.


Tertius scopus ad topicorum
præsidiorum vsum nos vocat. Tu-
midas itaque partes frequenter il-
linire sequenti vnguento commo-
dum erit.

℞. Farinæ sem. lini, fabarum
sing. ℥. iiij. sem. althææ, melanthij,
dauci sing. ℥. iiij. sulphuris vini
℥. j. β. euphorbij ℥. j. vnguenti Agrip-
pæ ℥b. j. succi iridis depurati ℥. ij.
axun

Liber III. Cap. XXX. 353

axungiae suillae ℥. iiij. pulu. iridis
florent. ℥. j. β. florum sambu-
ci ℥. β. olei de lilio, keirini sing.
℥. v. ceræ citrinæ q. s. construa-
tur vng. quo ad prunas liquefacto,
in sole, aut ante ignem vngantur
tumentes partes, sibi à frigore
caueat.

℞. Stercoris bubuli resiccari lb.
β. stercoris columbini ℥. ij. farinæ
hordei & lupinorū sing. ℥. iiij. cari-
carum elixarum, & in mortario ma-
ceratarū ℥. ij. sem. staphisagriæ ℥. j. β.
aristol. rotundæ, vtriusque abrota-
ni sing. ℥. j. mastiches ℥. x. sulphuris
℥. ij. axungiae anseris, anatis sing.
℥. iiij. olei rutacei, irini sing. ℥. iiij.
oxymelitis ℥. ij. fiat cataplasma,
ventris regioni applicetur. Iecur
roborantia in omnibus speciebus
semper erunt vsurpanda.



De Ascite.

C A P. XXX.

Ascites hydrops ab *ἀσцитῶν*, hoc
est, vtre nomen fortitus, vtri-
cularius

354 *De Tumorib. præter naturam,*
cularius à Medicis dictus est, quod
motus venter semipleni vtris aut
fluctuantis aquæ sonum edat, tu-
mor est magnus à seroso inter
omentum & peritoneum humore
concluso excitatus, animantem ma-
ximè excrucias, grauissima sympto-
mata, vt paulo inferius demonstra-
bitur, inferens. Curatu, vbi iam al-
tas radices egit, contumacissimus
existit.



De Ascitis causis.

C A P. XXXI.

Huius causæ prægressæ sunt
quæ serosum sanguinem gi-
gnere, & iecoris faculta-
tem plurimum labefactare solent,
vt humidorum fructuum copia,
olerum, piscium, meracioris vini
intempestiuus atque assiduus vsus,
frumentacei & azymi panes, pin-
guia iuscula, offæ pingui caseo sub-
farcinata, humidarum carniū
vsus frequens.

Cor

Corporeæ sunt, intemperies ventriculi frigida, hepatis calida & arida, nonnunquam insignis lienis obstructio, vel scirrhus aut mesaræi durities, mensium, hæmorrhoidum suppressio, aut horum fluxus immoderatus.

Proximæ & continentes causæ sunt, serosi humores in abdominis interna parte coaceruati, sæpe in hepatis superficie hydatodes vescicæ tali humore plenæ apparent, quibus ruptis omentum aqua repletur.

Hepar itaque debile in hoc morbo existens, pro bono atque laudato sanguine aquam citrinam, quæ lotio similis existit, generat, qua renes obruuntur & debiles euadunt, atque suo munere minimè funguntur: nam à tali seroso humore illud non repurgant, & remanet aquosa illa substantia in hepate, quam natura ut vitæ sit melius consultum, expellit ad inanes ventris sedes, fitque hydropis species ascites dicta. Hic enim humor

*Hip.
557.
Aphor.*

356 *De Tumorib. præter naturam,*
mor per cæcos veluti meatus
transfusus , sua tenui substantia
quod inter omentum & perito-
neum est , sensim ita replet & di-
stendit , vt distentis epigastrij mus-
culis , tumor magnus ventrem ob-
sideat prominente nonnunquam
vmbilico , intumescente ab illius
præsentia cole & scroto tali aqua
pleno.

Videntur in tali hydropis spe-
cie superiores corporis partes ema-
ciari: at inferiores tumidiore effi-
ci , perinde ac si quis lienoso affe-
ctu laboraret , in quo saginari lie-
nem experimur , & reliquas par-
tes demacerari ; aiuntque hos su-
perne hæcticos euadere , inferne
verò hydropicos : ætate prouectos
magis quàm pueros ascites ado-
ritur. Ab inclementissima febre
excitatus curationem non ad-
mittit.

Multorum atiorum membrorum
cum hepate consortium habentiũ
affectus hydropem inuehit , quem
profligare non poteris nisi prius
procul

procul pulso illorum affectu causæ rationem habente. Qui ab scirrhuso hepatis tumore iam confirmato emergit, curationem respuit; nam tamdiu affectum perseverare oportet quandiu ipsius causa præsens est & subsistit. Sed Gal. confirmatum hepatis scirrhum neque curavit, neque alium qui curaverit unquam vidit. Ergo ab eo suscitatus hydrops ope medica depelli non potest.

*2 ad
Glauc.*

Et quamvis hæc calamitas omni ætati sit communis, in hanc, vel illam speciem alia aliis est pronior, pueri in leucophlegmatiam, iuvenes verò ad ætatem usque constantem in asciten sunt propensiores. Omnibus autem generibus senes sunt expositi, ob natiui caloris inopiam, cum frigida sit senectus: Sed ad humoris copiam contrahendam apti non sunt, tympaniæ igitur magis sunt idonei. Mitior est leucophlegmatias, Aretæo scribente, quod multas & prosperas tollendi occasiones habeat. Suae senten

358 *De Tumorib. præter naturam,*
sententiæ suffragantem habet Aui-
cennam : sed Aërium , vt suo lo-
co demonstrabitur, refractarium.

Ascitis indicia sunt , perspicuus
ventris tumor , agitatus in alteru-
trum latus venter , strepitum com-
moti vtrius semipleni repræsentans,
corporis partium , præsertim su-
periorum macies & colliquatio,
ægra à tumore pressa diaphragma-
te respiratio, vrinæ paucæ, crassæ &
rubræ, præsertim si mali fons à so-
lo iecore originem trahat. Sitis
multò maior quàm in aliis specie-
bus , inanis tussis , & quæ ingra-
uescente morbo pulmonum aspe-
ram arteriam occupat. Pulsus parui
& frequentes , febricula non ad-
modum hecticæ dissimilis. Aquo-
sus hydrops à flatus præsetia haud
immunis, minoris caloris ascite est
particeps. Tanta est inter hos affe-
ctus causæ concordia , vt rarò al-
tera sine alterius præsentia subsi-
stat, & vnius in alterum transitus
sit facilis.

De



De Ascitis curatione.

C A P. XXXII.

Victus rationem parum calid. & resiccantem instituemus, nisi à distemperie ca. aut acuta febre illius sit origo, in memoriam quæ capite 28. à nobis de victus ratione sunt tradita, reuocantes. In hac specie potui magis quàm in reliquis interdicens, ne adaucto seroso humore ægrotantem morbus magis defatiget. Vidi ego vnum atque alterum à potu omnino sibi temperantem, ab aquoso hydropè planè vindicatum. Qui à potu abstinere nequeunt, non vltra dandus est quàm qui vitam sustineat, & molestam sitim leniat. Dandum vinum album, tenue, aqua dilutum, in qua prius vrinam prouocantia deferbuerint. Exercendum ante cibum

360 *De Tumorib. prater naturam,*
cibum corpus, quod si ob corporis, aut pedum pondus & tumorem incedere nequeat, equo aut lectica vehatur, tum ut serofus succus digeratur, tum ut sopitus ac languens calor excite-
tur.

Et antequam ad morbi huius causæ abscissionem accedamus, contemplandum non oscitanter erit, an fiat laborante primogenia affectione hepate, ut distemperatura cal. an frigida, quæ suo contrario expugnanda erit: an ab obstructione, quæ anatomicis præ-
sidiis erit auferenda. Quod si consortij lege excitetur, causæ primum erit consulendum. Et cum aquosus humor morbum parit & augeat, hic primo loco auferendus est. Post cuius ablationem, hepatis imbecillitati erit prospiciendum, & symptomatis occurrendum.

Communis omnium curatio, hydragogis aquas aut pituitâ educētibus, diureticis & externis remediis,
humo

humorem siccantibus & digerentibus, perficitur. In ca. itaque distemperie sequentibus vtendum erit.

℥. Cathol. ʒ. vj. diaphœen. vel elect. de citro sol. ʒ. ij. aquarum cichorij, graminis sing. ʒ. ij. fiat potio; detur ante omnia. Vel sic.

℥. Passularum exacinatarum nu. xx. sem. anisi, fœniculi sing. ʒ. j. β. glycirrh. recentis & rasæ ʒ. j. folliculorum sennæ ʒ. β. florum bugloss. p. j. fiat decoct. in iure galli veteris, facta expressione & colatura ad ʒ. iiij. diss. syr. ros. sol. ʒ. ij. misce, fiat potio.

℥. Syr. endiuia comp. syr. cap. ven. sing. ʒ. iiij. aquarum graminis, cichorij & asparagi sing. ʒ. iiij. fiat zulapium clar. capiat in 4. dosibus de mane. capiat postea tabellam vnā elect. diarhod. Vel sic.

℥. Rad. grami. rusci, asparagi in vino albo aqua graminis diluto tempera. sing. ʒ. j. glycirrhi. recentis ʒ. x. vtriusque cichorij cum radicibus, vtriusque bugl. herb.

℞ capil

362 *De Tumorib. præter naturam,*
 capil. com. agrimonix, pimpinellæ,
 pilosellæ, soldanellæ, fumariæ sing.
 M. j. sem. anisi, fœniculi, petro. apij,
 cuscute sing. 3. j. sem. melonum,
 cucur. contusi sing. 3. iiij. florum
 genistæ, buglos. cicerum rub. sing.
 p. j. fiat decoct. & in colaturæ lb. j.
 diss. syr. Byzantini, end. comp. &
 capill. sing. 3. ij. pul. triasantali 3.
 iiij. fiat apozema cla. & aro. capiat
 in 4. dosibus de mane. Tertio quo-
 que die supponatur clystma se-
 quens.

℥. Muralij, siclæ, mercurialis, pe-
 dis columbini, ebulorum cum ra-
 dicibus, centaurij minoris sing. M. j.
 à nonnullis herbis, quales sunt
 malua, althea, viol. lactuca, quia
 nimio sunt humore perfusæ, absti-
 nere oportet. sem. anisi, carui, fœ-
 niculi sing. 3. ij. flor. bugl. rorismar.
 & chamom. sing. p. j. fiat decoct. &
 in col. lb. j. diss. succi mercurialis,
 mellis rosati col. sacch. rub. sing.
 3. ij. Olea, quia largo humore sca-
 tent, & intestina nimium hume-
 ctant, non sunt vsurpanda, his
 demptis

Liber III. Cap. XXXII. 363

demptis adde quæ digerentē facultatem habent. falis co. 3.j. vitellos ouorū recentes num. ij. fiat clyster. vtatur vt dictum est, quo supposito sequentem medicatam potionem postridie exhibebimus.

℞. Rhabar. in 3.iiij. feri caprini cum ʒ.vj. spicæ nardi infusi 3.j. β. agarici eadem arte præparati 3.j. facta expressione dissol. elect. diacarth. 3.ij. syr. rosat. solutiui 3.j. β. misce, fiat potio. Medicatæ potiones cum ob liquidam substantiam ocyùs permeent, & corpus minus calfaciant, catapotiis sunt præferendæ.

℞. Conser. capil. rad. apij sing. 3.j. conser. scolop. & florum cichorij sing. 3. vj. corticis citri sacch. conditi 3.iiij. pul. diarhod. ʒ. iiij. pul. triasant. 3.j. sem. endiuia, melonum mundati & contusi sing. 3.j. β. syr. de v. radicib. q. s. fiat opiata, de qua capiat ad quantitatem vnus castaneæ, horis duabus ante prandium.

℞. Santali albi & rubri sing. 3.ij.

Q 2 rosa

364 *De Tumorib. præter naturam,*
rosarum rub. 3. j. fol. & baccarum
myrti sing. 3. ij. trochiscorum de
caphura 3. ʒ. sem. endiuia petro.
apij & anethi sing. 3. iiij. spica nar-
di, ichcænati sing. 3. j. olei viol. 3. iiij.
olei de absynthio 3. ij. ceræ albæ
q. s. fiat vnguentum, vngatur bis
vel ter in hebdomade hepatis re-
gio ca. addendo aceti vini albi pa-
rum vnctionis tempore.

Afciti à causa frigida excitato
sequentibus auxiliis medeberis.
Supponatur in primis præscriptus
clyster, dissoluendo vrinae pueri
3. ij. deinde

℞. Elect. de psyllo 3. ij. Cathol.
3. ʒ. syr. ros. solut. 3. j. ʒ. aquarum
capil. & graminis sing. 3. ij. fiat po-
tio, quæ detur cum custodia, vt ars
præcipit.

℞. Rad. v. diuret. co. in oxymel.
simp. maceratarum sing. 3. j. corti-
cis citri sicci 3. ʒ. rad. asari 3. iiij. cor-
ticis medij sambuci 3. v. rad. cappa.
corticis mediani fraxini, thamarif-
cis sing. 3. vj. glycirrh. recent. 3. j.
foldanellæ, vtriusque cichorij, agri-
monia,

monia, saxifrag. sing. M. j. summitatum absynthij pontici, mercurialis sing. M. j. s. sem. petro. apij, cuscuta, anisi, fœnic. fœseli Massiliensis sing. ʒ. ij. sem. asparagi ʒ. iiij. caricarum pinguium nu. xx. folliculorū sennæ orientalis, medullæ carthami contusæ sing. ʒ. ij. agarici in ligatura positi ʒ. s. florum thamariscis, genistæ, cicerum nigrorum sing. p. ij. fiat decoct. & in col. lb. j. s. diss. succi ireos optimè depurati ʒ. j. sacch. albissimi q. s. fiat apozema clar. & arom. cum pulu. troch. de cappar. & diarho. sing. ʒ. ij. Capiat in v. dosibus de mane. Si ægroti vires sint validæ, decocto misceri poterit thymeleæ in aceto per horas xij. maceratæ M. s.

℥. Rhab. opt. ʒ. j. s. spicæ nardi ʒ. viij. infundantur in ʒ. iiij. apozematis præscripti, expressione facta diss. elect. indi maio. ʒ. ij. syrupi ros. solut. ʒ. j. s. Misce, fiat potio.

℥. Conferuæ florum genistæ, rad. apij sing. ʒ. j. confer. capil. & scolop. sing. ʒ. vj. conferuæ florum

366 *De Tumorib. præter naturam,*
cichorij ʒ. β. confect. dialaccæ &
diacurcumæ sing. ʒ. ij. pulu. diarh.
ʒ. ij. troch. de rhabarb. & de eu-
pa. sing. ʒ. j. syr. Byzantini q. s. ad in-
corporandum, fiat in modum opia-
tæ, de qua singulis matutinis horis
duabus ante prandium capiet ad
quantitatem vnius castanæ, biben-
do postea cochlearia duo vini albi
aut gilui, aqua absynthij & aspara-
gi diluti. Adde hepatis lupi secun-
dum artem præparati ʒ. iij. carnis
erinacei terrestris reficcatae ʒ. ij.

Non desunt qui pillulas de Me-
sereo plurimum commendent: qua-
rum vsum ob huius medicamenti
vehementissimam & internas par-
tes lædentem vim, suspectum ha-
beo, ex quibus nullos leuatos, sed
plures interiisse vidi.

Probatum plurimum à Rhafi
Mauritano exercitato in artis ope-
ribus medico, Syrupus acidus sim-
plex ad sitis extinctionem, cum
aqua cassutæ. Serum lactis in quo
macerata sit absynthij coma, fuma-
ria, halicacabi grana, schœnantum
& spi

& spica, confert. Vrinæ etiam
cientia sunt ex usu, vt turiones
asparagorum regionum, radix gra-
minis erigeri, & betonicae folia.
Ventriculi regioni admoendum erit
prædictum quod ex sequentibus
constituitur.

℞. Vnguenti Aragon. ℔. β. succi
ciclamini, succi pedis columbini, &
vrinæ pueri sing. ℥. j. β. succi apij &
petro. sing. ℥. ij. sem. rutæ, seseli Mas-
siliensis, & cumini sing. ℥. iij. fari-
næ lupinorum ℥. β. terebinthinæ,
& ceræ citrinæ sing. ℥. ij. olei ruta-
cei ℥. iiij. fiat vng. vngantur par-
tes ventris inferioris. Adde pene-
trationis velocioris causa vini albi
parum.

Aliud.

℞. Vnguenti de Arthanita ℔. j.
β. olei irini ℥. iiij. misce.

Aliud.

℞. Stercoris capræ, vaccæ sing.
℔. β. sulphuris apyri ℥. ij. seminis
cumini ℥. j. florum sambuci p. j. suc-
ci thymelæ ℥. ij. β. cochlearum
tritarum ℥. v. vini albi & vrinæ

Q 4 pueri

368 *De Tumorib. præter naturam,*
pueri sing. q. s. donec ad catapla-
maris consistentiam reducantur,
admoveatur ventris regioni. A
multis laudatur emplastrum de
baccis lauri. Si horum remedium
usu affectus ipse non conquiescat,
prolato de futura morte pro-
gnostico, aggredienda erit ea cura-
tio, quam per paracentesim, id est,
pertusionem fieri scripsit Aëtius,
quæ curationis ratio mihi parum
tuta semper visa est, affecto præser-
tim hepate. Nam quæso, quid pro-
derit huius serosi recrementi eua-
cuatio, si imbecillum iecur novum
humorem quotidie gignat, quo re-
pleri non desinat venter? Insuper
cur Aëtius talem sectionem com-
mendans, locum qui diuidi debet
non docuit?

Quod si quispiam respondeat,
locum tanquam rem per se notam
fuisse ab Aëtio prætermisum. Mul-
ti hoc remedij genus probantes, di-
cunt nouacula secandam esse ven-
tris sinistram partem ad omenti re-
gionem usque, si hydrops præcipuo
hepa

hepatis vitio fiat, vt versus sinistram ventris partem tracta epigastrij pars euacuato per canulam humore dimissa, & in suam sedem reuersa inflictum vulnus obturet, ne euacuata confertim aqua vires omnino deiiciantur. Si splen huic malo ansam præbuerit, secundam dexteram partem statuunt.

Sed quonam pacto hoc fieri possit nõ satis intelligo. Quomodo distento maximè ventre, illius pars manibus ita poterit apprehendi, vt rursus in factum vulnus recurrat, ipsumque obturet, quod hians potius tibi apparebit & serosum recrementum semper euomens? non secus quàm si locum tensus aliqua ex parte seces, sectas partes à se magis distare experietis.

Aliqui acuto ferro eam umbilici à seroso humore extuberantis partē, in qua linea alba sita est, vsque ad internum abdominis spatium pungunt: sensim serosum recrementum (vires prius consulentes) euacuant, linea tandem turun-

370 *De Tumorib. præter naturam,*
da vulnus claudunt, ne euacuatio-
ne larga vires conuellantur, vt mi-
hi à quodam nobili Auerno vocato
in oppido Sancti Flori contigit. Is
cùm integrum sesquiannum ascite
ab hepatis scirrho profecto labo-
rasset, & multos, eosdémque do-
ctos Medicos in consilium vocas-
set, quorum consilio & remediis
pertinax morbus expugnari non
potuerat, accersiri familiarem &
præstanti doctrina Medicum me-
cum iussit, vt nostrùm vnusquisque
adipiscendæ salutis auido homini
auxiliares manus porrigeret. No-
stram operam illi (quæ consentanea
erant) petenti denegare non potui-
mus. Vltimum remedium, declara-
to priùs castæ vxori, & parentibus
eo in quo hominem videbamus
versari periculo, aggressi sumus.
Quippè quod, iuxta Celsi senten-
tiam, melius sit anceps experiri
præsidium quàm nullum. Iam priùs
recensitæ parti à nobis monitus
Chirurgus acutum ferrum adegit.
Sectionem sequuta est serosi & lo-
rio

tio similis humoris ampla euacuatio, quæ pluribus vicibus repetita, ventris tumorem imminuit cum magis libera respiratione. Sed defatiscientibus tandem viribus, vitam cum morte commutauit.


Vidimus & nos in pago Maugeil vocato ab hac vrbe duobus milliaribus distante, iuuenem rusticam xxij. annos natam ascite laborantem, cui post multorum ex arte præscriptorum medicamentorum vsum, ita prominuit humore plenus vmbilicus, vt eo suppurato & sponte aperto abscessu, ac euacuata quæ ventrem replebat materia, pristinæ saluti fuerit restituta: quod illius hepar nondum insignem contraxisset noxam. Multi totam ventris cutem ad muscutorum aponeuroses scarificant scissuris paruis, vt per ventrem serum resudet. Alij reuulsionis & euacuationis ergo pyroticum medicamentum pedum furis admovent, vt decisa eschara butyro,

372. *De Tumorib. pater naturam,*
aut putrefaciente aliquo medica-
mento vulnus hians serosum re-
crementum euomat, & sensim eua-
cuatione facta ventris tumor mi-
nuatur.

Hanc hydropis speciem aliis fa-
ciliùs, & tympaniam ægriùs cu-
rari testati sunt Aëtius & Auer-
rhoës. Classici practici tympa-
niam, & hyposarcam faciliùs ascite
profligari multis rationibus
contendunt. Magna ex parte fit
ascites laborante per idiopathiam
hèpate. Sed morbi per idiopa-
thiam facti, difficiliùs his qui per
sympathiam sunt, profligantur.
Insuper ad serosi succi genera-
tionem maior concurrit frigidi-
tas quàm flatus, vel pituitæ. Præ-
terea seroso humore flatus faci-
liùs discutitur. In hyposarca pi-
tuitosus humor in habitum cor-
poris transsumptus, eo qui certa
corporis partè est conclusus, fa-
cilius multò euacuatur. Ergo hy-
posarca curationi ascite magis
paret.

- Adde


Adde quod causa continens ascitis corpus magis grauat quam tympanitis, aut hypofarcæ. Vomitus prouocatio in ascite, & hypofarca est salubris. Omnes hydropes inueterati, & qui habitum corporis corruperunt, sunt admodum periculosi.



De ventoso Hydrope.

C A P. XXXIII.

Tympanias à copioso flatu, & paucò seroso humore scaturiens, ubi perseverat in ascitem degenerans, tumor est ventris insignis, percussus tympani sonum repræsentans.




De Tympania causis & indicis.

C A P. XXXIV.

Huius causæ sunt edulia, quæ cruda, aut cocta (vt Galeno placet) flatus gignunt, quæ
fr

374 *De Tumorib. præter naturam,*
 si valens sit calor discutit, atque
 digerit ructibus, aut per anum cum
 crepitu excernit. Quod si in colo
 intestino colliguntur, colicam ex-
 citant: si in ventris spatio, tympa-
 niam. Sæpe alimenta flatulenta
 non sunt, sed laudatam substan-
 tiam habent. Sed quia iecoris ca-
 lor imbecillus est, totum ferè chy-
 lum in vaporem conuertit. Vt
 enim nimia frigiditas (quod in
 externis apparet, vt capite de œde-
 mate flatulento fuit demonstra-
 tum) nihil resoluit: ita neque im-
 moderatus calor halitus gignere
 potest; quia partes in quibus est
 collectus, infrigidantur, & infrigi-
 datæ flatus seruant, & optimè
 continent.



De Tympania curatione.

C A P. XXXV.

Victus ratio talis esse debet,
 qualis Asciti est præscripta.
 Remedia eadem sunt con-
 grua

grua, nisi quod flatus magis discutere debent, & cum ferè ventriculi vitio accídat, is roborandus erit remediis ad id dicatis. Si huius morbi causa sit ea: moderatè frigidis, si frigida ca. vtendum erit. Qui à maximè ca.intemperie natium hepatis calorem resolvente scaturit, medicaminibus non cedit, sed his est superior. Priùs itaque supponendus erit sequens clyster.

℥. Foliorum saluiæ, sampsuchi, betonicæ, melissæ siccorum sing. M. j. sem. anisi, carui, fileris montani & cumini sing. ℥. β. sem. fænugræci ℥. j. caricarum pinguium num. xx. florum stœchad, rorismarini, centaurij minoris, sambuci, chamom. sing. p. j. fiat decoctio. cape de col. lb. i. diss. benedictæ ℥. β. indi maioris ℥. iij. olei rutacei ℥. iij. mellis rorismarini, succi pedis columbini sing. ℥. j. β. salis co. parum. fiat clyster, supponatur. Parabitur procedēte morbo clyster ex oleo nuctum, rutaceo, & vino maluatico.

℥. Glycirrhiz. recentis & rasæ
℥. j.

376 *De Tumorib. præter naturam,*
℥. j. foliorum menthæ, sampſuchi
ſiccorum ſing. ℥. j. β. ſem. aniſi, fæni-
culi & cumini ſing. ℥. j. calami odo-
rati ℥. ij. corticis citri ſicci ℥. β. flo-
rum ſtœchados, roriſmar. ſing. p. j.
fiat decoct. & in col. ℥. j. β. diſſ.
ſyr. de mentha, mell. roſ. col. ſing.
℥. iij. ſacch. albiffimi ℥. ij. pul. arom.
roſ. d. gab. & diagalangæ ſing. ℥. ij.
fiat apozema cla. & arom. capiat
in quatuor doſibus de mane. Vel
ſic.

℞. Syr. de ſtœchad. mell. roſ. col.
ſing. ℥. ij. β. ſyr. de abſynth. ℥. j. aqua-
rum maioranæ, meliſſæ & arthe-
miſiæ ſing. ℥. iij. pul. cinamomi in-
terioris & electi ℥. iij. fiat zula-
pium clar. & arom. capiat in qua-
tuor matutinis.

℞. Diaphœnici ℥. iij. aquarum
menthæ & abſynthij ſing. ℥. ij. ſyr.
roſ. ſolut. ℥. j. fiat potio. Vel ſic.

℞. Agarici recenter trochiſcati,
& maſſæ pill. de benediſta ſing.
℥. ij. malaxentur cum ſyrupo de
mentha. fiant pillulæ 7. quas deglu-
tiet hora tertia matutina. Vel ſic.

℞. Elect.

℞. Elect. de cirro solut. ℥. β. capiat prima luce. Pillulæ ante pastū in sequentem modū institui debēt.

℞. Massæ pill. de aromatis, vel de hiera simp. ℥. j. β. aloë lota cum aqua endiuia in ca. distemperie, in frigi. cum aqua absynthij. fiant pillulę vj. capiat duas bis in hebdomade per sesquihorā ante cœnam.

℞. Confect. arom. ros. maior. ℥. iij. capiet singulis matutinis ad quantitatem vnius nucis comestibilis duabus horis ante prandium. Vel sic.

℞. Pul. ros. nouellæ ℥. iij. pulu. diagalangæ & aromatici ros. def. gabr. sing. ℥. j. pulu. elect. diacumini ℥. ij. confer. florum rorismar. ℥. j. zingiberis viridis saccharo conditi ℥. iij. cort. citri sacch. etiam cōditi ℥. β. conferuæ florum stœchad. saluia sing. ℥. vj. confer. florum cichorij & rad. bugloss. sing. ℥. j. syr. de cortice citri q. s. ad concorporandum. fiat opiata.

℞. Anisi, fœniculi sing. ℥. j. β. sem. cumini ℥. β. panis siliginei assi, & in

378 *De Tumorib. præter naturam,*
in tenuissimum pollinem redacti
℥.j. intestinorum gallinarum ex ar-
te præparatorum, & internarum
tunicarum ventrium earundem vi-
no generoso lotarum sing. 3. ij.
(Galenus cap. de ventriculo mer-
gi, harum tunicarum administra-
tionem tanquam inutile medica-
mentū dānat. Sed quare non video.
Nam si gallinarum intestina & lupi
hepar cōferre astruat: quare eæ tu-
nicæ erunt inutiles? Experientia
insuper rerum magistra has ventri-
culo addere robur ostendit. A no-
bis igitur iure optimo, & citra erra-
tum aliquod, & aliquam ægri no-
xam, administrari poterunt.) Cina-
momi & pulu. diagalangæ sing. 3.
iiij. sacch. albissimi ad pondus om-
nium. fiat pulvis, capiat duo co-
chlearia post suos pastus, absti-
nendo longo tempore à cibo &
potu.

℞. Anisi, fæniculi, & carui sim-
plici coopertura sacch. intestorum
sing. 3. ij. elect. rosatæ nouellæ fru-
statim incisi 3. j. cinamomi in te-
nues

nues fibras dissecti ʒ.ij. misce, fiat drageta, capiat duo cochlearia post suos pastus.

Exteriùs applicanda erunt quæ ventriculum roborant, & ventris flatus discutiunt, in sequentem modum parata.

℥. Cerati Gal. vitia ventriculi corrigentis ʒ.iiij. olei de mentha ʒ. ij. β. misce, vngatur regio ventriculi. addere possumus olei de nuce moschata ʒ.j. Vel sic.


℞. Foliorum menthæ siccorum ʒ. ij. nucis moschatæ, cariophyllorum & macis sing. ʒ. j. β. mastiches, ladani puri & styracis, cala. sing. ʒ. iiij. olei de absynthio, de thimo sing. ʒ. iiij. ceræ q. s. fiat vnguentum. Ex his addita ceræ vberiori copia, potest parari pro conformando emplastro magdaleon. Vel paretur sacculus sic.

℞. Foliorum balsamitæ, melissæ, menthæ, & sampsuchi siccorum sing. ʒ.iiij. ros. rub. ʒ. ij. nucis moschatæ, cariophyllorum sing. ʒ. j. β. galan

380 *De Tumorib. præter naturam,*
galangæ minutæ ʒ. j. granorum
tinctorum ʒ. β. moschi (pro diuiti-
bus) ʒ. j. florum chamom. stœch.
sing. ʒ. iiij. pul. & in sindone rubra
vel panno lineo tenui fiat sacculus
interpunctus ad formam v. regioni
ventriculi applicetur.

℞. Oleorum de absynthio, nar-
dini, rutacei sing. ʒ. iiij. vngatur vé-
tris inferioris regio. Sacellationes
ex milio, furfure, sale torrefactis
& vino generoso conspersæ pro-
bantur plurimum, quibus semina
carminatiua sic à præcticis vocata
miscenda erunt. Vel sic.

℞. Massæ emplastri ceronei ʒ. iiij.
sulphuris ʒ. j. β. succi ebuli & ireos
sing. ʒ. j. malaxentur cum pauca te-
rebinthina, fiat magdaleon, forme-
tur emplastrum magnitudinis re-
quisitæ. Cucurbitulæ leues toti
ventri crebrò sunt affigendæ. Bal-
nea medicamentosa, nitrosa, sul-
phurea, corporis habitum resic-
cantia.



De Ramicibus.

C A P. XXXVI.

Hernia ab hærendo pertinaciter (vt aliquibus placet) dicta à Græcis κήλη, & à Latinis Ramex vocata, tumor est obscœnas aut illi propinquas partes occupans, quæ varia loci & materiæ ex qua scaturit ratione, varia est sortita nomina.



De Hernia causis.

C A P. XXXVII.

RAmicis causæ procatarticæ sunt, immoderatus labor, frequens coitus, contentiosa & assidua vociferatio, exsufflatio, immoderata repletio, & quæ corpus humectant, aut aquoso humore scrotum replent. Quibus addere possumus continuam & laboriosam tussim, vel oneris magni eleuationem.

Corpo

382 *De Tumorib. præter naturam,*

Corporeæ sunt, intestinum in viris & mulieribus in inguen lapsū, *βασανικήλη* Græcis dicitur, vel in scrotum solum, quæ ramicis species hominibus est propria, *ἐντεροκήλη*, si omentum decidat, *ἐπιπλοκήλη*, si serosus humor, *ὕδροκήλη*, si testes tegentibus membranis nascatur cæco, *σαρκοκήλη*, si cum omento decidat cæcum intestinum, compositum nomen adipiscitur. Hinc fit ut *ἐντεροκήλη* dextram scroti partem potius molestet quàm sinistram. Si flatus in scroto coaceruatus illud distendat, *πνευμάλοκήλη* vocatur, qui cum hydropse interdum, nonnunquam sine illo hominem impetit. Tumor collum obsidens, à gelidæ potu eliquatis niuib. contractus *βρογχοκήλη*, siue hernia gutturalis vocatur. Laxata umbilici ligatura, *ὀμφαλοκήλη*. Exaltatis & turgidis venis testes alentibus ad varicum instar glomeratis, *κηροκήλη*, id est, varicosus ramex excitatur. Fit bubonocèle, enterocèle & epiplocele, quando dilatato aut rupto peritoneo,

neo, in inguen aut scrotum, omentum solum, aut intestinum, aut vtrumque delabitur. Ydrocele, quando aqua inter mēbranas erythroïdem & darton, testes vestientes colligitur. Sarcocèle, cū intra testium tunicas increfcit. Cirsocele, quando testium venæ sanguine crasso replentur. Carnosus ramex semper ex corporea & abdita causa, & non externa nascitur. Præsertim quando fluxio in testiculum fertur cum illius incremento.



De Ramicis indicis.

C A P. X X X V I I I.

RAmex scroti & inguinum est doloris expers conspicuus in scroto & inguine tumor, qui compressus recurrit, at lentè, rursus celeriter redit, & decumbente homine manibus ad internas partes ita protruditur, vt mali expertem illum iudicemus. Recto existente rursus recidit, vt
perspi

384 *De Tumorib præter naturam,*
perspicuus tumor appareat. Com-
pressum intestinum sonum borbo-
rigmi similem emittit, pressum
omentum nullum prorsus, neque
resupino homine recurrit.

Reliquarum herniarum notæ
ex propriis causis sunt perspicuæ.
Non desunt qui inter relaxationem
& rupturam latum constituent dis-
crimen. Si quispiam recto corpore
ad inferiores partes anhelitum pro-
trudat, & mox intestinum delabi
percipiat, ruptura, si non protinus
descendat, relaxatione distorque-
tur. Si maximè tussiente ægroto,
statim in scroto tumor appareat,
ruptus est. Peritonei ruptura sen-
sim adaucta tumoris incrementi
est causa. Relaxatio fit foramine
dilatato, per quod vasa & crema-
steres ad testes descendunt.

Ruptura circa initia in pueris
præsertim (quorum substantia mol-
lis & humida est, ut maris alga) fa-
cilè curatur. Sed quæ iam altas ra-
dices egit, & siccum corpus deti-
net, nunquam.

Omnium

Omniū ramicum periculosis-
simus est enteroceles, præcipue
quando in scrotum deuolutum
monoculum intestinum duris fæ-
cibus plenum existit: tunc cum ex-
cerni non possint, has vomitu (vt
in ileo) reiici oportet. Atque in præ-
dicto intestino oborta inflamma-
tione gangrænam gignente, mortis
imminet periculū, vt à me in mul-
tis est obseruatum: clysmatum inie-
ctione augetur. Carnosus ramex
medicamenta spernit, tametsi mi-
nus sit molestus epiplocele, cura-
ri minimè potest, vt diximus.



De Ramicum curatione.

C A P. X X X I X.

AB humidis corpusque la-
xantibus balneis erit absti-
nendum, fructibus humi-
dis, herbis crudis, leguminibus, fa-
bis præsertim, potu largo, immo-
derata repletionem, labore, venere
crebra; tibicinum, & illorum qui
R magnis

386 *De Tumorib. præter naturam,*
magnis exsufflationibus modulan-
tur, opus negligendum, fugienda
omnia quæ serosos humores & fla-
tus gignere sunt apta. *Mollibus
clysmatis laxanda alius (si fuerit
adstricta) catharticæ medicamē-
to adstrictionis vestigia relinquēte.
Quapropter damnatur Ægyptiacæ
siliquæ medulla, acetosus dactylus,
diaprunum simplex aut solutium.
Commédatur catholicon, triphera
persica myrabolanos recipiens, &
rhæum quod adstrictionis sit parti-
ceps. Clysmatum frequens vsus su-
spectus habetur, balanorum tutior.
Flatus dissipantia, ventriculum &
intestina roborantia, post factam
euacuationem sunt ex vsu, quæ cap.
de Ascitis curatione sunt à nobis
tradita.

Et quod ad præsidiorum vsum
attinet, manibus nostris eleua-
tis cruribus intestinum prominens
in suam sedem propellemus, par-
tem tumore tentatam, si id facile
præstare nequeamus, hanc sequen-
ti remedio fouebimus.

℥.Mal

℞. Maluarum, viol. branch. vrsinæ, maluaufci cum rad. sing. M. j. sem. lini fænugræci, althææ sing. ʒ. j. summitatum absynthij nu. vj. florum chamom. meliloti, sambuci sing. p. j. fiat decoctio in duabus partibus aquæ & vna vini rubri, foveatur pars affecta tepidè. Vbi in suam sedem quod decidit, reductum erit, præsidiorum sequentium vsus non erit contemnendus.

℞. Vtriusque consolidæ, hippuris, summitatū myrti, lentisci, rubi, herniariæ sing. M. j. baccarum & foliorū myrti ros. rub. sing. ʒ. β. florum chamom. sambuci sing. p. j. β. fiat decoct. in duabus partibus aque fabrorum & vna aceti dissol. aluminis ʒ. ij. foveatur spongia noua, vel filtro pars affecta. Vel sic.

℞. Rad. bistoræ, symphiti sing. ʒ. ij. nucum cupressi, copularū glandium, gallarū viridium an. pa. xxx. summitatum cupressi, pentaphyli, polygonij, bursæ pastoris sing. M. j. β. cumini, nasturtij torrefacti, plan-

R 2 tag.

388 *De Tumorib. præter naturam,*
tag. sing. \mathfrak{z} .j. florum ros. rubrarum
 \mathfrak{z} .iij. fiat decoctio in aqua plantag.
& pluuiæ. fiat fons calidus, cuius
calorem vix ferre possit ægrotus.
Adde salis fossitij \mathfrak{z} . ij. admoueatur
deinde emplastrum sequens.

\mathcal{R} . Mastæ emplastri pro matrice
& contra rupturam sing. \mathfrak{z} .iij. rad.
narcissi & bistortæ sing. \mathfrak{z} .j. boli
armeniæ, farinæ volatilis molen-
dini, corticis thuris sing. \mathfrak{z} .ß. blattæ
byzantiæ & sarcocollæ sing. \mathfrak{z} .x.
malaxentur manibus inunctis oleo
citoniorum. fiat magdaleon, de quo
conformetur emplastrum ad for-
mam ∇ . addendo parum terebin-
thinæ, vt melius hæreat. Vel sic.

\mathcal{R} . Mass. emplast. de mastiche \mathfrak{z} .
iiij. ichtyocollæ \mathfrak{z} .j. ß. lithargyri \mathfrak{z} .
vj. pulueris magnetis \mathfrak{z} .ß. malaxen-
tur manibus inunctis oleo myrti-
no. fiat magdaleon, vtere vt dictū.

\mathcal{R} . Confer. ros. antiquæ, consoli-
dæ maioris sing. \mathfrak{z} .j. myrobalanorū
emblicarum aqua plantag. lotarum
num. vnam, corticis citri sacch. con-
diti \mathfrak{z} .iij. corall. rub. vsti, & aqua
rosa

rosarum loti, & rasuræ eboris sing.
3.ij. iacæ albæ 3.iiij. cum syr. de ros.
rub. siccis. fiat opiata, de qua singu-
lis natutinis capiet ad quantitatem
vnius nucis comestibilis duabus
horis ante prandium, bibat postea
cochlearia duo vini rubri astrin-
gentis aqua calybeata diluti. Adde
limaturæ calybis 3. iiij. Emplastro
admoto & foru facto, arcta ligatu-
ra erit vincienda pars, vt iam in
suum naturalem locum reductum
intestinum non amplius decidat.
Hanc autem ligaturam brachale
vulgus appellat.

Laborantem oportet in lecto nõ
admodum molli quadraginta die-
rũ spatio decumbere, vt laxata, aut
soluta continuitate laborans pars
astringatur, aut coagmentum reci-
piat. Hoc verò fiat oportet sine cla-
moribus corporeisque motibus.

Ab hoc incommodo facilius pue-
ri (vt superius fuit traditum) vin-
dicantur adultis. Aquosus ramex
ὁδ' ῥοκήλη vocatus, calefaciente & re-
siccante prius victus ratione insti-

R 3 tuta,

390 *De Tumorib. præter naturam,*
tuta, sequenribus præsidiiis cura-
tur, præsertim si morbus sit, &
non ascitis symptoma. Nam tunc
frustra topica remedia adhibentur,
spreto morbo. Euacuandus itaque
primo loco erit serosus humor da-
to hydragogo medicamento, cuius
superius facta est mentio.

℞. cineris fagi, ilicis & truncorum
caulium sing. ℔. ij. cum debita aquæ
quantitate fiat lixiuium, de quo
cape ℔. vj. in his decoque seminis
anisi, cumini, petroselini sing. ℥. ij.
florū stœchados, rorismar. centaurij
minoris sing. p. j. aluminis ℥. j. β. fo-
ueatur sponsia noua affectus locus
crebrò, adimoueatur deinde sequens
cataplasma.


℥. Fatinæ fabarum ℥. iiij. sterco-
ris capræ ℥. iiij. limacum cum suis
testis contusorum ℥. v. sulphuris
ignem non experti, myrrhæ sing. ℥.
j. β. syrei vel sapæ, aut lotij iuuenis
biliosi q. s. ad excipiendum. fiat ca-
taplasma. Plerique scroto ad vesi-
cas excitandas, & serosi succi eua-
cationem medicamentum ex can-
thari

tharidibus & acri fermento confectum apponunt.

Ventosæ herniæ sequentibus remediis prospicimus, quamvis præcedentia conferant.

℥. Sefeli massiliensis, sem. cumini, dauci, rutæ, petro. apij sing. ℥. ij. stercoris vaccæ ℥. iiij. florum meliloti, sambuci, chamom. & stœchad. sing. p. j. mellis q. s. ad cataplasmatibus consistentiam reducantur.

Varicosæ, carnosæ herniæ & rupturæ, quia ægrè & sine periculo non curantur, remedia sunt à Guidone Cauliacensi petenda, docente rupturam ad chirurgiam esse reuocandam, tentatis priùs multis ab ipso præscriptis medicamentis.



De Priapismo & Satyriasi.

C A P. XL.

Priapismus morbus est uentre peculiaris, quo illud citra voluntatem & coeundi cupiditatem turget, & totum in trinam

R 4 dimensio


392 *De Tumorib. præter naturam,*
 dimensionem extenditur: quamuis
 Gal. glandem non augeri scribat. In
 hoc priapismus à satyriasi differre
 videtur, quod in priapismo nulla
 est veneris appetentia, quamuis
 mentula sit rigida. In satyriasi ultra
 tensionem & rigiditatem, atque
 coëundi desiderium est palpitatio
 quædam. Priapismus non solum
 viris, sed mulieribus euenit: quibus
 vteri collum sine veneris appeten-
 tia rigidum fit, non secus quàm
 cum sunt ad venerem proclines. Sa-
 tyriasis mulieres rarò impetit, sed
 viros frequenter, quæ dum perse-
 uerat accersita conuulsione est exi-
 tialis.

~~~~~  
*De causis Priapismi & Satyriasis.*

C A P. X L I.

**P**riapismi causæ procatarcti-  
 cæ sunt, flatulentorum &  
 calidorum eduliorum esus,  
 vt synapi, fabarum, cicerum, cæpa-  
 rum, erucæ, bulbosarum radicum,  
 frequens

frequens vitellorum ouorum efus,  
vinum recens, osculorum venarum  
ab arctè cingente lumbos zona di-  
latatio, atque assiduus supra dorsū  
decubitus, meatuum veretri densi-  
tas. Corporeæ, arteriarum à calidi-  
tate hiatus, vel flatulentus spiritus  
ex viscidis & crassis humoribus ge-  
nitus à moderata caliditate, fistulo-  
sum & cauum neruum replentibus,  
tumidumque colem reddentibus.  
Saryriasis externa causa est fortis  
circa mulierem imaginatio, præter-  
missa coëundi consuetudo. Interna  
est semen redundans.



*De signis Priapismi & Satyriasis.*

C A P. XLII.

**S**I ex causis procatarctiis  
vterque oriatur affectus, ab  
agrotate resciet medicus: si  
ab internis, ex doloribus, quales te-  
taniciis contingunt, percipiet. Di-  
stentum & inflatum pudendum  
conuulsionis modo afficitur, & nisi  
confestim eis medela feratur, hoc

R s                      modo

394 *De Tumorib. præter naturam,*  
modo affecti pereunt. In satyriasi  
magna adest coëundi appetentia. In  
priapismo nulla prorsus. In vtro-  
que affectu tentigo. Horum mor-  
borum perseverantia sæpe conuul-  
sionem, atque mortem infert. Iuue-  
nes potius quàm senes hoc vitium  
inuadit.



*De Priapismi & Satyriasis  
curatione.*

C A P. XLIII.

**V**Triusque morbi curatio  
duobus perficitur scopis.  
Primo victus conuenientem  
rationem instituyente, qualis est ea,  
quæ attenuante facultate citra cal-  
factionem est prædita, frumentacei  
cibi administratio, & aquæ potus  
utilis. Cibi abstinencia calente aëre  
corpus nostrum ambiente salubris.  
Alimenta medicamentosa admini-  
strentur, qualia sunt lactuca, oxalis,  
hordei cremor. Aceti & acidorum  
vsus crebrer, docente Auicenna, in-  
salubris, quod flatus gignat. In duro  
lecto

lecto decumbat, foliis salicis, nym-  
pheæ, solani, semperuiui foliis, viti-  
cis munito, rosarum, caphuræ, fan-  
talorum, aquæ rosaceæ odor com-  
modus: vitabit quæ ad coitum cor-  
pus propensum reddunt.

Secundus scopus nos admonet,  
vt si corpus plethoricum appareat,  
vulneretur cubiti dextri iecoraria,  
& sang. copia pro virium & ætatis  
ratione mittatur. Demum vomitoriis  
medicamentis potius quàm purga-  
toris vtendum erit, vt docet in me-  
thodo curatiua Gal. quæ enim per  
inferiorem ventrem fiunt euacua-  
tiones, sæpenumero vicinas partes  
fluxione tentant.

14.  
Meth.

℞. Maluarum, viol. betæ, ebisci  
cum radicibus sing. M.ß. sem. lini &  
althææ sing. ʒ. j. prunorum dulcium,  
passul. sing. p. xxx. fiat decoct. in iure  
capitis, pedum & intestinorum ver-  
uecis, cape de col. quart. ʒ. in quibus  
diss. ol. viol. ʒ. iij. mellis viol. sach-  
rub. sing. ʒ. j.ß. succi mercurialis. ʒ. j.  
misce, fiat clyster.

Cauenda sunt maxime omnia quæ

R 6 cien

396 *De Tumorib. præter naturam,*  
ciēdæ vrinæ facultatē habent. Dan-  
da in potu nymphaea, & viticis se-  
mē, miscēda obsoniis rutha viridis.

Pro tertio scopo præsidia sunt  
præscribenda, frigida in principio,  
flatuum generationē præpedientia:  
Deinde procedēte morbo calida iā  
genitum flatum absumentia. Qua-  
propter viticis semen, rutha, origa-  
nū, calamentum, pulegiū, amerinæ  
& ruthæ semen commendatur.

Prius igitur ceratū ex simplici ro-  
faceo paratum, aqua frigida subactū  
lumbos, pudenda & eam interca-  
pedinem quæ est inter anū & pudē-  
dum, illinemus. Circa finem calefa-  
ciētibus & discutiētibus vtemur, iā  
dictās partes sycionio, ruthacēo,  
chamom. aut irino oleo inungētes.

A cibo instituendi erūt pulueres  
aut misturæ flatus absumētes. Quo-  
rum omniū præscripta tradita fue-  
re. In latus potius quàm resupini  
decumbant. Arcendi sunt ab omni-  
bus quę venerem cōcitare possunt,  
vt mulierum spectaculis, venereis  
narrationib. ac cogitationibus. Su-  
periorum partiū exercitatio est ex  
vfu.

usu. Plumbi bractea innumeris foraminibus perforata lumborum, & pectinis regioni erit admouenda.




*De Arthritide, & eius speciebus.*

C A P. XLIV.

**A**rticulus, quem Græci ἄρθρον vocant, naturalis est ossium, συντάξις (definitore Galeno) ad motum instituta, ex rotundo ossis processu in cavitatem *libro de ossi.* πούλῳ vocatam emergens, si dolore ab humoris defluxu excitato nascatur, arthritidem siue articulare morbum excitat. Qui generis nomen subiens πόδαρχαν, χείραρχαν, ἰσχιαδα comprehendit. Et quamvis à causa eadem excitentur tales affectus, à variis tamen patientibus partibus varia nomina fortiuntur. In arthritide articuli cum membranis, tendonibus, ligamentis, & omnibus partibus quas natura ad articuli structuram, firmitatemque comparauit, læduntur: quemadmodum in podagra pedes, & manus in chiragra.

*De*



*De horum affectuum causis.*

## CAP. XLV.

**T** Alium morborum causæ quædam procatarcticæ sunt, quædam corporeæ. Externæ habentur, usus alimentorum aromaticis conditorum, quæ cibos non exactè confectos ad iuncturas deducunt, improbus atque assiduus labor, equitatus frequens pedibus suspensis, longus per dispositos equos cursus, vehemens ambulatio, intempestivus veneris usus, & qui stando fit à ventriculi plenitate & crapula, consuetæ euacuationes prætermisæ, frigidæ insueta potio, frigidorum humidorumque eduliorum crebra comestio, largus meracioris & generosi vini potus, ieiuno potissimum ventriculo, frequens in frigida natatio, suppressa in fæminis menstrua purgatio, casus, eluxationes, mœrores, curæ, vigiliæ & multa animi pathemata,  
horum

horum affectuum prima fundamenta iecerunt; tametsi cæca nonnunquam horum sit origo.

Corporearum causarum duæ sunt principes, quarum altera alterius sodalitio priuata nihil prorsus efficit. Vna est laborantium partium imbecillitas natiua, & à vitiato parentum semine contracta, vel à quapiam re. Altera est humorum in laborantia membra defluxus. Nam sicuti nemo epileptico morbo diuexari potest, sine cerebri imbecillitate natiua aut ascititia: ita & sine pedum infirmitate podagra; sola tamen ad huius generationem, nisi accedat humoris defluxus, non est idonea. Quamuis à Gal. sit traditum, passi dispositionem esse causarum duplum, & morbos facilè excitari in patiente corpore disposito.

*Gal.co.  
in Aph.  
28.6.l.*

Omnes arthritidis species communem habent causam, humoris nempe redundantiam, affectam coarticulationem occupatam, qua oppleta in omnem partem circum-

sitæ

400 *De Tumorib. præter naturam,*  
fitæ neruofæ particulæ tenduntur  
non fine vehementi dolore. Quæ  
igitur ad tumores præter naturam  
per rheumatifmum factos concur-  
runt cauſæ, ab hiſ affectibus ab-  
eſſe minimè videntur. Nam ſicuti  
in aliis tumoribus præter naturam,  
partem hu. delegantem, & aliam  
illum recipientem adēſſe oportet:  
ita & in his articulorum moleſtiis,  
humorem ſua quantitate, aut vi-  
tioſa qualitate, aut vtroque modo  
noxium à cerebro, ventriculo, he-  
pate, per venas & arterias influere  
eſt neceſſe, non à ſolo capite, & ſub  
cute per ſumma corporis in exti-  
mas partes ferri, ſicuti aliquis oſci-  
tanter ſomniavit. Cuius opinio-  
nem ab eruditis aliquot abundè  
expugnatam euertere hoc loco ne-  
quaquam ſtatui. Sanguineus hu-  
mor irruens, pituitofus verò fre-  
quentiùs cum bilioſo, aut ſanguis  
cum ipſis permixtus, horum mor-  
borum cauſæ ſunt continentes.  
Quippe quod ad talium generatio-  
nem requiſitus ſit humoris deflu-  
xus,


xus, sine quo neque constare, neque excitari arthritis poterit.

Rarò à succo melancholico originem trahit, frequentius, vt diximus, à pituitoso, viscido, lento & puri simili, qui vbi diuturnam in articulis moram traxit, crassior ac viscidior redditur, in tophos indissolubiles degenerans, ad pristinam constitutionem articulum exactè redire prohibet.

Nonnunquam crisis ratione fit morbo per apothema ad articulos iudicato, vt de colico dolore constat, à quo humor noxius in articulos translatus, dolorem procreat. Vere aut autumnus magis quam aliis anni partibus, articulorum dolores contingunt. Sæpe arthritis morbo Parthonopæo est copulata, cum vehementi periostij dolore citra tumorem manifestum, de cuius curatione cap. de morbo Gallico agemus.

A morbo articulari coxædici dolor nihil differt, nisi quod ipsius causæ, nempe crassus & pituitosus humor

402 *De Tumorib. præter naturam,*  
humor in sola coxarum compage  
articulo concretus infideat, & do-  
lor à natibus inguinibus ad genua  
vsque, in multis ad imum vsque  
pedem pertineat.



*De Arthritidis, Podagræ, Chiragræ  
& Ischiadis signis.*

C A P. XLVI.

**C**Um omnes isti affectus vnâ  
& communem habeant cau-  
sam, humorum nempe de-  
fluxum, communia etiam habe-  
bunt indicia suas causas common-  
strantia, sine quarum cognitione  
neque opportuna à nobis præsidia  
præscribi poterunt, neque vera me-  
thodo depelli. Et quemadmodum  
(vt primo libro ostensum fuit) tu-  
mores præter naturâ rarò à since-  
ris humoribus scaturiunt: ita mor-  
bi isti ab his excitari nequeunt.

Sed priùs tradenda est simplicis  
humoris indiciorum doctrina, qua  
cognita, facilè ad compositi noti-  
tiam

tiam nos conuertere poterimus. Cognitio horum ex colore, symptomatis, & coincidentibus accessionibus est petenda, quamuis neque omnibus ex procinctu manifesta sit, tamen non adeò difficilis cognitu existit. Biliosus enim sanguis multæ caliditatis ægroto sensum exhibet, & calefacientibus impositis exacerbatur, quemadmodum à frigidis relaxatur. Dolor ab vna parte in aliam facilè permutat, color à rubro flauus est, tumor exiguus conspicitur, & quæ erysipelatis propria sunt in hoc apparent. Tumor maior & ruber ad vicinam & carnosam partem extensus, si à sanguine ortum traxerit, apparet.

Si his morbis pituitosus humor ansam suppeditet, non repentè & affatim hominem adoritur, cum clementioribus doloribus, laxioribusque tumoribus, diutiùsque vni parti hærentes & quieti sunt, illius robur deicientes functioni plurimum incommodant. Cui malo iuueni

404 *De Tumorib. præter naturam,*  
uenibus sunt magis obnoxij senes.

Ad humoris noxij generationem  
confert prægressa diæta, & antea acta  
victus ratio, eduliorum tum quan-  
titas, tum qualitas, anni hora, re-  
gionis & aëris constitutio, ætas in-  
super, & ipsius corporis habitus.

Articulorum dolores qui iam  
altas radices egerunt, membrum  
emaciant, à quibus si clementiores  
sint, post crassæ turbidæque vrinæ  
excretionem, aut superuenientibus  
varicibus multos vindicari con-  
tingit.



*De Arthritidis, & aliarum specie-  
rum curatione.*

C A P. XLVII.

**H**Orum morborum curatio  
in duobus, præcautione sci-  
licet, futuro morbo prospi-  
ciente, & curatione præsentem pro-  
fligante consistit. Et quamuis præ-  
cautio quodammodo curatio sit;  
nihilò secius quia hæc corpori non  
actu

actu laboranti, alia dolore infestato debetur, alteram ab altera distinguere non erit à ratione alienum.

Ergo cum hos morbos excitare soleat incauta victus ratio, & maxime crapula, ab ea religiosè abstinendum censemus, & inediè indulgendum, cum hæc docente Hipp. & hoc in arte medicinali confirmante Galeno, per accidens corpus euacuet.

Excitatam iam crapulam, & quæ factura est accessionem, vomitione arcebinus, attenuante & corpus modicè calefaciente, atque exiccante victus ratione fouebimus, & veneri iuncturis insidianti parcemus. Quod si plethoricum corpus sit, venæ sectione, si cacochymicum, purgatione futuro morbo obuiam ibimus. Quas euacuationes vere, & autumnò cōmodiùs quàm reliquis anni partibus aggrediemur. Educemus autem sanguinem copiosè, sed per interualla, ut fluxionis impetum in contraria ducamus.

Mem



406 *De Tumorib. præter naturam,*

Membrorum insuper mandantium, ut cerebri, ventriculi, hepatis, & recipientium habenda erit ratio, ad motis roborantibus medicamentis, & quæ ductus per quos in imbecillos artus ducitur materia, astringere possunt; usurpabimus. Articuli ambulatione assidua non erunt defatigandi, & vini potum tanquam venenatum anguem respuemus; cuius loco fontanæ aquæ potus, aut pluviæ, si calidus & æstuans sit ventriculus, hydro-melitis, vel loræ, aut tortiui vini salubris erit. Assa elixis sunt præferenda. Sunt qui ossium humanorum cineres commendent, pedis, si podagra, manuum, si chiragra quis tentetur. Sed hoc remedij genus multis superstitiosum visum est, nisi quod siccitate sua magis prodesse quàm obesse possit. Frictiones euacuato corpore, ex oppositis & distantibus partibus utiles.

Si à calido & bilioso humore excitata sit accessio, primò emollientem, intestinæque eluentem  
cly

clysterem, astricta potissimū aluo, supponemus. Deinde si magna sit huius humoris redundantia, chologogo medicamento purgandum erit corpus, eoque leni cathartica facultate prædito, cum astrictione aliqua. Nam quæ aluum maximè subducunt, & è longinquis partibus non tantum cæca proprietate, sed caliditate succum noxium attrahunt, humores eliquando, ductus aperiendo, & corpus rarefaciendo, fluxiones in imbecillas partes magis promouent, & robur ventriculi prosternunt: quo fit ut reliquæ corporis partes affligantur, & nervi per consensum ampliore vitiosi humoris fluxione impetantur.

Quapropter ab aromaticarum pillularum, foetidarum, arthetricarum, & de hermodactilis potissimum circum initia abstinere fas est, & medullæ cassiæ fistulæ, catholici, rhabarbari, aut tripheræ persicæ vsus nobis arridebit. In sequentem igitur modum, medicata à

408 *De Tumorib. præter naturam,*  
ta à nobis potio parabitur.

℞. Medullæ cassiæ fist. à canna  
nuperrimè euulsæ ʒ.ß. catholici ʒ.  
vj. sem. anisi puluerati ʒ. j. cum sac-  
charo. fiat bolus, quē quatuor ho-  
ris ante prandium deuorabit, dissol.  
in iure galli nigri veteris si forbere  
malit. Vel sic.

℞. Catholici ʒ.ß. tripheræ per-  
ficæ ʒ. v. syr. ros. solut. ʒ. j. diss. in de-  
cocto florum cord. co. sem. portu-  
lacæ, acetosæ, myrobal. citrearum  
& chebularum sing. ʒ. j. fiat potio.

Quod si catapotiorum vsum  
medicatæ potioni præferat, sequen-  
tia deglutiet.

℞. Massæ pillularum masticina-  
rum, aggregat. maio. aut de quin-  
que generibus myrobalanorum  
sing. ʒ. ij. malaxentur cum syr. ros.  
solut. fiant pillulæ 7.

Post aluum laxantis med. admi-  
nistrationem, repellentiū & astrin-  
gentium influentibus adhuc hu-  
moribus vsus salubris erit. Quæ  
ante corporis euacuationem non  
sunt vsurpanda, ne periculum  
recessus

recessus humorum in nobiliores partes immineat. Et ubi iam amplius non influunt, illapfos discutimus. Optimum erit oxyrhodinum madefactis linteolis aut lana frigida æstate superimposita, tepida hyeme, fottus ex astringente vino cum oleo rosaceo, vel ex vino in quo myrti turiones, & nuces cupressi bullierint, sunt ex usu.

A multis frigida perfusio, aut oxyrhodini laudatur. Sed frequentem frigida usum suspectum habeo, tum quod frigiditate sua nervosum genus, & copulas offendat, tum quod partis sensus stupidos reddat. In biliosa, vehementi dolori copulata, sequens remedium à multis probatur.

℞. Medullæ cassiæ fist. ℥. ij. mucag. sem. psyllij cum aqua rosarum extractæ ℥. j. β. olei ros. ℥. iiij. croci ℥. j. misce, fiat linimentum. Vel sic.

℞. Medullæ panis filiginei lb. j. elixetur in lacte caprino, vel ouillo, contundatur diligenter in mortario marmoreo, & buxco pistillo.

S        misce

410 *De Tumorib. præter naturam,*  
misce olei ros.  $\mathfrak{z}$ .iiij.vitell. ouorum  
recentium num.ij.croci  $\mathfrak{z}$ .j. fiat ca-  
taplasma, cui addenda erit  $\mathfrak{z}$ .j.  $\beta$ .  
sem.papa.aut  $\mathfrak{z}$ .j.opij,vel olei man-  
dragoræ  $\mathfrak{z}$ .j.in vehementissimo do-  
lore, præcedentibus tamen priùs  
clementioribus præfidiis.

Multi corticem cucurb. recentis  
admouendum suadent. Alij oleum  
rosarum aqua frigida diligenter  
lotum, lacti aut ouorum albumini  
mixtum, vehementerque agitarum  
extollunt. Vnguent. ros. Mesuei  
succo endiuiaë lotum alij commen-  
dant: oleandri folia contusa ple-  
rique. Quæ certè medicamenta  
tentanda non sunt, nisi in morbi  
initio, & ipsa in locum defluente  
materia, & dolore acerbissimo. No-  
xia habentur hæc in critica arthri-  
tide, nisi ex maximis doloribus vi-  
res concidere metuamus. Si astricta  
extiterit aluus, sequens clyisma sup-  
ponemus.

$\mathcal{L}$ . Foliorum lactucæ, nymphaeæ,  
maluarum, viol. branchæ vrsinæ,  
fol. siclaë, mercurialis sing. M. j. 4.  
sem.

*Liber III. Cap. XLVII. 411*

sem. frig. maio. contusorum sing.  
3.ij. sem. lini, altheæ sing. 3. j. pru-  
norum pa. xxx. florum viol. nym-  
pheæ sing. p. j. fiat decoct. de col. ca-  
pe qu. v. in quibus diss. cassiæ à can-  
na nuperrimè auulsæ 3. j. diaprun.  
simpl. aut solut. 3. iij. olei viol. nym-  
pheæ, mellis viol. sing. 3. j. β. fiat  
clyster, supponatur efflagitante ne-  
cessitate.

Qui aqua dulci & tepida artus  
lauant, sibi malè consulunt, quia  
humores commouent & exagi-  
tant, & iuncturas laxas ad hos  
promptiùs recipiendum reddunt.  
In huius morbi incremento ca-  
thartica magis conferunt quàm  
in principio. Affectæ itaque parti  
sequentia præsidia consentanea  
erunt.

℞. Rad. altheæ 3. iij. malu. cum  
rad. viol. sing. M. j. rosarum rubra-  
rum, florum viol. p. j. florum cha-  
mom. meliloti, sambuci sing. p. β.  
fiat decoct. in iure pedum & inte-  
stinorum veruecis, contundantur  
postea optimè. Adde farinæ sem.

S 2 lini.

412 *De Tumorib. præter naturam,*  
lini, fanugraci sing.  $\bar{z}$ . ij. farinæ  
hordei  $\bar{z}$ . j.  $\beta$ . axungia porci sine sa-  
le  $\bar{z}$ . iiij. olei ros. chamom. sing.  $\bar{z}$ . iiij.  
fiat cataplasma, admoueaturn fre-  
quenter. Vel vnguento sequenti  
inungenda erit pars.

$\mathcal{L}$ . Olei anethini, chamom. sing.  
 $\bar{z}$ . ij. olei ros. vel viol. sing.  $\bar{z}$ . j. ceræ  
parum. fiat vnguentum, vtere. In  
huius affectus declinatione tam in  
sanguinea quam in biliosa, vsur-  
panda sunt sequentia.

$\mathcal{L}$ . Farinæ sem. fanugraci, lini  
sing.  $\bar{z}$ . ij. florum chamom. melilo-  
ti, sambuci sing.  $\bar{z}$ . iiij. hordei  $\bar{z}$ . j.  
muccag. sem. althææ  $\bar{z}$ . j.  $\beta$ . olei de  
lilio  $\bar{z}$ . iiij. ceræ q. s. fiat vnguentum.

Vrina cum sale si ex ea foueatur  
locus dolens, est ex vsu, necnon  
ebuli succus cum oleis rosarum &  
chamom. inspissatus. Confert &  
emplastrum diapalma cum oleo  
chamom. malaxatum, vel emplastr.  
diachylonis minoris ireati: additis  
pulueribus florum chamom. &  
hermodactylorum. Vnguentum de  
vespertilionibus à Rhafi commen-  
datur.

In

In arthritide à frig. materia orta concitandus erit vomitus, qui non solum omni speciei arthritidis, sed dolori nephriticorum maximè est salubris. Hunc alimentis ping. & copiosis onerato ventriculo, vel medic. ad id dicatis prouocabimus: idque tentandum in homine vomitioni propenso.

Purgandum postea erit corpus catapotiiis assageret d. Auicennæ, de hiera simpl. de aromatis, aut ex rheo, agarico, mastiche, & aloë paratis, spretis his quæ hermodactylos sua natura ventriculum lædentes recipiunt, aut arthriticis, fætidisue maioribus, quod sua vi insigniter purgante, humores exagitando, fluxionibus facilius iter præbeant, & iuncturas ipsas debilitent. Sequentes itaque præscribendæ erunt.

℞. Massæ pill. assageret ʒ. iiij. malaxentur cum aqua iuæ arthriticæ, vel primulæ veris. fiant pill. 7. quas deglutiet hora secunda post mediam noctem. Vel sic.

S 3      ℞. Rhei



℥. Rhei optimi ʒ. j.  
aloës ʒ. ʒ. diacrydij ʒ.  
xentur cum melle ros.  
lulæ 9. capiet septem  
Vel sic.

℥. Mass. pil. aggreg.  
myrobalanorum cebul.  
trearum sing. ʒ. j. scam.  
malaxentur cum syr. ro.  
pil. 6. capiet vt dictum  
quendus erit is viscidus  
humor sequentium me-  
rum administratione.

℥. Rad. acori vulga-  
rientes, quales sunt fæ-  
galangæ, quod fluxio  
ueant, sunt arcendæ.  
campanæ, & corticis ci-  
ʒ. ʒ. foliorum bethoni-  
saluiæ, sampsoci, pri-  
chamepytheos, cham-  
M. ʒ. vtriusque cichor-  
bugloss. cum radicib. fu-  
curialis sing. M. j. sem. a-  
li sing. ʒ. j. ʒ. caricarum  
passul. enucleat. sing. pa-  
carthami contusæ ʒ. i.

polypodij querni sing.  $\mathfrak{z}$ . j. turbit  
electi & gummosi in lacte caprino  
macerati  $\mathfrak{z}$ . ij. glycirrh. recentis &  
rasæ  $\mathfrak{z}$ . j. florum stœchados, roris-  
marini & bugloss. sing. p. j. fiat de-  
coct. & in col. t $\mathfrak{b}$ . j.  $\beta$ . diss. mellis ros.  
colati, syr. de acoro sing.  $\mathfrak{z}$ . ij. sacch.  
albissimi  $\mathfrak{z}$ . iij. pulu. pliris arconti &  
diarhod. sing.  $\mathfrak{d}$ . ij. fiat apozema  
clar. & arom. capiat in 4. dosibus  
de mane. Vel sic.

$\mathfrak{R}$ . Mellis ros. col. syr. de stœcha-  
de sing.  $\mathfrak{z}$ . ij. syr. de cortice citri  $\mathfrak{z}$ . j.  
 $\beta$ . aquarum melissæ, bethonicæ &  
bugloss. sing.  $\mathfrak{z}$ . iij. pulu. nucis mos-  
chatæ, & elect. triasant. sing.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ .  
misce, fiat zulapium clar. & arom.  
capiat in tribus dosibus de mane.

$\mathfrak{R}$ . Indi maioris, & elect. diacarth.  
sing.  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . rhei opt. in aqua bethon.  
& paucō vino albo infusi & expres-  
si  $\mathfrak{d}$ . iij. spicæ nardi eadem arte  
præparatæ  $\mathfrak{g}$ . vj. syr. ros. solut. q. s. de-  
cocti præcedentis apozematis  $\mathfrak{z}$ . 4.  
misce, fiat potio, detur post vsum  
præcedentiū cum custodia debita.

$\mathfrak{R}$ . Theriacæ veteris  $\mathfrak{d}$ . 4. conser-

416 *De Tumorib. præter naturam,*  
uæ rosarum ʒ. ʒ. sacch. modicum.  
fiat bolus, quem capiet in craſti-  
num horis 4. ante prandium.

℥. Conseruæ florum saluiæ, ro-  
rismarini sing. ʒ. j. conseruæ acori  
colati, & cōsolide maioris sing. ʒ. ʒ.  
conseruæ enulæ campanæ, & cor-  
ticis citri saccharo conditi ʒ. v. con-  
seruæ florum cichorij, rad. bugloss.  
sing. ʒ. vj. pulu. diamoschi dulcis &  
diarhod. sing. ʒ. j. pulu. triasantal. &  
diamarg. frig. sing. ʒ. ij. syr. conser-  
uationis acori q. s. fiat opiata, de qua  
singulis diebus horis duabus ante  
prandium capiet ad quantitatem  
vnius castaneæ, bibendo postea  
cochlearia duo vini clari aqua sal-  
uiæ diluti. Vſus Theriaces veteris  
vel Methridati probatur.

℥. Syracis calam. myrrhæ, aloës  
sing. ʒ. ʒ. ladani purissimi ʒ. iij. alu-  
minis ʒ. j. cassiæ ʒ. ij. olei nardini ʒ.  
iij. ceræ citrinæ q. s. fiat vng. Vel sic.

℥. Agarici ʒ. j. myrrhæ & thuris  
sing. ʒ. vj. farinæ fænugræci ʒ. j. ʒ.  
se. cicutæ ʒ. ʒ. medullæ cerui & te-  
rebinthinæ sing. ʒ. ij. olei chamom.  
ʒ. ʒ.

℥.β. ceræ citrinæ q. s. fiat vnguentum. In morbi declinatione sequentia sunt administranda.

℞. Stercoris vaccæ, capræ recent. sing. ℥.j. farina fabarum ℥.iiij. furfuris macri p.j. facis olei de lilio ℥.iiij. mellis ℥.ij. fiat catapl. Vel sic.

℞. Vnguenti resumptiui ℥.v. butyri recentis non saliti ℥.iiij. axungia vrsi ℥.ij. sem. cumini ℥.β. lumbricorū terrestrium generoso vino lotorū ℥.vj. iridis florentiæ, hermodactylorum sing. ℥.j. florū chamom. meliloti, sambuci, & foliorū saluiæ siccorum sing. ℥.iiij. croci ℥.j.β. olei keirini, amygd. amar. sing. ℥.iiij. ceræ citrinæ q. s. fiat vnguent. Vel sic.

℞. Axungia taxi ℥.iiij. resina pini ℥.ij. muccag. sem. altheæ, lini sing. ℥.iiij. oleorum ruthæ, de anetho sing. ℥.vj. ceræ citrinæ qu. suff. fiat ceratum. Addendo asellorum qui sub situlis procreantur, in tenuissimum pollinem redactorum ℥.x.

Si ab humore mixto morbus oriatur, vt sæpe contingit, tam in principio quàm reliquis temporibus

S s bus

bus miscēda erunt reme-  
rum vsu tanquam iuu-  
nocentibus sumendæ er-  
tiones, cum huius morbi  
ritum medicum sæpe la-  
membrum in tritici ace-  
re reconditum, certo ter-  
bant. Iam pacato tumore  
infirmæ partes sequent  
camentis erunt roboran-

℞. Cinerum quercus  
hermodactylorum sing.  
pluuiæ in qua extinctum  
candens, aut ferri scoriam  
est, paratur lixiuium. m.  
aluminis ℥.iiij. salis com-  
Lauentur pedes & artu-  
fert deinde sequentium  
rum appositio.

℞. Massæ emplastri d.  
salis co. ℥.iiij. malaxent  
inunctis oleo mastichin-  
daleon. Emplast. contr-  
etiam prodest, & de ma-  
chalciteos, adaucta  
quantitate. Concitandu  
vomitus, aut catapoti

nistratio crebra esse debet. Familiaria catapotia in sequentem modum præscribenda erunt tempore præsertim frigido.

℞. Castorei ʒ. j. agarici ʒ. j. β. zingiberis, salis gemmei sing. ʒ. β. rhei ʒ. iiij. myrrhæ & sarcocollæ ʒ. j. trochiscorum allhandal ʒ. β. aloës succocitrinæ ad pondus omnium, malaxentur cum aqua primulæ veris, fiat pasta pil. & ex ʒ. j. conformetur pillulæ vj. quas deglutiet singulis x. diebus cum regimine artis. In temporis constitutione calida horum loco sequens præsidium conferet.

℞. Cathol. ʒ. iiij. elect. indi ma. ʒ. j. turbit opt. & in lacte caprino macerati ʒ. ij. Rhei pul. ʒ. iiij. triphæræ persicæ ʒ. j. syr. ros. solut. q. s. ad incorporandum, fiat opiata, de qua sing. x. diebus capiet ʒ. vj. per se aut diss. in aquis bet. & primulæ veris.

Sæpe in arthritide à resiccata & gypsea pituita, circa iuncturarum regionem sensim nascuntur tophi, siue calli articulos maximè mole-

420 *De Tumorib. prater*  
stantes & contrahentes,  
quam producti sunt, ad  
constitutionem articuli  
nō sinunt. Quos Gal. ca.  
ex vetustissimo bubulo  
& falsi pedis decoct. mac.  
mortario subacto rupta  
cute, absque sectione to  
dere facit.



*De Coxendicis morbi*

## C A P. XLV

**I**N coxendicum  
ratione euacuationis  
noxij est necessa  
cta venæ ex cubito m  
piente, postea erit rep  
poplitis interna vena iu  
ab humore frig. obor  
dolor. Hipp. venas pos  
gente dolore secare iu  
frequenter iniicienda  
huic affectui maximè v  
in sequentem modum p  
cipies.

*Liber III. Cap. XLVIII. 421*

℥. Rad. liliorum alborum ℥. j. β.  
althææ cum rad. maluarum, viol.  
branchæ vrsinæ, parietariæ, siclæ,  
mercurialis, centaurij minoris sing.  
M. j. sem. lini ℥. j. sem. anisi & mara-  
tri sing. ℥. ij. medullæ carthami  
contusæ ℥. j. agar. in panno ligati  
℥. vj. florū chamom. ruthæ &  
anethi sing. p. j. fiat decoct. & in  
coll. tb. j. aut qu. v. diss. benedictæ  
℥. β. Catholici ℥. vj. olei de lilio,  
vel chamæm. ℥. iij. mellis ros. col.  
succī mercurialis sing. ℥. j. β. salis  
communis parum, fiat clyster.

Repellentia & adstringentia me-  
dicamenta circa coxendicis iunctu-  
ram non sunt admouenda. Nam  
cū ea, docente Galeno, in pro-  
fundo sita sit, sang. ex vicinis &  
ambientibus vasis ac musculis ad  
illam concipitur. Quapropter mi-  
tigatoriis in principio medica-  
mentis opus est, quæ neque refri-  
gerent multum, neque calefaciāt:  
qualibus procedente iam morbo  
opus habet. Exacerbantur enim  
per ipsas fluxiones, ca. nimirum  
has



422 *De Tumorib. pra*  
has plus attrahente qu  
diente.

Dolor coxendicis ra  
nis multitudine scatur  
mè curatur, venis circ  
aut talos sectis. Ante  
corporis purgationē, a  
macis si quispiam circ  
fectam vtatur, agrè c  
det affectionem, cop  
ibi indissolubiliter de  
ob acrium medicame  
lorem & sicc. non dis  
piam assationi patitu  
que maximam vim ad  
affectus habeat toti  
euacuatio, ab ipsa inc  
non solùm à cruribus  
to facta, vt. superiùs  
fang. detractione.

Ischiadicis vomitus  
dest, magis quàm info  
trem euacuationes, e  
dcorsum repentem h  
uellant. Prouocandi t  
ab accepto cibo à me  
cipiendo, & tandem

progrediendo.

℞. Galangæ crassioris, radicis enulæ camp. sing. ʒ. j. corticis citri sicci rad. pæoniæ rom. sing. ʒ. ʒ. ru-  
biæ maio. cū rad. saluiæ, sampfuci,  
melissæ, iuæ arthriticæ, herbæ para-  
lysis, bethonicæ sing. M. j. glycirrh.  
rasæ ʒ. j. seminis anisi, fœniculi  
sing. ʒ. j. caricarum ping. num. xx.  
hermodactylorum (si validus sit vē-  
tricus) ʒ. ʒ. myrobalanorum ci-  
trearū & cebularum sing. ʒ. iij. fol-  
liculorum sennæ, polypodij querni  
recentis sing. ʒ. ij. Agarici recenter  
trochiscati in panno ligneo ligati  
ʒ. ʒ. florum stœchad. rorismarini,  
saluiæ & bugloss. sing. p. j. fiat de-  
coctio & in coll. ʒ. j. ʒ. diss. syr. de  
stœchade, mellis ros. col. sing. ʒ. iij.  
pulu. maceris, diamoschi ducis  
vel pliris arcont. sing. ʒ. ij. misce,  
fiat apozema clar. & arom. capiat  
in 4. dosibus de mane. Vel sic.

℞. Syr. de stœchade, mell. ros.  
col. syr. de acoro sing. ʒ. ij. iuæ arthri-  
ticæ, bethonicæ, saluiæ sing. ʒ. iij.  
pulu. macis & pulu. elect. diambæ  
sing.

424 *De Tumorib præ*  
sing. ʒ. ij. misce, fiat z  
arom. capiat in 4. do  
ne.

℞. aloës opt. & aga  
hermodactylor. ʒ. iiij.  
myrobalanorum citri  
larum sing. ʒ. 4. zingib  
farum & mastich. sing.  
monij ʒ. β. malaxen  
melite simplici. fiat pa  
formentur pil. vj. qu  
hora secunda post me  
Quod si prædicta cata  
tire non possit, capie  
medicatam potionem

℞. Elect. diacarth. &  
lut. sing. ʒ. ij. rhabarb.  
ʒ. v. spicæ nardi ʒ. j. f  
ʒ. j. aquarum saluiæ &  
ris sing. ʒ. ij. fiat potio  
num capiet ʒ. j. β. the  
vel methridatij, vel co  
con. conseruæ stœch  
dem.

Quod si ægrotantē  
tū excruciet, anodina  
conciliantia narcotic

quod ad philonem refertur, vel  
afyncritum Actuarij, quæ recentia  
nequaquam esse debent, sed duo-  
rum aut trium amorum, neque sta-  
tim, sed post clementiorum vsum,  
sunt propinanda, sat est si annotina  
sint. Euocandus erit qui in alta par-  
te residet humor, cucurbitularum  
appositione, nonnunquam cum  
alta scarificatione. Affectum po-  
stea locum oleo fusino, ruthaceo,  
lumbricorum, aut aliquo humorem  
ex alto ad superficiem attrahente,  
irrigabimus, vt est vulpinum, irinū,  
keirinum, costinum aut philoso-  
phorum: his aliquam aquæ vitæ  
quantitatem velocioris penetratio-  
nis ergo miscebimus. Foueri etiam  
ante vnctionem & reliquorum me-  
dicamentorum vsum poterit se-  
quentibus præsidiiis affecta pars.

℥. Rad. pæoniæ & cappar. sing.  
℥. iij. hermodactylorum ℥. iij. agar.  
℥. j. β. fol. centaurij minoris, iuxæ ar-  
thriticæ, primulæ veris, saluiæ &  
maioranæ sing. M. j. sem. ruthæ, se-  
seli massiliensis sing. ℥. j. florum  
chamom.

426 De Tumorib. p.  
chamom. meliloti, fa  
chados sing. p. j. fiat c  
bus partibus aquæ &  
de qua expressis ma  
foueatur frequenter  
gio. Vngatur deinde  
quenti.

℥. Axungia taxii  
sing. ℥. iij. pulu. iridis  
hermodactylorum su  
rum, ℥. j. β. corticis  
vj. rad. pyretri ℥. v. fl  
rij minoris, chamom  
sing. p. j. olei de cast  
sing. ℥. v. ceræ citri  
guentum. vngantur  
emunctorio & coxa.

℥. Vnguenti M  
axungia serpentis &  
β. succi nasturtij ℥. i  
lupinorum & pulu. i  
β. æsopi ℥. iij. olei ch  
sing. ℥. iij. fiat catap

℥. Galbani, opop  
gummi ammoniaci  
quatorum sing. ℥. iij.  
℥. j. β. mastiches ℥. j. g

niæ ʒ.vj. medullæ cruris vituli ʒ.ij.  
axungia humanæ & gallinæ sing.  
ʒ.ij. ʒ. florū hyperici & chamom.  
sing. p. j. olei de piperibus & irini  
sing. lb. ʒ. ceræ citrinæ q.s. fiat cera-  
tum, extendatur supra alutam ma-  
gnitudinis debitæ, post fotum par-  
ti admoueat. Vel sic.

℞. Massæ emplastri diachylon.  
magni cum gummis lb. j. massæ  
emplastri apostolici chirurgici lb.  
ʒ. pulu. iridis florentiæ & hermo-  
dactylorum sing. ʒ. j. ʒ. malaxentur  
manibus inunctis oleo keirino, fiat  
Magdaleon, formetur emplastrum  
magnitudinis necessariæ, addendo  
terebinthinæ ʒ. j. ʒ.

Si horum medicamentorū opera  
affectus non cōquiescat, repetenda  
erit euacuatio tum suppositis acri-  
bus clysmatis quæ huic affectui sūt  
necessaria, tum propinatis catapo-  
tiis. Aluum probè solutam habere  
expedit, quippe quod illa astricta,  
premuntur & grauantur articuli,  
quæ omnia in sequentem modum  
parabimus.

℞. Rad.

428 *De Tumorib. prate*

℥. Rad. liliorum all  
hermodactylorum cont  
ß. polypodij querni re  
foliorum chamæpythe  
dryos, saluiæ, primulæ  
ranæ, nasturtij syluestri  
nicæ sing. M. j. rad. asa  
sing. ʒ. j. sem. carthami  
ß. colocynth. ʒ. iij. agaric  
anisi, fœniculi, ruthæ sin  
stœchados, rorismarini,  
decoct. & in qu. v. diss.  
Gal. ʒ. ß. indi maioris ʒ.  
costo & de castoreo sing  
lis rorismarini, sacch. rub  
mercu. sing. ʒ. j. fiat clyst  
salis gemmei ʒ. j. suppo  
gitante necessitate.

℥. Massæ pilu. arthri  
hermodact. sing. ʒ. 4.  
opt. ʒ. j. cinamomi & nuc  
tæ sing. ʒ. j. malaxentur  
saluiæ, fiat pasta pil. ex ʒ.  
vj. quas capiet singul. x. d  
2. post mediam noctem.  
teria moderatè frig. in fr  
dis, in mixta mixtam

habentibus vtendum erit. Pro varia morbum excitantis causæ dispositione, varianda esse præsidia nemo ambigit. Cataplasma ex lepidij radice optimè contusa & suillo adipe commollita, ad dolentem locum ad horas tres appositum Damocrates Medicus commendauit.

Calcare vuas à Solis calore æstuantibus, nudis pedibus & cruribus, maximè conferre ipsa experientia docet. Aquarum medicatarum vsus in omni iuncturarū dolore, in ipsa potissimum declinatione saluberri-  
mus existit. Quales sunt sulphureæ, aluminosæ, & nitrosæ. Artuum ex dulci aqua lotio perniciosa habetur, quia iuncturas nimium laxat, vt dictum est, & hu. ad fluxionem disponit. Sed ex astringente vino & lixiuio, addito aluminis salisue momento, utilis.

Plerique successu haud infœlici illam victus rationem instituunt omnibus arthritidis speciebus, quæ fit ex ligni Guaiacini decocto, aut sarsa parillia, de quo cap. de mor-  
bi



430 *De Tumorib. prate*  
bi Parthonopei curatio  
differemus. Non desunt  
sionis & euacuationis  
thritide , pyrotica me  
cauteria potentialia voc  
næ coxarum parti , aut  
biæ admouent , vel sp  
dullæ origini si in brac  
gitos defluxio feratur  
Quorum consilium no  
probo , quia maiorem i  
partes fluxionem acce  
rum viribus deiectis : p  
ternæ brachiorum par  
corariam, si coxendicis  
podagra quis tentaret  
tibiæ parti , si omopla  
ros , brachia aut ma  
queret. Dropaces & sir  
adurentibus medicame  
tos , coxæ ac cruri m  
nunt , ad continentis  
euacuationem , tum eu  
si assiduæ præsidiorum  
fiant facilius affectio  
Hipp.in Aph.per ipsius  
nem sanari scripsit ,

*Aph.*  
*60.l.6.*

*Liber III. Cap. XLIX. 431*  
quando ob illapsum mucorem luxata est articulatio, ea prius in suum locum reposita, vitione absumitur mucor, & contracta iam parte ipsius prohibetur luxatio. Vrendi modus à Paulo l.6. cap.76.docetur.



*De morbo Parthonopeo, siue  
Hispanica lue.*

C A P. X L I X.

**M**Orbus quem plerique Neapolitanum siue Parthonopeum, gallicum, scabië Hispanicam multi vocant, antiquis medicis ignotus, quë neque lichenas, neque Plinij mëtagram, neque elephantiasim, pforam, lepram, sacrum ignem vel anthracem esse constat. Nouus est morbus, antiqua carens nuncupatione, à recentioribus medicis bene cognitus, à quibus curatiua methodus est planè instituta.

Huius origo, vt aliquibus placuit, à nobili quodam scorto in Valentia

432 *De Tumorib. præ-*  
lencia Hispaniæ Taraco-  
gni ciuitate ab eleph-  
dam equestris ordini  
gresso, ex cuius fœdo-  
tra paucos dies quad-  
lites infecti fuere, &  
Francorum Regem Ita-  
ditionem parantem c-  
Tandem adaucta in i-  
libidine, is ita inualui-  
multos ex immundo  
cubitu labefactarit, &  
ti in vnum cumulu-  
morbos pepererit, v-  
loco demonstrabitur.

Ex quorum synde-  
variis huic scelesto m-  
sunt descriptiones. A-  
morbum gallicum esse  
varia humorum corru-  
ratas, propter nimiam  
lore & humore inter-  
denda primum, dein  
corpus cum magno p-  
lore occupantes, vt  
Ioannes cognomento  
solutam esse contin-

exustis humoribus per contagium in concubitu ferè genitam, à malignis quibusdani pustulis incipientem, pudenda plerunque, & reliquas corporis partes, caput præcipuè, inficientem; abscessusque du-  
ros in pessima adeò vlcera desinen-  
tes, vt ossa vitientur, per longum  
desinentia tempus. Scripsit Falop-  
pius Parthonopeum morbum esse  
hepatis affectum in tota substantia  
spiritus dissipantem. Nicolaus Mas-  
sa hunc morbum sic definit. Est  
epidimialis dispositio in membris  
corporis, præcipuè in hepate & ve-  
nis, & eorum humoribus existens,  
ex qua sequuntur veluti sympto-  
mata, dolores, pustulæ per vniuer-  
sum corpus.

Quæ certè descriptiones morbo  
Parthonopeo non omnino viden-  
tur posse adaptari. Nam Leonice-  
nus ex ea quam tradidit definitio-  
ne, hunc morbum esse Epidemi-  
cum arbitratur, ex nimio aëris ca-  
lore & humore contractum. Quod  
si hoc verum esset, sequeretur, om-

T

nes

434 *De Tumorib. praen-*  
nes aut horum maio  
qui regionem austro e  
colunt, tali contagion  
di. Quod esse quàm  
sum luce meridiana es  
enim ægritudo citra  
aut ab ipso malam pr  
qualitatem neminem p  
hendere.

Multò melior & to  
Ioannis Manardi dese  
omnino explodenda  
affectum hepatis in to  
spiritum dissipantem  
Nam concludere iure  
sumus, hydropem ca  
morbo Parthonopeo n  
cùm hydrops citra he  
affectum spiritus dissip  
ex idiopathia, siue syr  
catur fieri non possit. F  
tes externas in hoc n  
quàm internas vitari  
verò internas, & præ  
ipsum. Massa in eode  
niceno cliuo sudare v  
demialem disposition

*Liber I I I. Cap. X L I X. 435*  
membris corporis , hepate scil. venis, & eorum humoribus , asserens. Neque audiendus est Montanus hunc morbum distemperiem calidam & siccam esse asstruens , cùm calorificis & exiccantibus præsiidiis curetur.

Guilelmus Rhondeletius collega olim meus , morbum Gallicum sic definiuit. Est intemperies mala, partium externarum cum humore contagioso , ex venereo contactu mediata vel immediata contracta, ad quam sequuntur vt plurimum pustulæ , mala vlcera & dolores. Quæ certè descriptio , vt confusa est , ita anxium legentis animum retinet. Est enim luce merìdiana clarius, omnes intemperies corporis functiones lædentes, esse malas, quapropter huic morbo non esse proprias.

Porrò non est intemperies in genere , sed in specie , nempe frigida & humida (vt postea asserit,) & non solum ad externas partes, quamuis primordia & sua rudimenta ab illis

436 *De Tumorib. præter naturam*  
fulcipiat, est referenda, quia hæc  
circa vitiosi humoris præsentiam  
constare non potest. Ergo oportet  
humoris, quo veluti vehiculo vit  
tur, promptuarium & officinan  
lasam esse: nam vnde pustulæ, vlce  
ra, tophi & articulorum dolore  
nascerentur, incolumi existente  
hepate, quod in tali morbo affic  
est necessarium: Dicemus itaque  
Hispanicam scabiem morbum esse  
contagiosum, ex vitati hominis  
aut mulieris contactu contractum  
primum hepar, deinde reliqua  
corporis partes ita labefactantem  
vt pessima eadēque diuturna  
symptomata procreet, & certa pro  
priaque curatione geat.



*De luis venerea causis.*

C A P. L.

**H** Vius perniciosi morbi, &  
Deo opt. maximoque inor  
talibus propter sordidam &  
corpus enervantem Venerem, im  
missi

missi ; causæ ( vt aliorum morborum ) sunt duplices, procatarctica scilicet & corporeæ. Procatarctica sunt , mulieris aut hominis infecti contactus, aut inspiratus aër à pessima illa qualitate conspurcatus, quæ corporeas mouentes & exagitantés, huius perniciosi mali sunt effectrices, neque nisi eæ priores concurrant talis excitabitur morbus, ephemera febris morè, cui maximè proprium est vt à prægressis causis emanet.

*Gal. 1.  
de aff.  
feb.*

Et quamuis in morbis aliquid diuinum esse statuerit Hipp. hunc tamen cæcæ & latentis proprietatis non esse participem, & morbi constitutio, & ipsa curatio aperte demonstrant. Immundæ igitur mulieris concubitus, aut infecti hominis complexus, ex quo primum pudenda, deinde aliæ partes, tum internæ, tum externæ noxam subeunt, causa est procatarctica, vt diximus. Ad hunc morbum viri tum propter cæcā tempera. tum collis veniarum & arteriarum ampli-



438 *De Tumorib. præter naturam.*  
tudinem, & vniuersi corporis rari-  
tatem, foeminis, sunt procliuior-  
es, præsertim quando illorum na-  
tura est maximè petra. & crebra  
Veneri allucta. Mulieres quamuis  
sint pituitosæ, cùm denso sint vte-  
ro, & corporis poros arctiores ha-  
beant, menstruisque purgationibus  
à multis recrementis corpus ex-  
purgent, tardiùs in hanc labem  
corruunt.

Ad hanc subeundam noxam se-  
xus vtriusque dispositio est maxi-  
mè necessaria, cùm actus actiuorum  
non fiant nisi in patiente disposito,  
& passi dispositio ( vt à Gal. tradi-  
tum est) sit causarum duplum. Igi-  
tur vt ex contactu, frequèti contu-  
bernio, crebro osculo, psora, lepra,  
elephas, pthoë, ophthalmia emer-  
git, ita ex his causis hanc perni-  
ciam oriri, nemo ibit inficias. Adde  
quod huic nefando malo vitiatum  
semen, quemadmodum & aliis  
multis occasionem suggerit: huic  
etiam morbo non exiguam ansam  
suppeditat vitiosum nutricis lac,  
quod

quod cum maligna qualitate sit præditum lactantem puerum coinquinat, qui etiam infectus ore suo vicissim sanam mulierem labefactabit.

Corporeæ causæ sunt humores in corpore contenti, à causis externis malignæ qualitatis participes redditi, (inter quos humor pituitosus huic morbo ansam magis suggerit) quod verum esse ipsa curatio ostendit; qui ab affecto hepate geniti corporis functiones lædunt resæuorum symptomatum sunt causæ, vt pustularum, capitis & articularum doloris & prauorum ulcerum, ossium cariem nonnunquam sibi copulantium. Quippe quod varia pro vario humorum dominio excitentur symptomata.

Quare mihi maximè delirare visi sunt, qui in vniuerso corpore diffusum, illudque tegentem panniculum carnosum, constituunt, à quo huius perniciosæ labis scaturiginem emanare somniarunt, Partho-  
nopeum externarum partium his

440 *De Tumorib. præter naturam.*  
per continuationem alteratis, esse  
quàm maximè proprium, & non  
internarum. Quod somnium si ve-  
rum esset, sequeretur leuissimi  
etiam præfidiis hunc, tametsi inue-  
teratum & corpori mordicus hæ-  
rentem, posse depelli. A Gal. enim  
traditum est, externarum partium  
morbos facilè à rudi etiam medi-  
co posse deprehendi, & multò fa-  
ciliùs quàm internarum profligari.  
Sed quantum curationi reluctetur  
quæ annotina aut altas radices egi-  
t. Hispanica scabies, sunt sibi conscij  
qui ab hac grauitè infestati, open-  
t. à Medico frustra efflagitant. Neque  
medicinam facientes viri celebres  
in curatiua methòdo exercitatissi-  
mi, ignorant quàm agrè illam pro-  
pullent.

Statuemus igitur huius morbi  
prima seminaria, contagione quadam  
in externis corporis partibus esse  
còsperfa, sed neq; ægroti, neque cu-  
ranti medico negotiù faceßere, nisi  
hæc vitiata lues, internis visceri-  
bus, hepatis præsertim & venæ cauæ

con-

lib. 1.  
de lo.  
aff. c. 1.

communicata, illa labefactarit:  
 quorum vitium grauium sympto-  
 matum, miserum excruciantium  
 corpus, est propago. Varios in hac  
 exitiosissima lue ex variis causis  
 excitari morbos, quis negat? Pri-  
 mum ex sordido mulieris concubi-  
 tu, initiū ducens in pudendo, pustul-  
 las, vlcuscula mali moris & curatu  
 contumacia excitat. Vapor insuper  
 venenatus, per cauum pudendi du-  
 ctum, in venam cauam, maiorem-  
 que arteriam se insinuans, sangui-  
 nem & spiritum corrumpens, in  
 inguine bubonem erumpere facit:  
 affectis hoc venenato vapore semi-  
 nalibus vasis, iplisque renibus, go-  
 norrhœa se prodit, atque olidam,  
 turpissimamque saniem cruetat.  
 Affecto iecore vniuersus sanguis  
 polluitur, quo venæ participes, in  
 artus & omnes corporis partes  
 disseminatæ, liuidas & rubentes  
 sæpe pustulas, & easdem duras,  
 nonnunquam crustosa, phagedeni-  
 ca & exedentia vlcera, nonnun-  
 quam herpes in biliosis præset-

T 5 tim,

tim, procreat; Cancroſa & medica-  
mentis non facile cedentia, in me-  
lancholicis; leuiora, ſed ſordidiora  
& putri humore ſcatentia in pitui-  
toſis, crebriora & carbunculi in-  
ſignem referentia in ſanguineis.  
Omnia labra prædura habent, tu-  
mentia & inuerſa, tam enim ho-  
rum malignus & peruicax eſt hu-  
mor, vt ſæpe nullo in oſſa tegeretur  
carne, manifeſto vlcere, ipſa tene-  
la, & dura peruadat, illius fulgur  
more ab Ariſt. in ratiociniis me-  
theorologicarũ impreſſionum de-  
ſcripti, quod intacto forulo, enſe  
eliquat, & intacto maſſupio au-  
rum & argentum liquefacit. Cũ  
autem cerebrum, ſupremamque  
corporis arcem obſederit, multum  
pro partis temperamento pitui-  
colligitur putredine ſalſedine  
adepta, quæ ſi in capite retineatur  
acerbos dolores commouet, noſ  
magis quàm interdium homines  
moleſtantes, inter perioſtium  
cranium contenta tumores magis  
doloris haud expertes facit. In a  
t


rus aut articulos deturbata , maximos cruciatus, scirrhusos tumores, præduros tophos minimè indolentes excitat , quia veneni maleficio est perfusa , & insignis acrimoniæ particeps. Interdum non tam acris & mordax cutem ipsam non exedit, sed ad pilorum radices dispersa , horum effluuium concitat , vt non solùm capitis , sed ciliorum, palpebrarum & barbæ pili decidant ; quorum casus hominis faciem & caput maximè deturpat.

Nemo itaque inficiabitur , hanc luem venenosæ qualitatis esse participem, quæ per vniuersum corpus disseminata, non aliter quàm quæ à rabidi canis morfu infertur, serpit. hæc in corporis penetralibus sæpe latitās, longo tēpore silet, & à causa interna vel externa exagitata, se prodit, vt de exanthematis dictum est. Quæ ab inquinato concubitu emergit , & obscœnas partes labe factauit, deterrima exitiosissimaque est. Cæteræ sunt leuiiores , & curationem minus respuentes.

## C A P. LI.

**H** Vius pernicipiei notæ ex lotio non sunt petendæ : sed ex obscœnis potissimum partibus , si ex sordido concubitu sit contracta, quæ faciliè in totum corpus serpit , & vlcera præputio & glandi communicat, bubonibus sæpe, aut venereæ gonorrhœæ copulata. Recēs curationi minus resistit, sed veteri magis contagiosa , quæ cum perseverat corpus cacochymicum, macilentum , frigi. atque humidū reddit, vt luculenter ipsa curatio testatur. Hunc etiā morbum ostendit vehemēs capitis dolor nocturnus potiùs quàm diurnus, ster- ni omoplatarum & originis spinalis medullæ , pertinax coxendicis dolor, brachiorum, femoris & ribiꝑ exostoses, capitis & pubis latæ pustulæ; capitis aræ, capillorum defluuium , volæ manus & pedum rhagades serpiginosæ , in palatum, colu

columellā & gargareonē continua defluxiō, quæ dum acris & mordax est, palati vel narium ossa cariōsa efficit. Hinc fit vt ij olidam animam habeant, & sæpe rauca raui detenti cōtinua expuitione veluti ptylismo detineantur. Adde quod post morbum contractum subtristes sunt. Cui etiam maximam lucem affert patrum semen, cuius probitatem, aut vitium in filios & nepotes transire, quis dubitat? Quo plura apparent symptomata, eo maiorem materiei copiam promittunt. Non omnes notæ superius recensitæ, in hoc morbo laborantibus sunt perquirendæ, sed aliquas apparere sufficit.



*De luis venereæ curatione.*

C A P. LII.

**I**N huius morbi curatione medicos etiam doctos parum esse concordēs, ex illorum monumentis constat. Nam alij curationem



446 *De Tumorib. præter naturam,*  
rationem quæ fit hydrargyri inun-  
ctione parum stabilem, sed fucatam  
& corpori maximè officientē scri-  
bunt, & qui hac vñ sunt in subuer-  
sionem sua radice deteriore lap-  
sos affirmant. Alij nondum satis  
cogniti morbi incognitam esse cu-  
rationem tradunt. Alij Guiacini  
ligni, alij sarzæ pariliæ, aut  
chyuræ decocto, hunc profligare  
astruunt. Alij constitutio sub cono-  
pæo ægroto, suffitibus propulsa-  
re student. Quorum varia opinio  
multorum animos anxios atque  
incipites in hunc vsque diem ita  
detinuit, vt affirmare sint coacti  
hunc affectum à cæca qualitate ortū  
non posse nisi præsiidiis à tota sub-  
stantia in corpus agentibus curari.

Nos verò nulli hæresi addicti  
liberè pronunciare possumus, hunc  
vera & certa methodo, ab expe-  
rientia profecta, posse depelli, ser-  
uatis his legibus, quæ ab Hippo-  
cratē traditæ sunt. Is igitur morbus præ-  
cautione & curatione egens, me-  
dicum sollicitat, vt ægroto omni-

bus

bus rebus quæ hunc excitare possunt, interdicat, quales sunt quæ hanc perniciosam corpori contagionem inferre solent, ut ipsæ sordidæ mulieris concubitus, incautaque victus ratio; nihil enim citius & vehementius hanc labem ipso inquinato concubitu accersit, ex quo magna (quæ ægrè refarciri potest) ruina corpori accedit. In illos profectò qui sibi præcauere nolunt, quadrabit peruulgata parcemia, *Noceat empta dolore voluptas.* Ipsa verò curatio 4. perficitur scopis.

Primus in decenti rerum non naturalium usu versatur. Inter quas aër iure optimo primas obtinet, qui pro varia temperie variis etiam modis corpus afficit. A quo, cum familiaris sit nostri corporis hostis, sumendam esse indicationem ex Hip. sententia in meth. curatiua scriptum reliquit Galenus. Versabitur itaque ægrotus in aëre moderatè ca. & sicco, natura, vel arte tali. Habitationes frigidæ & humidæ, statariis cœnosis aquis cōtiguæ,

448 *De Tumorib. præter naturam,*  
tigua, ipso præsertim autumno &  
vere sunt perniciosæ, à corruptis  
vaporibus labefactatus aër pere-  
grinas qualitates (cucurbitæ more)  
inscipiens, varias ægritudines pro-  
creat, & vt frigiditate sua corpori  
hoc modo laboranti officit, ita sua  
caliditate natiuum calorem dissi-  
pando noxius est. Frigidum lucu-  
lento ex odoratis lignis & herbis  
igne, calidum frigidis, vt rosis,  
violis, fantalis, oxycrato, pampino-  
rum foliis temperabimus. Ab au-  
stro corpora dissolvente, caput  
grauante, & vertiginem inducente  
cauendum. In siccitatem tempe-  
ratam inclinans aër salubris cense-  
tur. Cibi & potus maxima est ha-  
benda ratio, cùm ab his variis mo-  
dis corpus immutetur. Ex his enim  
constamus ex quibus nutrimur. Pa-  
nis ex defæcata filigine, non om-  
nino sublatiis furfuribus paratus,  
fermento saturatus, modico sale  
perfusus & mediocriter coctus, la-  
boranti administrabitur. Cuius re-  
pletionem ventriculo onerosam  
non

non probo. Carnibus ab ortu parum distantibus, quia mucoso humore scatent, neque vereribus excremētosis, & corpus modicè alentibus, sed atate & substantia mediis alatur. Quæ enim larga humiditate sunt præditæ, pituitam adaugent, quæ sicca & exicca, coctionis operosæ sunt & atrabiliaria. Quare agnorum, porcorum, piscium, nisi saxatiliū, qui potius, sunt gustandi quàm comedendi, herbarum crudarum, boum, vaccarum, hircorum, aprorum, ceruarum, damarum, antiquorum leporum, aquatiliū auium, cochlearum, leguminum, brassicæ, bulbosarum radicum, iuglandium, sinapi, erucae, acrium ac linguam ferientium rerum substantia noxia existit. A vino recentī, dulci & turbido, antiquo, generoso, & parum diluto abstineat, consistentia robore & calore mediocri fruatur. Ouatremula & recētia concedentur. Panis lotus, ex gallinis aut capis iuscula, & horū substantia, veruecinæ, vituli

*Gal. 8.  
meth.*

450 *De Tumorib. præter naturam.*  
vitulinæ, attagenarum, perdicum  
montanarum auium carnes deligē  
dæ, quibus non admodum reple  
ri, sed cum aliqua vberius edendo  
appetentia à mensa abire commo  
dissimum erit. Amygdalæ, qui  
vaporulentæ sunt, & dolenti ca  
piti insidiantur, cum lupulo sali  
ctario noxiæ, noxius itidem zi  
vsus, cinamomi sapor vt ori gratus  
est, ita ventriculo commodus. Ac  
idis insuper rebus, aceto præser  
tim neruosum genus ferienti, par  
cet. Fructus recentes & horario  
(præter vuas passas, mala cydonia  
pyra in secundis mensis assa & sac  
charo aspersa) vitabit: quippe  
quod humidi fructus aquosam ali  
moniam corpori suggerunt. Pom  
neruis inimica, tanquam acutum  
scopulum fugiet. Ciborum in mē  
sis non sit præposterus ordo, ne  
que varij sint qualitatibus, & sub  
stantiis inter se pugnantes. Sit cœ  
na prandio frugalior, cibum den  
tibus optimè terat. In plenitudine &  
inanitione, seruanda est medio

critas

critas, nam ut plenitas vires corporis grauat, & obstructionum est causa perspicua, ita alimoniae defectus corpus demacerans, tabem inducit. Statis & assuetis diei horis comedendum suademus. Cum enim bona fruimur sanitate, mutari non debet consuetudo, multo minus in ipso morbo. Sit alius suppositis clysmatis, aut balanis, vel propinatis solutiuis medicamentis laxa. A longo somno arcendus erit, quod corpus nimium humectet, ut iuges vigiliae hoc resiccant, ita diurnus somnus mox à prandio, aut coena factus destillationes promouet, nisi doloribus confectus vigilare nocte cogatur. Sanctè & religiosè præclara Hipp. sententia seruetur, labor, cibus, potus, somnus, venerem tolle, omnia moderata. Et cum animi pathemata, Galeno autore, mutant corpus, ab ea quæ est secundum naturam consistentia, his erit parcendum, ex quorum contubernio est ira, tristitia, timor. Prosequen

452 *De Tumorib: præter naturam,*  
sequendum quæ animam exhilarare possint & mentem à curis repurgare. Coitus est omnino aduersus, quod si cum immunda muliere se homo, aut cum labefactato homine mulier exercuerit, mox posca genitales partes probe eluantur.

Secundus scopus nos vocat ad noxij humoris concoctionem, qua tentata meliùs postea is euacuabitur. Sed antequam in hoc negotio vtile medicamentum præscribamus, redundantis humoris natura erit contemplanda; nam si laborantis corpus plethoricum nobis appareat post suppositum clysterem, vel ex catholico, aut medullæ cassiæ fistulæ propinatam potionem, venis turgentibus tumores, pustulas & vlcera conspiciamus, tundenda erit: media, iccoraria aut cephalica, si dolore tentari partes superiores proferat agrotus. Mittetur tanta sanguinis copia, quantam vires, ætas, aëris conditio perferre poterunt.

Quod

Quod si tali morbo distorqueatur mulier, cum mensium suppressione secta prius vena poplitis aut malleoli interna, menses mouebimus, & si venæ sectionem aliquid præpediat, coxarum radicibus affigendæ erunt cum multa flamma cucurbitulæ; hoc verò agendum paulò ante tempus eruptionis menses. Quod si biliosus humor morbo ansam suppeditet, & sanguini sit mixtus, quæ diximus agenda erunt, parcius tamen mittendus erit sanguis: si pituitosus aut melancholicus, venæ sectio minus erit ex usu, potissimum quando hi humores à sanguinis natura sunt abalienati. Et si multæ pustulæ in corpore disseminatæ conspiciantur, & tenuium humorum redundantia, ac in corpore præualeat caliditas, erit sequentibus vtendum.

℞. Rad. rusci, asparagi, graminis, acetosæ sing. ℥. j. lapath. acuti cum radicibus, scabiosæ, vtriusque cichorij cum radicibus, vtriusque bugloss. herb. capill. co. sonchi summi



45 4 *De Tumorib. præter naturam*  
summitatum lupuli (si absit caput  
dolor) thurionum asparagorum  
sing. M. j. sem. melonum, cucurbita  
citri & endiuix sing. ʒ. j. β. passu  
à vinaceis repurgatarum, prun  
rum dulcium, iuiubarum, sebeste  
sing. pa. xxx. glycirrhiz. recentis &  
rasa ʒ. j. sem. anisi, fœnic. sing. ʒ. j.  
florum buglos. viol. sing. p. j. fia  
decoct. in aqua hordei perfectè co  
cti, cape de col. qu. ʒ. In quibus di  
sol. syr. de fumo terræ & de succo  
endiuix sing. ʒ. iij. β. fiat syr. de  
coctionis mediæ clar. & arom. cum  
pulu. diamarg. frig. sine moscho  
& triasant. sing. ʒ. ij. capiat in 4  
dosibus de mane. Ægotanter  
postea in eum qui sequitur modum  
purgabis.

℞. Rhabarb. opt. ʒ. j. β. spic  
nardi ʒ. vj. Infundantur in ʒ. iij.  
apozematis, præscripti expressio  
ne facta diss. catholici vel tripho  
rix persicæ ʒ. β. diaprunis laxa  
tivi ʒ. ij. syr. ros. solutiui ʒ. j. fia  
potio danda post præcedentis sy  
rupi vsum.

℞. Co

℞. Conseruæ rosarum & rad.  
bugloss. sing. ʒ. j. β. pul. triasant. ʒ. j.  
cum sacch. fiat bolus qui detur se-  
quenti die horis duabus ante pran-  
dium. Superâte in corpore pituita,  
hoc modo purgandum erit corpus.

℞. Elect. diacarth. & indi maio.  
sing. ʒ. ij. syr. ros. solut ʒ. j. aqua-  
rum bethon. bugloss. sing. ʒ. ij. mis-  
ce, fiat potio, quæ detur ante omnia  
cum custodia, & artis decenti regi-  
mine.

℞. Rad. enulæ cāp. acori vulga-  
ris, sing. ʒ. j. corticis citri sicci, radi-  
cis galangæ crassioris sing. ʒ. β. her-  
modactylorum (si articulorum do-  
molestetur) ʒ. β. bethonicæ, melissæ,  
chamepyteos, chamedryos, pri-  
mulæ veris, sampfuci, trifolij, scor-  
dij, fumariæ, mercurialis sing. M. j.  
caricarum pinguium, passularum à  
gigartis repurgatarum pa. xx. gly-  
cirrh. recent. & rasæ ʒ. j. Agarici in  
ligatura positi ʒ. β. Medullæ car-  
thami contusæ & foll. senæ, po-  
lypodij querni recentis sing. ʒ. ij.  
florum stœchad. rorismarini &  
bugloss.

456 *De Tumorib. præter naturam,*  
buglos. sing. p. j. fiat decoct. cape de  
col. lb. j. b. diss. mellis ros. col. syr. de  
stæchad. sing. ʒ. iij. β. fiat Apozema  
clarificatum, aromatizetur cum  
pul. diambrae & diarhod. sing. ʒ. i  
capiat in 4. dosibus de mane. Quod  
si morbus sit contumax & labo-  
rantis vires validæ, loco agarici  
adiiciendæ erunt ʒ. ij. turbith elect  
& gummosi in sero lactis caprin.  
prius macerati, zingiberis & salis  
gemmei sing. ʒ. vj.

℞. Elect. de citro solut. ʒ. ij. ca-  
tholici ʒ. ʒ. rhubar. in aqua endiuia  
& modico vini albi infusi & ex-  
pressi ʒ. iij. cinamomi eadem arte  
præparati ʒ. vij. syr. ros. solut. ʒ. j  
aquarum maioranæ & buglos. sing  
ʒ. ij. misce, fiat potio.

℞. Conseruæ florum stæchad  
ʒ. j. theriacæ veteris ʒ. iij. sacch-  
parum. fiat bolus qui detur in cra-  
stinum horis 4. ante prandium. Me-  
dicatæ potionis loco sequente  
pillulas deglutiet.

℞. Massæ pil. aggreg. maio-  
de agarico, sing. ʒ. ʒ. massæ pillu-  
cochi

cochiarum ℥. j. malaxentur cum aqua buglosi, fiant catapotia 7. quæ deglutiet hora secunda post mediam noctem leui ccena præcedente. Ægrotum in quo atra bilis vincit sequenti modo purgabis.

℥. Diasennæ solut. 3. iij. syr. viol. 3. j. β. decocti foliorum buglos. borraginis & endiuivæ 3. iij. misce, fiat potio.

℥. Corticis mediani fraxini, tamariscis rad. cappa. sing. 3. j. corticis ebuli 3. vj. corticis citri sicci 3. β. vtriusque buglos. vtriusque cichorii cum toto, fumaricæ, mercurialis, pimpinellæ, scabiosæ, summitatum lupuli, scolopend. sing. M. j. prunorum dulcium, passularum à gargaris repurgatarum, sing. pa. xx. pulpæ tamarindorum electorum 3. j. sem. anisi, feniculi sing. 3. j. sem. melonũ, cucurbitæ sing. 3. ij. glycirrhizæ contusæ 3. β. folliculorum sennæ, polypodij querni recentis sing. 3. ij. Epithymi cretensis 3. β. florum buglos. viol. sing. p. j. florum thymi 3. j. fiat decoctio in duabus partibus  
V aquæ

458 *De Tumorib. prater naturam,*  
aquæ fontanæ & vna aquæ bugloss.  
facta col. ad lb. j. ß. diss. succi pomor-  
um dulcium defæcati ʒ. iiij. sacch.  
albiss. ʒ. iij. fiat apozema clar. &  
aromat. cum pulu. elect. diamarg.  
frig. & diarhod. sing. ʒ. ij. capiat in  
4. dosibus de mane.

℞. Confectionis hamec. ʒ. ij.  
rhabar. in aqua bugloss. infusi &  
expressi ʒ. j. ß. cinamomi eodem  
modo præparati gr. vj. syr. ros.  
solut. ʒ. j. ß. decocti præscripti apo-  
zematis ʒ. iiij. fiat potio danda post  
apozematis vsum.

℞. Conser. viol. flor. borrag. sing.  
ʒ. j. ß. pulu. elect. triasant. ʒ. j. cum  
saccharo, fiat bolus pro sequenti  
mane. Loco medicatæ potionis se-  
quentia catapotia instituere pote-  
rimus.

℞. Mass. pil. de fumo terræ &  
indarum sing. ʒ. ij. trochiscorum  
alhandal. ʒ. iiij. malaxentur cum  
aqua bugloss. fiant catapotia 7. de-  
glutiet hora prima post mediam  
noctem parca cœna præcedente.

℞. Theriacæ veteris & probatæ  
ʒ. j. ß.

3.j. β. cum saccharo, fiat bolus, detur 4. horis ante prandium. Purgato vniuerso corpore, ad particulares euacuationes transeundum erit, quæ exercentur errhinis, apophlegmatismis, gargarismis mariscas aut mentes cientibus, medicamentis, aluum laxantibus & mouentibus sudores. Est tamen summopere cauendum ne internas oris partes exulceratas gargarismis, aut apophlegmatismis defatigemus, neque laborantibus naribus errhina præscribamus, quippe quod hæc medicamenta in affectas partes humores euocantia, illas exasperabunt, & plus noxæ quàm vsus inferent. In sequentem igitur modum errhinum parabimus.

℞. Succi rad. betæ rubræ, sampsi-  
ci deputati, sing. ʒ. iij. succi anagal-  
lidis cæruleum colorem procrean-  
tis cum vino albo extracti ʒ. iiij.  
Mannæ granatæ & recentis ʒ. j.  
mel. ros. col. ʒ. j. β. misce, fiat errhi-  
num. traiciat mane tepidum aluo  
exonerata, ore aqua pleno, per na-

460 *De Tumorib. præter naturam,*  
res illas optimè emungendo , quo  
etiam faucibus & gargareone exul-  
ceratis vti citra ægroti dispendium  
poteris.

℞. Rad. piretri, piperis nigri, gra-  
norum vuæ tamineæ sing. ʒ. j. nucis  
moschata, zedoariæ sing. ʒ. ij. pul-  
uerentur & cum modica cera alba,  
fiât pastilli, masticet vnum ieiunus  
expuendo quod dissoluitur.

℞. Rad. glycyrrhizæ ʒ. j. foliorum  
maioranæ, hyssopi sing. M. j. carica-  
rum pinguium , passul. ab acinis  
mundat. sing. p. a. xx. sem. nigellæ &  
vrticæ contusi sing. ʒ. ij. florum ro-  
rismarini, centaurij minoris, sing. p.  
j. fiat decoct. in aqua hordei integri  
& in col. qu. v. diss. mellis ros. col. ʒ.  
ij. oxymelitis simpl. ʒ. j. β. fiat garga-  
rismus , gargarizet longo tempore  
ante cibum. hæmorrhoides glandi-  
bus ex aloë, saponé gallico, bubulo  
felle sollicitandæ erunt, & turgen-  
tes phlebotomi cuspide, vel admo-  
tis hirudinibus aperiendæ , vt san-  
guis ater euacuetur. Menstruas pur-  
gationes sequēti potu prouocabis.

℞. Rad.

*Liber III. Cap. LII. 461*

℞. Rad. petro. apij, valerianæ, & fæniculi sing. ʒ. j. calamenti, pulegij matricariæ, arthemisię, nepetę, sing. M. j. hermodactylorum ʒ. β. glycyrrhizæ recentis ʒ. β. sem. nigellæ romanæ, dauci sing. ʒ. ij. florum genistæ, cicerum nigrorum, sing. p. j. fiat decoct. & in col. tb. j. diss. oxymel. diuretici & syr. de duab. radicib. cum aceto sing. ʒ. ij. β. capiat in tribus dosibus de mane concessotrium horarum à sorbitione somno. Deiectas principum partium à morbi inclementia facultates remediis sequentibus firmabimus.

℞. Conser. rosarum, rad. buglossi. sing. ʒ. j. conser. florum borrag. & florum cichorij sing. ʒ. vj. myrobalanorum emblicarum, sacch. conditarum & vino albo lotarum nu. j. pulu. elect. diamarg. frig. sine moscho ʒ. iiij. pul. diarhod. ʒ. j. syr. de pomis bene olentibus q. s. ad incorporandum, fiat opiata, de qua horis duabus ante prandium capiet ad quantitatem castanæ. bibat postea cochlearia duo vini albi,

V. 3 aut



462 *De Tumorib. prater naturam,*  
aut gilui aqua melissæ vel bugloss.  
diluti. Vel sic.

℞. Pulu. elect. triafant. ʒ. iij. pulu.  
elect. diamarg. frig. ʒ. j. pul. diarhod.  
abb. ʒ. ij. conseruæ florum cichorij  
& borraginis sing. ʒ. iij. sacch. diss. in  
aquis endiuia & bugl. q. s. fiat elect.  
in lozangiis ponderantibus ʒ. ij. β.  
capiat vnam quolibet mane horis  
duabus ante prandium. Iniiciendi  
erunt per interualla molles clyster-  
res, quibus alius lubrica seruabitur.

℞. Altheæ cum rad. malu. viol.  
branchæ vrsinæ, atriplicis, parietar-  
iæ, foliorum bugloss. fumariæ, si-  
clæ, mercurialis sing. M. j. sem. lini,  
maluæ sing. ʒ. j. caricarū pinguium,  
prunorum dulcium sing. pa. xxx.  
sem. cartham. contusi ʒ. j. β. sem. ani-  
si fæniculi sing. ʒ. j. florum buglo.  
viol. nympheæ sing. p. j. fiat decoct.  
in aqua hordei & in col. quart. v.  
diss. diaprun. solutiui ʒ. β. catholi-  
ci ʒ. vj. olei violati ʒ. iij. mellis  
viol. sacch. rub. succi mercurialis  
sing. ʒ. j. β. salis co. ʒ. j. fiat clyster  
detur exposcente necessitate. Non  
minus

minus proderit solu. medicaminis  
sequentis vsus.

*R.* Catholici  $\mathfrak{z}$ .iij.confec̃t.hamec.  
& diaphæn.fing. $\mathfrak{z}$ .ß.rhab.aqua en-  
diuię irrorati  $\mathfrak{z}$ .iij.cinamomi grana  
xv.syr.ros.solut.q.s. ad incorporan-  
dum, fiat opiata de qua cum opus  
erit capiet circiter  $\mathfrak{z}$ .j. per se, vel  
diss.in  $\mathfrak{z}$ .iiij.decocti foliorum bugl.  
borrag.& cichorij.Vel sic pro mol-  
lioribus & debilioribus naturis.

*R.* Foliorum fennæ orientalis  $\mathfrak{z}$ .  
ß. polypodij querni recentis  $\mathfrak{z}$ .iij.  
sem. anisi  $\mathfrak{z}$ .ß. florum viol. buglos.  
sing.p.j. fiat decoct.in iure galli ni-  
gri veteris,de col.cape  $\mathfrak{z}$ .iiij.in qui-  
bus diss.mannæ granatæ  $\mathfrak{z}$ .j.syr.ros.  
solut. $\mathfrak{z}$ .j. ß. misce, fiat potio, detur  
urgente necessitate. His peractis  
mouendi erunt sudores linimentis,  
emplastris,ceratis,suffitibus,aut in-  
stituta ea victus ratione ex Guaia-  
cini-ligni decocto, sarzæ pariliæ,  
vel chinnae, vt humores per totum  
corporis habitum fusi eliciantur:  
& si quæ sint pustulæ aut tumores  
externas partes defatigantes exic-

464 *De Tumorib. præter naturam,*  
centur & digerantur. Curandi igitur erunt ægroti in eum qui sequitur modum.

℞. Axungia suillæ non salitæ à membranis repurgatæ (malè enim à nonnullis ab ignis calore eliquatur) & per colum medicum transfusæ lb. j. hydrargyri cū prædicta axungia extinctæ ℥. vj. ab hac quàm à quavis alia meliùs retinetur, thuris, mastiches, resinæ pini sing. ℥. j. lithargyri auri ℥. ij. myrrhæ electæ & styracis liquidæ sing. ℥. j. cerusæ in aqua rosarum lotæ ℥. vj. olei de baccis lauri ℥. iij. olei rosati ℥. iij. Ducantur probè in mortario marmoreo & pistillo baxeo, fiat linimentum, illinantur omnes corporis partes, inguina præsertim ante focum, præter caput, pectus, inferiorem ventrem: cooperiatur postea plus solito corpus, quiescat donec sudor eruperit. Quod si ob cutis densitatem & pororum obstructionem sudare nequeat, bubulas vescicas, calida aqua refertas, sub alis reponemus, aut inguinibus admouebimus,

bimus, & calidos lateres pedibus apponemus. Si dolor citra pustulas, iuncturas & caput plurimū tentet, sequens linimentum ex usu erit.

℞. Vnguenti enulati siue pforici ℥. ss. vnguenti agrippæ & marciati sing. ʒ. iij. argenti fusilis cum prædictis vnguentis aut limonum succo extincti ʒ. iij. olivani, mastiches & myrrhæ sing. ʒ. j. ss. sublimati ʒ. ij. terebinthinæ ʒ. j. lithargyri auri ʒ. x. olei cham. olei de spica sing. ʒ. iij. misceantur simul, fiat linimentum.

℞. Axungie gallinæ, anatis, anseris sing. ʒ. ij. Medullæ cruris vituli, vaccæ sing. ʒ. j. ss. axungie porci, ut dictum est) præparatæ ℥. ss. resinæ pini, terebinthinæ cum aqua vitæ lotæ sing. ʒ. ij. lithargyri auri, thuris, mastiches, sing. qu. ss. hermodactylorum subtiliter pulueratorum ʒ. x. euphorbij, in natura valida ʒ. ij. in debili ab illo abstinendum erit, styracis, calamitæ liquidæ sing. ʒ. vj. olei lunbricorum, vulpini sing. ʒ. iij. olei chamom. fæcis olei de lilio sing. ʒ. ij. Ducantur

V s

opti

466 *De Tumorib. præter naturam,*  
optimè in mortario marmoreo, fiat  
linimentum. Non est cum corpus  
inungimus calefaciendum vnguen-  
tum, sed tantum manus.

Aliud ad euocandos humores ex  
internis partibus ad externas.

℥. Butyri recentis sine sale ℥. iij.  
axungia suilla non salita à pelli-  
culis repurgata ℥. x. styracis liqui-  
da, ladani puri & lithargyri auri  
sing. ℥. j. β. hermodactylorum, ari-  
stolochia rotunda sing. ℥. j. eu-  
phorbi ℥. ij. argenti fusilis cum  
suo liquore extincti ℥. β. In corpo-  
re robusto olei petrolei penetra-  
tionis causa ℥. ij. olei de lateribus,  
irini & chamom. sing. ℥. iij. Agiten-  
tur diutissimè in mortario marmo-  
reo, fiat linimentum. Sunt qui his  
linimentis theriacam addunt prop-  
ter humorem peruiacem & vene-  
natum, à quo hunc morbum scatu-  
rire arbitrantur.

Ex his prouidus & solers medi-  
cus amplissimam linimentorum su-  
pellectilem contemplata priùs la-  
borantis natura, ætate, cœli condi-  
tione,

tionem, & corporis facultate sibi parabit. nam mollioribus corporibus & his quorum virium robur est imbecillum, minus fortia medicamenta sunt præscribenda, minorque hydrargyri & euphorbij quantitas. In his sat est extremas corporis partes inungere. horum autem linimentorum basis est axungia & ipsa hydrargyrus, quam argentum ob colorem & indefinentem motum, viuum vocant, in quo vegetus calor cum multo humore, sed tenaci motu ingenerat quietis nescium. Non oportet arbitremur linimenta hæc neotericorum esse inuenta, nam prisca & in curatiua methodo exercitati medici, his psoram & lepram frequenter expugnarunt. Cæcutiunt & hallucinantur qui hunc pessimum morbum sine hydrargyro depellere scribunt, nouam & tutiorem curandi rationem se nosse proferentes, & in mentis penetralibus absconditam seruantes, vana spe posteritatem lactarunt. Sed quantum sint à veritate abalienati sibi conscij sunt

468 *De Tumorib præter naturam,*  
qui in curandis multis hac dira  
labe detentis bonas horas successu  
fœlicissimo collocarunt. ij expe-  
rientia omnium rerum magistra,  
agnouerunt se hunc morbum sine  
hydrargyri sodalitis curare nequi-  
nisse, quamuis ex illius mala admi-  
nistratiōe multa corpori incom-  
moda suboriantur. Quis nescit ve-  
ratri, peplij, dendroidis, thymelæ,  
scammonij, antimonij intempesti-  
uum vsu, corpori maximè noxiū,  
imò lethalem esse? quæ suo tem-  
pore administrata, simul & probè  
castigata corpori plurimum pro-  
desse, quis negat? hydrargyrum  
plerique hac ratione damnât, quod  
sua frig. & hum. natium calorem  
& humores ita refrigeret, ut hos  
congelascere faciat, tremores insu-  
per, comitiales morbum, & huius  
materiæ fossiores & artifices tamer-  
si robustos, ad quartum vsque an-  
num incolumes permanere non si-  
nat, tremore magno omnes corpo-  
ris partes cōcutiat. Hoc verò ad me-  
tallorum omnium generationē esse  
dispo

dispositum tradit, cum omnibus se coniungat nemo inficiari debet, illorum generationi idoneam materiam præbere. Omnia metalla in fusile argentum coniecta, ut lignum in aqua supernatant, dempto auro omnium metallorum præstantissimo, quod magis reliquis amplexatur, quodque subsidet. Ex hydrargyro & armeniaco sale fit sublimatum ex quo varios faciei fucos mulieres parant. Ex sutorio atramento, sale nitro, & alumine pulvis ille mercurij ab aliquibus præcipitatum vocatus, paratur, cathetericum & ulceribus quibus hyperfarcosis est copulata, opportunum auxilium, ac aliis contumacibus & à lue gallica emergentibus cacœthe vocatis præsentaneum præsidium construitur, ut suo loco demonstrabitur.

Est hydrargyrus duplex, naturalis una, in fodinis mineralium reperta, irrequieta & more aquæ semper fluens, colore argenti obscuriore: factitia alia, quam ex minio



470 *De Tumorib. præter naturam,*  
minio in valis fictilibus certa arte  
fieri tradit Pedacius Dioscorides.  
Paratur etiam ex fuso plumbo, vel  
antimonio, quæ naturali vires im-  
becilliores habet, vt expertus sum.  
Tineas puerorum enecat ad duorū  
granorū milij pondus tradita. Scr-  
puli pondere agrè parturientibus  
prodest. Sublimatum præcipitato  
minus noxium, sed utroque mi-  
nus perniciofa hydrargyrus, quæ  
ponderosa existens minorem in ex-  
tis moram superioribus trahit. Sua  
grauitate ventriculum & intestina  
erodere scripsit Dioscorides. Cuius  
vestigia sequutus est Galenus, qui  
alibi sibi contrarius dicit se nullum  
hydrargyri periculum fecisse, ne-  
que quod interimat si deuoretur,  
neque vbi foris admota sit. lib. 4.  
cap. 18. tradit medicamenta quæ  
per erosionem interimant, ferro  
lapidique ignito similia esse, quæ  
à corporis nimirum calore huc  
perducuntur, velut chalcitis, mysi,  
fori, adhæc arsenicum, hydragynos,  
lithargyros, & alia innumera, cras-  
sarum

farum enim sunt partium id genus omnia, ac potestate calida, ac proinde temporis spatio accensa, per eam quæ est in arsimante mutationem, non aliter quàm lapis & ferrum ignitum, ventrem tū exulcerant, tum exurunt, cum scil. in corpus distribui præ gravitate non possint. Rursusc. i. lib. xi. de simpl. med. facult. ait. Igitur in iis quæ superius dicta sunt, haud ita multa particularia eorum quæ in materiis sunt conscripta à medicis, mihi ignota fuere, verùm operam dedi vt ipse per experientiam facultatem eorum cognoscerem. Quod si quid ignorabam, planè nec de illo quidquam conscripsi, haud credendum aliis censens, ne de vno quidem huiusmodi, quod certum habeam nonnullos multa mentiri. Ex his Galeni verbis luce meridiana clarius est, ipsum alioqui virum doctissimum, & in medica arte exercitatum, in eo sermone quem de hydragyro conscripsit parum sibi constare, & haud dubiè  
sui

472 *De Tumorib. præter naturam,*  
sui memorem non fuisse.

Auicennas 2. lib. tract. 2. hydrargyrum frigidam & humidam ordine 1. tradit. Cuius vapor facit accidere paralyfin & tremorem, & reëtat membra, & eius fumus auditum destruit, faciens oris fœtorem cum per ipsum transit. Petrus Apponensis conciliator dictus, Auicennæ sententiæ astipulatur. Paulus 7. lib. argentum viuum in medicinæ vsum non accommodari, quod venenum repræsentet, astruit, ipsum in cinerem mixtumque aliis speciebus colicis & ilcofis exhibuerunt.

Non desunt qui hydrargyrum non solum ord. 2. frigidam & humidam esse proferant, sed narcoticam & vehementi sua frigiditate dolores sopire etiam sæuissimos, bilisque ardores retundere maxime affirmant.

Quod si horum placita vera sint, quæ fieri potest, vt huius medicinali vfu Parthonopeus morbus profligetur: Nam quæ frigida sunt,  
& cras

& crassamentū substantiæ habent, potius apocroustica quàm epispastica esse censentur : & quo frigidiora, eo magis in corporis penetralia humores protrudunt. Sunt enim apocroustica epispasticis succos ex internis partibus ad superficiarias euocantibus plane cōtraria.

Hac igitur ratione inferamus oportet, hydrargyrum narcoticum medicamentum tunc morbum potius augere quàm curare, propulsis ad interiores partes humoribus, quos prouida natura internarum partium integritati consulens, ad partes minus principes, & corporis habitum detrudit. Et quamuis Aristotele teste, aërea & tenui substantia, quæ in partes corporis profundas se insinuat, sit perfusa, nihilo secius humores eliquare, & sudores ciere, hoc opus frig. vehementi impediēte præstare minimè potest, neque derelicta (vt aiūt) morbi radice, solis symptomatis opem ferre : cum sensus, & quotidiana experientia, non solum pat-

cata,

474 *De Tumoribus præter naturam,*  
cata, ex huius vnctione, sympto-  
mata, sed morbum planè auulsum,  
neque reuirescentem, aut recur-  
rentem, testentur. Infirmam pro-  
fectò mentem habet, qui demon-  
strationem contra sensus iudicium  
quærit.

Quod autem tremores, paraly-  
sin, creber illius vsus exciter, hoc  
non frigiditati, sed potiùs calidita-  
ti, per accidens morbos frigidos  
procreanti, feramus acceptū oportet.  
Nonne generosum vinum, quod  
ca. tertio ordine est, resolutionem,  
comitalem morbum, & sæpe apo-  
plexiam, frigidas atque humidas  
ægritudines parit? Quis nescit po-  
dagras, arthritides crebro gilui &  
tenuis vini potu commoueri? Te-  
stis est Burdegalenſis plaga, in qua  
innumeros ob vini maximè tenuis  
vsum podagricos comperies. Sic  
hydrargyrus ca. venenatæ qualita-  
tis particeps, neruorum & cerebri  
calorem ita deiicit, vt illarum par-  
tium concoctrice facultate labefa-  
ctata, morbi frigidi suboriantur,  
liuidi

liuidi & tremebundi efficiantur dē-  
tes , ipsaque anima olida reddatur,  
cum magna pituitæ expuitione &  
oris vlceribus.

Concludamus oportet, Galenū,  
Paulum, & alios bonos autores se-  
quuti,hydrargyrum 2.ordine com-  
pleto potius calidam quàm frigi-  
dam esse,cum ab effectis,Gal.anto-  
re,in nostra corpora facultates me-  
dicamentorum deprehendantur, &  
hanc curationis huius morbi au-  
torem & opificem præcipuum  
esse, quæ commodè suillæ axun-  
giæ aut butyro miscetur, tum vt  
extinguatur, & promptius & mul-  
to melius suum munus exerat,tum  
vt ex harū rerū miscella extincta,  
optimè retineatur, & in penetra-  
lia corporis se probè insinuet.Præ-  
terea ab omnibus rationalibus me-  
dicis est receptum axioma, cura-  
tionem per contraria fieri, si hy-  
drargyrus frig. esset, morbum cali-  
dum expugnabit. Sed Parthono-  
peus morbus, vt symptomata il-  
lius fidi testes ostendunt, potius  
frigi

476 *De Tumorib. præter naturam*,  
frigidus est quā calidus, qui huius  
vñctione profligatur. Erit igitur  
calida potius quā frigid. hydrar-  
gyrus.

Vñctionis hora commoda erit  
matutina, peracta concoctione, &  
depulsis alui excrementis. Et vt os  
& dentes minorem subeant noxam  
cū corpus inungitur, aureus an-  
nulus ore detinendus est, aut aureū  
numisma, quod argento viuo sa-  
turatum, & in accensos carbones  
proiectum & infrigidatum, rursus  
ore detinebitur. Ab vñctione de-  
sistendum nō erit, donec alui fluor,  
aut frequens pituitæ sputum ac-  
cesserit. Si in macilento & exte-  
nuato corpore vires defatiscant,  
erit proba, & coctionis minimè  
operosa alimonia reficiendum cor-  
pus, & vno atque altero die, aut  
pluribus, ab vñctione desisten-  
dum, donec recreatis viribus hanc  
faciliùs perferre possit. Aluo con-  
stipata, supponere glandem ex co-  
cto melle, aut clysterem erit ex  
vñu, tumidis gingiuis, oris & lin-  
guæ

guæ vlceribus sic erit prospiciendum.

℥. Decoct. hordei integri lb. j. mell. ros. col. ℥. ij. fiat oris collutio vel gargarismus. Propinanda erunt ex capo vel gallina iuscula, exhibendus panis lotus & bene coctus, vel oua recentia & trementia erunt administranda, propinandum quoque vinum generosum, cum ob oris incommoda solidas durasque res comedere citra maximam noxam non possint. Procedentibus linguæ & gingivarum vlceribus hæc sublimata aqua, rosacea parum mixta per specilli cuspidem bombace munitam tangenda erunt, vt vlcus à pituitosa hydrargyri qualitate obortum exiccetur, & malo procedente sequenti medicamento erit vtendum.

℥. Hordei parum contusi p. j. fol. plantag. solani, sunmitatum rubi sing. M. j. baccarum fol. myrti & rosarum rub. sing. p. j. florum viol. p. β. fiat decoct. in col. qu. s. diss. succi rosarum depurati ℥. ij. diamori ℥. j. β.



478 *De Tumorib. præter naturam,*  
℥.j. s. fiat gargarismus: in magno  
ardore & dolore ex ouino vel vac-  
cino lacte à butyro nequaquam  
secreto ab illo, collu. erit commo-  
da aut butyri recentis in ore deten-  
tio. Magno harum partium dolore  
perseuerante, affiguntur cucurbi-  
tulæ scapulis reuulsionis ergo, me-  
dicata potio in vnctione ipsa vti-  
lis erit, eo quod humorū in os cur-  
sum præpedit (non tamen eo die  
inungendum corpus) hæc in se-  
quentem parabitur modum.

℥. Confect. hamec. & elect. dia-  
carth. sing. ℥. ij. syr. ros. solut. ℥. j.  
aquarum betō. & bugloss. sing. ℥. ij.  
fiat potio. Et quia sæpe ex ipsa vn-  
ctione in magnam virium imbe-  
cillitatem corruunt, erit huic re-  
medio sequenti occurrendum.

℥. Conseru. rad. bugloss. & flor.  
borrag. sing. ℥. j. conseru. ros. & ace-  
tosæ sing. ℥. vj. pulu. diamarg. frig.  
℥. iij. corall. rub. ℥. j. syr. de pomis  
bene olentibus q.s. ad incorporan-  
dum, fiat opiata de qua singulis  
matutinis capiet ad quantitatem  
vnius

vnus castaneæ horis duabus ante prandium. Linteamina & subuculam cum vnguento vtetur non mutabit, donec manifesta & perseverantes apparuerint euacuationes fieri solitæ per spiritum, copiosos sudores & alui fluxum, qui nonnunquam tam vehemens est, & ab acri humore excitatus, vt dysenteriam gignat. Cui sequentibus remediis erit occurrendum.

℞. Decocti hordei integri ℥.j. diss. mel. ros. col. sacch. rub. sing. ʒ. j. β. vitell. ouorum recentium num. ij. misce, fiat clyster, supponatur conuenienti hora. Alui fluore perseverante pluribus vicibus erit iniiciendus, & sequentibus vti non erit à ratione alienum.

℞. Lentium parum contusarum p. β. hordei integri p. j. ros. rub. ʒ. ij. fiat decoct. cape de col. ℥. j. diss. butyri recent. vel sebi hircini ʒ. j. butyrum dolores magis lenit, sed hircinū sebum vlceribus veluti operculum inducens, vlcerum irritationem & incrementum ab humo-

480 *De Tumorib. præter naturam,*  
re acri illas partes lancinante im-  
pedit. misce, fiat clyster. Vel sic.

℞. Florum chameleontæ albæ  
℥. j. ros. rub. baccarum, fol. myrti  
sing. p. j. fiat decoct. in aqua pluuiæ  
& calybeata & in col. lb. j. diss. succi  
plantag. & solani depurati sing. ℥. ij.  
vitell. ouorum num. ij. fiat clyst. Pa-  
rari potest etiam ex caprino lacte  
calybeato vel candentibus silicibus  
vstulato. Concedetur etiam se-  
quens medicata potio.

℞. Rhabar. optimi parum assi ꝑ.  
iiij. corticum myrobal. citrearum  
& cebularum sing. ℥. β. syr. de ros.  
rub. sic. ℥. j. decocti sol. plantag. &  
turionum myrti ℥. iv. misce, fiat po-  
tio danda prima luce. Sequentis  
quoque præsidij vsus erit salubris.

℞. Conser. rosarum veteris, con-  
seruæ symphyti sing. ℥. ij. carniū  
ciron. sacch. conditorum ℥. vj. my-  
robal. emblic. sacch. cond. ℥. β. cor-  
ticis citri sacch. conditi ℥. iiij. tro-  
chiscorum de spodio cum semine  
acetosæ ꝑ. iv. corallij rub. ℥. j. pulu.  
diamarg. frig. ꝑ. ij. syr. de ros. rub.  
sic.

fic.q.s.ad incorporandum, fiat opiat-  
ta, de qua per horam ante suos pa-  
stus capiet ad quantitatem vnus  
nucis comestibilis. Qui sui iuris nō  
sunt, sed aliena quadra viuunt, vn-  
guenti loco sequentibus ceratis  
vrentur, quæ dolorem sedant, &  
succum noxium ex penitiorē loco  
euocant. hæc parati in sequentem  
modum debent.

℥. Gummi sagapeni, ammoniaci  
sing. ʒ. vj. terebinth. resinæ pini  
sing. ʒ. viij. dissoluatur supra ignem  
cum aqua vitæ, postea incorporen-  
tur lithargyri auri cerusæ sing. ʒ. j.  
ß. thuris ʒ. x. euphorbij ʒ. iij. vuç ta-  
mineæ ʒ. j. axungia porci à mem-  
branis mundatæ & per colum me-  
dicum transfusæ lb. j. hydrargyri  
cum suo liquore extinctæ lb. ʒ. olei  
de lilip, de spica & ceræ albæ sing.  
q. s. donec ad cerati consistentiam  
reducantur. fiât magdaleones, supra  
tenuem alutam extendantur, pa-  
rentur emplastra magnitudinis re-  
quisitæ, quæ brachiis, femoribus,  
inguinibus, & tibiis ipsisque iun-

X

cturis

482. *De Tumorib. præter naturam,*  
cturis admouebis & tertio quoque  
die mutabis, tandiu in illorum usu  
perseuerabis, donec quæ supra dictæ  
sunt euacuationes appareant. Vel sic.

℞. Rad. mandragoræ ℥.iiij. rad.  
bryoniæ, cucumeris asinini & radi-  
cis elenij sing. ℥.iiij. axungia anatis  
& gallinæ sing. ℥. v. olei de spica,  
chamom. & de lilio sing. ℥. iiij. vi-  
ni albi lb. β. bulliant ad vini con-  
sumptionem, pistentur postea, per  
cribrum medicum transfundan-  
tur, addendo gummi ammoniaci,  
galbani & opopanacis diss. in aq.  
vitæ sing. ℥.ij. styracis liquidæ ℥.ij.  
β. argenti fusilis cum axungia por-  
ci extincti ℥. iiij. cum debita ceræ  
quantitate. fiat magdaleones. Vel sic

℞. Massæ emplastr. filij Zachariæ,  
& diachylonis minoris ireari, sing.  
℥.iiij. massæ emplastri ceronei lb. β.  
Euphorbij ℥. β. cinabrij 3. vj. olei de  
lilio q. s. fiat ceratum. Vel sic.

℞. Vnguenti Aragon & marcia-  
ri sing. lb. β. gummi hederæ ℥. j. am-  
moniacy, bdellij, opopanacis diss.  
in oleo de lilio sing. ℥. j. β. tere-  
binth.

binth.abietis  $\mathfrak{z}$ .ijj.aristolochiæ rotunda, styracis calamit. & rub. sing.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . argenti viui cum butyro recenti extincti  $\mathfrak{z}$ . ij.  $\beta$ . resinæ, olei vulpini & ceræ citrinæ sing. q. s. fiat ceratum. Ad exostoses & sauos dolores sequens præsidium optimum habetur.

$\mathcal{R}$ . Massæ emplast. Ioannis Vignij, aut de ranis  $\mathfrak{ss}$ .  $\beta$ . massæ emplastri gratia Dei & filij Zachariæ sing.  $\mathfrak{z}$ . ij. Malaxetur manibus inunctis oleo de spica, fiat magdaleon. Danda tamen erit opera, vt ante horum vsum corpus sit plane repurgatum, aut sectione venæ (si opus sit) euacuatum, sequenti medicamento potissimum vbi morbus inueteratus erit, vtetur.

$\mathcal{R}$ . Rad. Enulæ camp. ciperi & acori vulgaris sing.  $\mathfrak{z}$ . j. corticis citri sicci  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . hermodactylorum  $\mathfrak{z}$ . v. bethon. arthem. sampsoci, chamepytheos, chamedr. primulæ veris sing. M.  $\beta$ . herbarum capil. com. vtriusque bugloss. cum radicibus, vtriusque cichorij, acetosæ cum to-

484 *De Tumorib. præter naturam,*  
to, fumarix, mercurialis sing. M. j.  
prunorum dulcium, passularum à  
gigartis repurgatarum, iuiubarum  
sebesten sing. p. xv. sem. anisi, fœni-  
culi sing. ʒ. ij. galangæ minutæ ʒ. iij.  
folliculorū fennæ, polypodij quer-  
ni recentis sing. ʒ. iij. medullæ car-  
thami contusæ ʒ. ij. Agarici recent.  
trochiscati in ligatura positi ʒ. j.  
florum chamom. stæchad. buglos.  
rorisinar. sing. p. j. florum centaurij  
minoris p. j. ʒ. fiat decoct. cape de  
col. tb. ij. In quibus dissol. sacch. al-  
biss. & syr. de fumo terræ sing. ʒ. iij.  
ʒ. misce, fiat syrupus, cuius media  
pars clarificetur & mediocriter de-  
coquatur, quam capiet in tribus do-  
sibus. Alteri parti perfectè decoctæ  
misc. syr. ros. solut. ʒ. iij. Capiat ʒ.  
iij. dissol. in decoct. buglos. fumarix,  
mercurialis, vel huius loco propi-  
nari poterunt catapotia sequentia.

℞. Massæ pill. de fumo terræ,  
hermodactylorum & fœtidarum  
maiorum sing. ʒ. j. trochiscorum  
alhandal. ( si robustum sit corpus )  
ʒ. iij. malaxentur cum aqua be-  
tonicæ,

tonicæ, fiant pillulæ vj. quas deglutiet hora secunda post mediam noctem leui cæna præcedente, cū custodia & regimine artis. Multi probant catapotia sequentia, quæ nisi in peruicaci morbo & valido corpore concedi non debent.

℞. Aloës succocitrinæ ʒ. j. rhabarb. elect. & agar. sing. ʒ. ij. argenti fusilis in succo rosarum extincti ʒ. j. β. ambaræ cineritiæ, moschi sing. ʒ. j. myrrhæ electæ ʒ. j. pauca terebinthina abietina excipiantur, fiat pasta pil. ex ʒ. j. formentur pillulæ 7. vel 8. capiat duas pro prima vice, deinde tres, postea quatuor. Si diues sit æger & sumptum ferre possit, addes limaturæ auri obryzi ʒ. j.

A calcinati antimonij, præcipitati aut sublimati vsu omnino abstinendum cenfeo, tum quia escharotica & vrentia medicamēta sunt, tum quia ventriculo & intestinis sunt maximè molesta. Quod verum esse comperi in quodam aulico Chirurgo, qui cum febre quar-



486 *De Tumorib. præter naturam,*  
tana distorqueretur, cuiusdam me-  
dici consilio stibij calcinati ḡ. iiij.  
cum confer. ros. 3. j. deuorauit, qui  
paulo post in tam profundum vo-  
mitum est collapsus, & in tam ma-  
gna ventris tormina, vt nisi aliorum  
medicorum remediis fuisset resti-  
tutus, vitam cum morte commuta-  
re paratus iam esset. Satiùs itaque  
duco ab his suspectis venenatis-  
que præsidii abstinere, quàm aliò-  
rum scriptis temerè fidem adhibe-  
re, & homines sic excarnificare,  
cùm nobis tutioribus, & corpo-  
ri noxam non allaturis vti sit da-  
tum.

Non desunt qui colocynthide  
& turpeto passim vtantur, quorum  
sententiam non valde probo. Quod  
si his vti oporteat, consulendus  
erit exercitatus, & qui experientia  
plurimum valeat medicus, qui con-  
templato virium robore moderari  
pro sua prudentia nouerit, nihil  
enim temerè in tam digna, tam-  
que nobili materia (qualis est cor-  
poris humani) experiri fas est.

Pleri

*Gal. co.*  
*in 1.*  
*apho.*  
*lib. apho.*

Merique in diutino morbo, & qui iam longo tempore corpus torfit, quando vident vng. irritum esse vsum, ab his abstinere, & sequenti methodo curationem aggrediuntur. Constituunt agrotantem nudum, & bene euacuatum sub conopeo, in quo ferreum aut æneum vas tuculentis prunis munitum reponunt, supra quas sequens medicamentum proiicientes ex illo suffitum faciunt, & bene clausum papilionem seruantes, dant operam vt corpus fumum hauriat, qui sudores mouet, & pituitam ex ore elicit.

Suffitibus ad fœdam & mordicus hærentem scabiem vsa est antiq̃uitas, non tamen consulendi sunt ad tabem, hecticam, asthma procliuius, nec nisi prius roboratis extis principibus, & mitiorum medicamentorum vsu præcedente, sunt aggrediendi. Quare antequam conopeum ingrediantur ex capo ius haurient, aut oua sorbilia, vel albissimi panis vino generoso satura-

488 *De Tumorib. prater naturam,*  
tribuccas duas comedent, vel ar-  
diaco aliquo medicamento frien-  
tur, quale est conserua roſarum,  
rad. bugloſſ. manus Chriſti cum  
vniionibus. Ex ſequentibus itaque  
ſuffitus parabitur.

℥. Cinabrij ℥.ij.olibani, gum-  
mi iuniperi ſing.℥. β. ſtyracis cala-  
mitę benioini ſing.℥.ij. trochiſcorū  
gallię & aliptę moſchatę ſing.℥.j.  
puluerentur & terebinthina exci-  
piantur, ſiant paſtilli ponderantes  
℥.vj. Vel ſic.

℥. Theriacę probatę ℥. β. ci-  
nabrij & auripigmenti ſing. ℥. j. β.  
benioini & myrrhę ſing.℥.β. aquę  
meliffę, eliquationis gummi traca.  
q. s. ad excipiendum, ſiant paſtilli  
ponderis ℥. β.

Si huius ſuffitus odorem citra  
ſuffocationis periculum ferre non  
poſſit, caput extra conopeum te-  
neat, reliquis corporis partibus ap-  
primè teſtis, ne frigidus aër in pe-  
netralia corporis ſe inſinuans, mi-  
ros articulorum cruciatus moueat,  
& tunc bene ſudantem, calidis pan-  
nis

nis inuolutum, ut rursus fudet in lectum collocabis, & alimentis euechymis corpus reficies. Fractis autem viribus, suffitibus tantisper parcendum erit donec corpus suas vires collegerit. Sed cordi syncope patienti cardiaca potione, aut cardiaco epithemate prospiciendum erit.

At multos tam morosos saepe offendimus, qui vnguentorum aut suffitus usum respuant, hunc morbum aliis remediis profligari posse sperantes, his instituendam eam victus rationem quæ ex sequenti medicamentorum decocto paratur, suademus. Quæ quamuis in longius tempus curationem protrahat, à tam nefanda pernicie nihilominus plerisque liberare quotidiana experientia docet. Quam post totius corporis exactam euacuationem pro humoris noxij natura sic agredieris.

℞. Ligni sancti aut guaiacini nō gladio aut contundente pistillo, sed lima in pollinem redacti ℥. j.

X s corti

490 *De Tumorib. præter naturam,*  
corticis eiusdem  $\text{℥. j.}$  Infundantur  
per diē naturalē in xij. lb. aq. fontis,  
bulliāt in vase vitreato lento igne,  
sine fumo, seruata diligenter in py-  
xide, aut alio vase mundo spuma  
(vlcēribus ab hoc morbo contra-  
ctis vtilissima) donec redeant ad lb.  
iij. in robustis corporibus, ad sex  
in debilioribus, ad x. in pueris, facta  
col. reponatur in amphora vitrea.  
Dentur  $\text{℥. viij.}$  horis antelucanis, te-  
gatur corpus plus solito, sudādo ci-  
tra molestiā deterſo postea à sudo-  
re corpore, trāsferat se in aliū lecti  
angulum, & ybi per horam quieue-  
rit, prandeat solito multo fruga-  
lius. Vescetur interea pane semi-  
dalite, bene fermentato & bisco-  
cto, carnibus veruecinis, caponum,  
gallarum, atagenarum, lactantis  
vituli, auicularum montanarum,  
fiscedularum, assarum potius quàm  
elixarum. A iusculis, ossis, suillis, bu-  
bulis, aquatiliū auium carnibus  
abstinebit, piscibus, leguminibus,  
crudis herbis, radica, brassica, va-  
porulentis cibariis, acidis, ompha-  
cio,

cio, malorum aurcorum succo parcendum, à sale falsisque cibis abstinentendum, ne guaiaci operatio impediatur. Quemadmodum perfrictus alio magnes ferrum attrahere prohibetur.

Amplius si quis roget cum hic morbus sit chronicus, cur tenuis victus ratio, contra Hip. sententiam instituat, dicendum ligni guaiacini decoctum non tantum medicamentum esse, sed alimentum ob eius magnam crassitiem: tremula vel sorbilia oua concedi possunt; grana pini aqua hordei macerata, cum sacch. momento: amygdalæ saccharatæ & placetæ sacch. saturatæ pistillo maceratis dulcibus & putamine priuatis amygdalis (marfos panes vocant) vtilis, vix passæ detractis gigartis, citri cortex sacchi cõditus, dentibus probè tritus. A vino omnino abstinendum suademus; cuius loco, ligni sancti decocto erit vtendum. Quod in sequentem modum rite parari poterit.

℞. Facem prædicti ligni. additis

X 6

℥. ij.

492 *De Tumorib. præter naturam,*  
℥. ij. ligni noui, decoquatur in ℔b.  
xvj. aquæ fontis, donec redeant ad  
℔b. x. transfuso per medicum colum  
liquore, vtere. Morosi ægrotantis  
palato facies satis si ℔b. j. sacch. cum  
℥. β. cinamomi misceas, vt transfu-  
sus ad aromatitisi vini instar potus  
sit gratior. Si propter cōsuetudinē;  
cui aliquid autore Hip. est condo-  
nandum: aut virium imbecillita-  
tem abstinere à vini potu nequeat,  
concedendum erit in prandio & illo  
frugaliore cœna, sed oligophoron  
& guaiacini decocto probè dilu-  
tum: pisces non solum fugiendi  
sunt, sed neque gustandi, quia fri-  
gidam & humidam alimoniā cor-  
pori suggerunt. Seruabitur hæc vi-  
ctus ratio in 30. aut 40. diem, cuius  
vsum & successum fœlicem tibi  
bona ægroti tolerantia & sympto-  
matium inclinatio monstrabit. Sed  
paulo antequam ad assuetam viuē-  
di normam transferatur æger, vt  
humoris noxiij reliquiæ in totum  
aboleantur quæ nouam rursus de-  
fluxionem excitare possint, purgato  
rursus

℥. aphc.  
7 aphc.

rurfus corpore, aliquo ex prædictis vnguentis erit illinendum corpus.

Quibus dexterè peractis, non repente, sed senfim ad afuetam viuendi rationem reducatur. Hac viuendi lege pertinacia vlcera nonnunquã curantur & exoftofes delentur aut magna ex parte minuuntur. Quibus perfeuerantibus emplastra aut cerata ex fequentibus adhibebis.

℞. Maſſæ emplaſtri diachylonis minoris ireati ℥. iiij. maſſæ emplaſtri de ranis ℥. v. malaxentur inunctis manibus oleo keirino aut liliaceo, fiat magdaleon, de quo formantur emplaſtra magnitudinis debita. Vel ſic.

℞. Rad. mandragoræ & liliorū alborum ſing. lb. j. rad. cucumeris aſinini & bryoniæ ſing. lb. ſ. axungia taxi ℥. iij. axungia vrfi ℥. iiij. axungia gallinæ, anatis & anſeris ſing. ℥. ij. ſ. olei de lilio & chamom. ſing. lb. ſ. contuſis prius radic. decoquantur optimè, & per colum medicum poſtea tranſfundantur, miſce hydrargyri cum ſuilla.  
axun



494 *De Tumorib. præter naturam,*  
ticeæ & sænugræci sing. ʒ. ij. β. Sup-  
axungia extinctæ ʒ. v. hermoda-  
ctylorum ʒ. ij. pulu. irid. florent.  
ʒ. iiij. terebinthinæ ʒ. iiij. ceræ q. s.  
fiat ceratum. Vel sic.

℞. Emplastri Ioannis de Vigo. ℥b.  
j. massæ emplastri filij Zachariæ  
& apostolici chirurgici sing. ℥b. β.  
malaxentur manibus inunctis oleo  
de lilio, fiat magdaleon molle, ad-  
de cerati celsipati ʒ. iiij. argenti  
vini cum suilla axungia extincti  
ʒ. ij. his qui ob egestatem vel ma-  
gna negotia domi residere non  
possunt & peregrinari coguntur,  
alius curationis modus instituen-  
dus erit. Quorum brachiis ad car-  
pum vsque, homoplaris & coxis, &  
aliis partibus dolore tentatis ad-  
mouenda erunt. magna emplastra,  
prius bene repurgatis; quæ in se-  
quentem modum construi oppor-  
tunè poterunt.

℞. Massæ emplastri diuini, dia-  
chylonis magni cum gummis sing.  
℥b. j. empl. de meliloto ℥b. β. styracis  
liquida, ladani puri & mastiches  
sing.

ſing. ℥. iij. hydrargyri cum adipe gallinaceo extinctæ ℥. iiij. euphorbij ℥. j. ceræ qu. ſuffi. malaxentur cum oleo laurino, fiat ceratum ex quo conſtruantur magdaleones, conformentur emplaſtra, emunctoriis poſterioribus partibus admoveantur, non pectori, ventri & anterioribus locis. Si hiſ medicamentis dolores non conquieſcant, neque tumores membrorum digeri poſſint, ſequentibus præſidiis quæ humores tumorum præcipuam cauſam ſuppurant, vtendum erit.

℥. Rad. liliorum alborum ſub prunis coctarum ℥. iiij. rad. ebulorum, altheæ, elixarum, in mortario marmoreo tritarum ſing. ℥. iij. caricarum pinguium elixarum & contuſarum num. 30. muccaginis ſem. fænugræci, altheæ ſing. ℥. v. fermenti acris ℥. ij. axungię gallinæ & porci ſing. lb. β. olei de lilio, amygdalarum amararum ſing. ℥. iij. β. cum ceræ veteris decenti quantitate, fiat magdaleon. Adde farinæ tripura

496 *De Tumorib. præter naturam,*  
puratus tumor candenti ferro aut  
pyrotico medicamento aperiendus  
erit. his tamen legibus obseruatis  
quas lib. i. cap. de tumorum in vni-  
uersum curatione docuimus. Quod  
si hæc iuncturis admoueas, veren-  
dū erit ne præpediatur aboleatūr-  
ve membri functio. Decisa eschara  
basilicone, butyro, vel medicamen-  
to ex oleo ros. & ouorum luteis pa-  
rato, vlcus eluentibus & detergen-  
tibus, præsertim si pus sit crassum,  
in sequentem modum paratis vten-  
dum erit.

℥. Farinæ hordei ℥. j. myrrhæ,  
olibani, mastiches, aristolochiæ ro-  
tundæ sing. 3. iij. terebinthinæ ℥. j.  
ß. mell. ros. col. ℥. j. ceræ parum, fiat  
vnguentum, quo operta turunda in  
vlcus mittatur, aut illius loco em-  
motum, tegatur deinde emplastro  
ex præscripto vnguento. Vnguentū  
apostolorum ex Auicenna vel Æ-  
gyptiacum in fortioribus naturis,  
in mollioribus cum basilicone per-  
mixtum probatur. Vbi probè deter-  
sum erit vlcus, emplastro fusco à  
Gale

Galeno maximè commédato (quod ex oleo lithargyro aceto ad saturitatem coctis fit) vel emplastro diachalciteos adaucta chalcitidis quantitate coagmentum recipiet. Quod si tenuem saniem euomat, & huic sit calida intemperies copulata, remediij sequentis vsus commodus erit.

℞. Succij plantag. & solani depurati sing. ℥. j. thutiæ diligenter præparatæ, plumbi vsti & loti sing. ʒ. j. β. caphuræ ʒ. β. cerusæ aqua rosarum ablutæ ʒ. iiij. olei ros. omphacini ʒ. iij. Agitentur in mortario & pistillo plumbeis, fiat linimentum. Adde lithargyri auri ʒ. β. Sæpe venenatus ille humor intacta carne caluariæ os erodens, cariei est fomes, vel alterius corporis ossis, cruciatus intolerabiles excitans, quos anodynis aut narcoticis medicamentis vix compescere possumus, tunc ad sectionem, pyrotico medicamento aut rutilante ferro (quod tutius & præstantius est) factam nos adigit. Huic autem nefando

498 *De Tumorib. præter naturam,*  
fando malo succurremus præsidio  
sequenti, quod ossis corrupti squa-  
mas decidere facit & cariem ablu-  
mit : spoliarium nostri æui Chi-  
rurgi vocant.

℥. Rad. aristoloch. rotundæ 3.  
iij. s. rad. cannarū, peucedani sing. 3.  
iij. pulu. iridis, farinæ erui sing. 3. s.  
terebinthinæ 3. vj. mellis ros. col. 3.  
j. s. concorporentur simul. fiat li-  
nimentum.

Aliud quod corrupta ossa detra-  
hit, squamas illorum tollit, cavi-  
tatesque replet.

℥. Corticis pini, aristoloch. ro-  
tundæ, pumicis vsti sing. 3. j. rad. iri-  
dis, panacis & capparum sing. 3. vj.  
manna, thuris 3. v. myrrhæ & re-  
sinæ pini sing. 3. j. squamæ æris 3.  
ij. terantur subtiliter & cum mel-  
lis optimi quantitate congrua, fiat  
linimentum. Interdum in carioso  
osse tripanum adigimus aut pha-  
coto & plumbeo malleo, caluaria  
os euellimus, vt propinquas ossis  
partes sanas & à putrilagine tutas  
seruemus, quod frequentius in  
calua

caluaria ossibus facimus. Nonnunquam exigua terebra os perforamus, & aqua forti ab alchimistica arte exercentibus excogitata illud perfundimus, qua arte à sano secretum decidit. Quæ tendenda minimè sunt, nisi ritè purgatum fuerit corpus, quod inungi poterit aliquo ex præcedentibus vnguento, quod cariosum os præstantius exsiccabit. Ad hos vsus, euulsis cariosis ossibus, accommodantur cerata, quæ pro varia membrorum temperie variis modis præscribuntur oportet. Ceratum de bethonica capiti est congruum, aliis verò partibus sequens est accommodatum.

℞. Sepi hircini ℥. iij. cerusæ & minij sing. ℥. j. β. lithargyri auri ℥. iij. boli armenia ℥. x. opopanax & lacrymæ thuris sing. ℥. j. olei laurini ℥. iij. olei communis ℥. ij. ceræ citrinæ qu. suff. fiat ceratum. Oris & palati vlcera aqua sublimatæ partibus duabus & rosarum vna per cuspidem specilli bomba

500 *De Tumorib. præter naturam,*  
bombace inuoluta tangenda erunt.  
Quibus sequens gargarismus erit  
idoneus.

℞. Rosarum rub. baccarum fo-  
liorum myrti sing. p. j. flor. viol. p. ss.  
fem. acetosæ, endiuæ sing. ʒ. ij.  
fiat decoct. in aqua hordei perfectè  
cocti, de colatura cape lb. j. ss. diss.  
syr. viol. ʒ. iij. fiat gargarismus. Gar-  
garizet frequenter.

Aliqui Guaiacini ligni decocto,  
sennam, polypodium, agaricum  
miscent, & in robustioribus corpo-  
ribus colocynthidem, sperantes se  
his medicamentis humores noxios  
qui in corporis habitu sunt ad il-  
lius centrum reuocare. Quorum  
sententiam non magni facio, quia  
hæc citra magnam humorum per-  
turbationem, & præcipuorum ex-  
torum noxam, fieri non possunt.  
Adde quod sudores, quibus fusi per  
habirum corporis humores com-  
modè euacuantur, sistunt.

Multi huius mali curationem  
tentant ex apiæ radice decocto  
(quam nonnulli cinnam vocant).  
victus -



viſtus ratione inſtituta. Sed oportet arbitremur radicem hanc à Dioſcoridis apia maximè alienam, hæc enim bulbosa eſt, & pyri imaginem referens, vnde nomen accipit, vere naſcitur, datur ad expurgandum corpus: altera Dioſcoridi & antiquis medicis incognita, caninarum aut iunci radicis effigiem æmulatur. Guſtu inſipida, ab hoc apia, ſine ſapore ab aliquibus vocata. Media eſſe videtur inter calamū odoratum & galangam craſſam, quæ propriè acorus dicitur. Eſt calamo odorato craſſior & ſolidior, ſed galanga leuior & rarior, ca. in primo ordine, ſicca in ſecundo, cuius uſus ſic erit inſtituendus.

℞. Rad. cinnæ non levis & cariola, ſed ſolida & ponderoſa ℥.ij. diuidatur cultro bracteatiſſimè vel taleatiſſimè, aut in tenues laminas. Infundatur per diem naturalem in ℔. x. aquæ fontanæ, decoquantur lento igne ſine fumo, in olla noua & vitreata donec redeant ad ℔. iij. Transfuſum, per colum medicum decoctum



502 *De Tumorib. præter naturam,*  
decoctum in amphora vitrea repo-  
natur, capiat prima luce  $\mathfrak{z}$ . viij. pur-  
gato prius corpore, tegatur, vt su-  
perius fuit dictum, plus solito, cor-  
pus sudet ad placitum, regatur vt  
iam fuit traditum. Et ex magmate  
addendo  $\mathfrak{z}$ . j. cum xij. lb. aq. fonta.  
fiat decoctio, donec redeant ad di-  
midias. Colatura facta, & vase vi-  
treo reposita vtatur vini loco in  
suis partibus & extra illos. Quod si  
saporis gravioris ergo sacch. lb.  $\beta$ .  
miscas, erit gustu gravior. Deligēda  
ponderosa radix, recens, rubido co-  
lore, non senio cariōsa, & parum  
nodosa. In hac victus ratione 30.  
dies cōpletos se continebit, & cū  
sudores minus, vrinas magis mo-  
ueat, & suppressæ per aluum deie-  
ctionis causa sit, purgatorio medi-  
dicamento vtetur.

Sunt qui apia decoctum bilio-  
sis corporibus magis conferre pi-  
tuitosis Guaiacini ligni statuunt.  
Sed ego vtrisque tēperaturis Gua-  
iacini ligni decoctum magis com-  
modum iudico, cū sit magis me-  
dica

dicamentosum. Est enim radix  
apia qualitatis corpus afficientis  
expers, ut illius insipidus sapor in-  
dicat. Cum ergo in corpus parum  
aut nihil agat, quid fieri potest ut  
tam lentos ac viscidos succos ex-  
citatis sudoribus euacuet? Quod  
si dicas hoc remedio multos fuisse  
leuatos, dicam hoc potius inedia  
& tenui victui quam medicamen-  
to ascribendum esse. Sarzæ paril-  
liæ decoctum similacis asperæ ima-  
ginem referentis, utilius mea sen-  
tentia est, ut certus medicamen-  
torum qualita. censor gustus pol-  
licetur. Si Guaiacini decocti ligni  
calore naturam defatigari quis  
arbitretur, quod illius usu he-  
patis calor magis accendatur, sciat  
oportet, si bene dilutum sit, cor-  
pori officere non posse. Hæc ita-  
que curantis medici arbitrio re-  
linquimus excogitanda. Et quia  
infiniti penè medici sceleratissimi  
huius morbi curatiuam metho-  
dum præscripserunt, quorum re-  
media ab imperita etiam plebe in  
dies

504 *De Tum. pr. na. Lib. III. ca. 52.*  
dies tractantur , huic de morbo  
Neapolitano curationi colopho-  
nem & vltimam manum impo-  
nam, ad quantum nostri instituti li-  
brum me conferens.

*Finis III. Libri.*



DE



DE  
AGNOSCENDIS  
CVRANDISQVE  
TVMORIBVS  
præter naturam.

*Auctore*

ANTONIO SAPORTA  
*Doctore Medico.*

LIBER QVARTVS.

CAP. I.



Aggredietur de tumoribus præter naturam a melancholico humore excitatis tractationem, primum omnium quid melancholia, quid atrabilis sit, & quam inter hos succos constituenda differentia, denique  
Y qui

506 *De Tumorib. præter naturam,*  
qui ab his humoribus tumores  
procreantur, horum methodo cu-  
ratiua haud prætermiffa, docebo.  
Eft autem melancholia fanguinis  
limofa atque fæculenta pars, fæci  
vinariæ haud abfimilis, colore sub-  
nigra, & ad médium generis colla-  
ta, frigida & ficca, melancholicis  
& duris partibus alendis vtilis, in  
vafis putrefcens quartanam conti-  
nuam, in corporis habitu inter-  
mittentem excitans, metum & tri-  
ftitiam fine manifefta caufa indu-  
cens. Melancholiæ morbi, qui à  
putata caufa nomen defumpfit, eft  
origo, à bile adaffata genita delira-  
menta ferina & infaniam indomi-  
tam parit, in partes corporis de-  
lapfa, & in his coaceruata tumores  
curationi pertinaces, cuius ergafti-  
rion & officina eft lien, ab illius  
puriore & felectiore parte nutri-  
tus, quem cum ob obftructionem  
attrahere non poteft, fædo colore  
vniuerfum corpus inficit. Atra bilis  
à melancholiæ naturalis aduftione  
genita aut flauæ bilis, quæ inter  
om

omnes est maximè pernicioſa, mor-  
bos contumaces & ſæpe remediis  
ſuperiores, cogitatuſque medici  
ſpernentes facit. Quapropter hanc  
toto genere præter naturam eſſe  
exiſtimandum eſt. Priùs igitur de  
tumoribus à melancholia naturali  
progenitis (quos ſcirrhos nomina-  
mus) agemus, deinde inſtituto iam  
ordine de aliis nobis erit ſermo.



*De Scirrho.*

C A P. II.

**S**cirrhum tumorem durum  
eſſe tactui renitentem, æde-  
mati planè contrarium, to-  
ta medicorum ſchola tradit, hunc  
in legitimum & illegitimum diui-  
dens. Legitimus planè durus eſt,  
doloris expers & inſanabilis. Scir-  
rho durities accedit ab humoris  
ſiccitate & craſſitie. Doloris ſenſus  
ab eſt, quia craſſus & lentus humor  
inania ſpatia ſubiens, neruos, ner-  
uoſaque corpora replens, ſpiritui

Y 2 ani

508 *De Tumorib. præter naturam,*  
animali viam occludit, à quo omnis  
vis sentiendi & mouendi proficisci-  
tur. Tanta est in isto tumore duri-  
ties, vt plus doleat & afficiatur per-  
cutiens quàm percussum. Durum  
id vocamus quod in se non cedit:  
id autem tribus dicitur modis, vt  
ca. frigi. vno siquidem absolutè seu  
in summo, vt terra dura: altero per  
excessum, vt os, vnguis, cornu: ter-  
tio ad symmetrum sui generis, vel  
ad quoduis collatum; hoc modo  
non simpliciter durum, sed durius  
appellatur. Porrò corpus hoc dum  
sanum erat, durum tribus modis ef-  
ficitur, vel quia siccum exhausta  
humiditate, vt ca. siccitas, quæ à ve-  
hementi motu, vel solis aestu fit, à  
medicamentis siccantibus sumptis  
vel admotis, inedia, ardente febre,  
animi pathematis, vel quia à frigi-  
do concreuit intemperatura frigi-  
da scilicet, vel à medicamentis apo-  
crousticis insigniter refrigeranti-  
bus. Quod propriè durum dicitur,  
vel ab immodicè digerentibus re-  
soluta tenniore parte, & fæculen-  
tiore

tiore remanente & lapidescente,  
vel a vento, vaporē in aliquam  
partem affluente : quod durum  
*ἀλίτωνα*, id est, renitentiam Græci  
vocant. Quæ reficiūt & humectant  
duritiei primo modo sunt idonea:  
quæ propriè malactica sunt, siue  
emollientia : secundo modo, quæ  
discutiunt & euacuant, tertio sunt  
consentanea. Scirrhus illegitimus  
non omnino insensibilis, qui quam-  
uis non facilem curationem ad-  
mittat, non tamen est prorsus in-  
sanabilis.



*De causis Scirrhi.*


C A P. III.

**L**Egitimi & illegitimi proca-  
ræcticæ causæ sunt, aër &  
aqua morbum hunc efficientia, qui  
aliquando endymius est. Alimenta  
succum melancholicum & crassum  
gignentia, quorum ad Glauconem  
2. & 3. de loc. aff. Galenus memi-  
nit. Mœror insuper, inges vigiliæ,  
Y 3 altæ



510 *De Tumorib. præter naturam,*  
altæ & perseverantes meditationes. Causæ corporales sunt, humores melancholici sinceri, vel pituitosi, lenti, tenaces, & humori melancholico mixti, qui lapidescentes membri sensum auferunt, & hic sola Chirurgia & non medicamentis curatur. Illegitimi causæ sunt duplices, quarum aliæ sunt prædicti humores, qui non ita obduruerunt, ut horum causa sensu sit pars priuata. Aliæ quando ex erysipellate, aut phlegmone non dexterè curata, frequētius certe legitimus, quem Auicennas sephiros purum vocat, ab humore melancholico, illegitimus à phlegmone, vel malè digesto erysipellate per *μετάστασις* nascitur. Si humori melancholico sanguis misceatur, fit scirrhus phlegmonodes, si bilis, erysipelatodes, si pituita tenax & crassa, œdematodes: quartana desinente etiam contingunt scirrhi tam interni quàm externi, qui hæmorrhoidum suppressio etiam ansam suggerit.

*De*



*De viriusque Scirrhi notis.*

C A P. I V.

**S**cirrhi legitimi notæ inseparabiles duæ tantum sunt, durities paulò minor quàm in exostosi, & doloris priuatio. Huius color liuidas est, & coloris humoris à quo dependet naturam sequens, cum tensione & duritia vehementi, ita vt inter tumores à materia profectos, illo, præter exostoses, duriores non reperiatur. Aliquando, Auicenna teste, in isto supereminet pili, membri æqualem intemperiem commonstrantes, ab humore melancholico excitatam. Duo itaque signa pathognomica (vt diximus) sunt constituenda, quorum alterum est durities, alterum doloris priuatio, qui enim cum dolore est molestante, ad canceri naturam (vt suo demonstrabitur loco) accedit. Huius (vt iam diximus) deplorata est curatio. Illegitimi color similis est corporis co-

512 *De Tumorib. præter naturam,*  
lori cum sensu aliquo, qui frequen-  
ter à pituita resiccata, melancholiae  
amula oritur. Hunc Galenus in  
simplicium ratiociniis, scirrhum al-  
bum vocat, cuius sequenti capite  
instituenda erit curatio, quæ frustra  
sæpe suscipitur. Hepatis scirrhus  
confirmatus curationem non ad-  
mittit, Galeno teste, qui hydropis  
semper prodromus existit. Durus  
tumor omnes corporis partes di-  
uexare potest, sed mammas & vre-  
rum præcipuè: si sine doloris sen-  
su sit, & vterum molestat, scirrhus,  
si cum doloris sensu sit, scirrhoma  
dicitur, non dexterè curatus facile  
in cancerum mutatur.

3 ca. de  
vitu  
scirri.

2. ad  
Giant.



*De Scirri illegitimi curatione.*

C A P. V.

**I**llegitimi scirri curatio tri-  
bus obseruatis scopis absol-  
uitur. Quorum primus conuenien-  
tem viuendi normam præscribit.  
Secundus aggrediendam humoris  
noxij

noxij euacuationem. Tertius humoris parti iam impacti emolliitionem & digestionem.

Primus igitur scopus vitam sobriam, ad ca. & hu. inclinantem præcipit. Quare euehymorum ciborum vsus erit conueniens, qui bonum & laudatum sanguinem gignere queant. Sit aër temperatè cal. & hum. & similis temperaturæ quam incolit regio. Panis triticeus probè subactus cum paucò sale congruus. Ex vitiatissimis seminibus inutilis, ex zea præsertim. Generosum vinum odoratum diligendum, nisi ab humoris exustione scirrhus fiat, tunc profecto tollendum est, aut quàm maximè diluendum. Crassum, austerum & turbidum quàm maximè vitandum. Pullorum, caponum, lactantis vituli, gallinarum, lepusculorum, perdicum, turturum, attagenarum caro utilis, ova recentia & sorbilia commendantur, fugiendum olerum genus, brassica præcipuè, legumina omnia vitanda, necnon

Y s bubu

514 *De Tumorib. præter naturam,*  
bubulæ, suillæ & hircinæ carnes.  
Salictarij lupuli turiones vtilis, vti-  
lis borrago vtraque, intybus, la-  
ctuca, & quæ sanguinem purio-  
rem efficere possunt, prosequen-  
da. Et vt vno verbo claudam, fu-  
gienda omnia quæ à Galeno in  
*S. ca. de*  
*vaciâch.* comment. de loc. aff. sunt tra-  
dita. Labores corporei sint mo-  
derati, affecta tamen parte quie-  
scente.

Secundus scopus circa antece-  
dentis causæ coctionem & euacua-  
tionem versatur. Priùs itaque in-  
iciendus erit aluum emolliens  
clyster, præsertim si ea astricta fue-  
rit: vel illius loco ex medulla si-  
liquæ ægyptiacæ, catholicone, dia-  
phœnico, parandus bolus, sequen-  
ti die, ætate & viribus permittenti-  
bus, & extuberantibus venis, mit-  
tendus erit sang. vt sanguinis mis-  
sione diminutis humoribus, reli-  
quæ meliùs concoqui possint. In  
sequentem ergo modum conco-  
ctionem aggrediemur.

℞. Syr. viol. de epithymo, de po-  
mis

mis bene olentibus, sing.  $\bar{z}$ . ij. mell.  
ros. col.  $\bar{z}$ . j. aquarū bethonica, me-  
lissæ, buglossæ sing.  $\bar{z}$ . v. pulu. dia-  
marg. frig. & diarhod. sing.  $\bar{\theta}$ . ij.  
fiat syr. clarificatus & aromatiza-  
tus, capiat in 4. aut 5. vicibus de  
mane. Vel sic.

$\mathcal{N}$ . Bethonica, lapati acuti, vtriuf-  
que bugloss. vtriufque cichorij cum  
radicibus, turionum lupuli, aspara-  
gorum, melissæ, herbarum capill.  
com. rostri porcini sing. M. j. passu-  
larum exacinatarum, prunorum  
dulcium, iuiubarum, sebesten sing.  
pa. xx. sem. anisi, fenic. sing.  $\bar{z}$ . j.  $\beta$ .  
glycyrrhizæ rasæ  $\bar{z}$ . j. medullæ car-  
thami contusæ; polypodij querni  
recentis, foliorum sennæ sing.  $\bar{z}$ . ij.  
Agarici in ligatura positi  $\bar{z}$ .  $\beta$ . zin-  
giberis  $\bar{z}$ .  $\beta$ . vel agarici loco in for-  
tioribus naturis, turpeti electi in  
sero lactis caprini macerati  $\bar{z}$ . ij.  
florum genistæ, cicerum nigro-  
rum, florum buglossæ & stœchad.  
sing. p. j. fiat decoct. colatura facta  
ad lb. ij. misce succi pomorum  
dulcium, & succi bugloss. depurati  
Y 6 sing.

516 *De Tumorib. præter naturam,*  
sing. ʒ. iiij. Decoquantur iterum do-  
nec ad lb. j. ʒ. redeant & cum sac-  
chari albillimi ʒ. vj. syr. viol. ʒ. ij.  
fiat apozema clar. & arom. cum  
pulu. diamosch. dulc. & diarhod.  
sing. ʒ. j. capiat in quinque dosibus  
de mane.

℞. Elect. indi maioris ʒ. ij. tri-  
pherę persicę (modo obstructionib.  
non sit obnoxius) ʒ. ʒ. rhabar. in aq.  
bethon. & modico vini albi infusi.  
& expressi ʒ. j. ʒ. cinamomi ʒ. vj.  
syr. ros. solut. ʒ. j. ʒ. decocti apoze-  
matis præscripti ʒ. iiij. fiat potio  
danda post præcedentis apozematis  
vsum. Vel sic.

℞. Elect. diacarth. & confect. ha-  
mec sing. ʒ. ij. syr. ros. solutiui ʒ. j. ʒ.  
aquarum melissæ & bethon. sing. ʒ. ij.  
misc. fiat potio.

℞. Theriacæ veteris & electæ ʒ.  
ij. sacch. modicum. fiat bolus, quem  
capiet in crastinum horis quinque  
ante prandium. Probantur magis  
in huius morbi curatione liquida  
aluum subducentia medicamenta  
solidis.

℞. Con

℞. Conseruæ rad. buglos. confer.  
stæchad. & florum rorismarini  
sing. ʒ. j. corticis citri sacch. conditi  
ʒ. ʒ. conferuæ ros. florum cichorij,  
sing. ʒ. v. pulu. diamb. ʒ. j. pulu. dia-  
marg. frig. ʒ. ij. pulu. diarhod. ʒ. iiij.  
syr. de pomis bene olentibus q. s.  
ad incorporandum, fiat opiata, de  
qua capiet horis duabus ante pran-  
dium ad quantitatem vnus casta-  
neæ, bibendo postea cochlearia  
duo vini clari aut gilui aqua bugl.  
diluti.

Tertius scopus topicorum præ-  
sidiorum vsu edocet, quæ apo-  
croustica esse non debent, cum hic  
tumor suapte natura sit frigidus  
& crassus, & propriè malacticis  
medicaminibus egens. Repellen-  
tibus quippe medicamentis non  
retrocederet peruicax humor, sed  
potius adaugeretur durities dis-  
cutientibus medicamentis non ce-  
dens. Vsurpanda igitur erunt me-  
dicamenta, partim emollientia,  
partim digerentia, iuxta Galeni  
sententiam. Ob hæc Auicennas  
duabus



518 *De Tumorib. præter naturam,*  
duabus reuolutionibus, siue dua-  
bus medicamentorum speciebus,  
utendum tradidit. Altera primaque  
emolliente, altera digerente, sed  
posteriore. Sed cum talis curandi  
ratio magnum medico negotium  
facefcere soleat, excogitandum erit  
medicamentum, quod vtraque sit  
facultate præditum, emolliente sci-  
licet & digerente, non tamen hoc  
manifestè humectans, & maxi-  
mè digerens esse debet, tum quia  
fluxionem in affectam partem pro-  
moueret, & hanc putrilagini obno-  
xiam maximè redderet: tum quia  
à medicamento calid. & siccitate  
digestis tenuioribus humoris par-  
tibus qui remanet, lapidesceret.  
Quare frequenter accidit ut impe-  
ritus medicus visu deprehendens  
imminutum scirrhum, hunc cu-  
raturum iri promittat, cum tamen  
durior effectus medicamento non  
facile depellatur. Medicamentum  
in humorem ita agat oportet, quæ-  
admodum Sol in rem quæ liquari  
possit, cera enim Soli apposita sen-  
sim

sim liquefit.ca.in 2.ord. sed siccum  
in primo fit oportet malacticum  
medicamentum. Quod à Galeno *5. simp.*  
malagma aut verè emolliens nun-  
cupatur. Medium quendam ordi-  
nem sortitur inter humectantia &  
siccantia, moliuntur enim induref-  
centium substantiæ veluti fusionē  
quandam, vt medullæ, pinguedi-  
nes, mucagines. Inter medullas  
primas obtinet ceruina, secundas  
vitulina, inter adipēs leoninus,  
anserinus, vrsinus, postea gallina-  
ceus, bubulus, hircinus, caprinus.  
Inter mucagines, althææ, fænu-  
græci, lini. A Galeno monemur vt *2. ad Glauco.*  
priùs partem scirrhi tentatam te-  
nuium partium oleo perfundamus,  
quale erat sabinum antiquum, vel  
rancidum, aut quale est id, quod ex  
pago quodā paruo milliari à nobis  
distanti, legitur, quod castrum no-  
uum vocant, est oleum de saxo, te-  
nuium partium, crasso, & illi quod  
Gal. omotribes vocat, plane con-  
trarium. Postea tentanda erunt se-  
quentia remedia.

℥.Rad.

520 *De Tumorib. præter naturam,*

℥. Rad. althææ, brionix, cucum. asinini sing.  $\mathfrak{z}$ . iiij. malu. viol. branchæ vrsi. sing. M. j. sem. lini, fænu-græci, althææ sing.  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . florum sambuci, cham. meliloti sing. p. ij. flo. viol. p. j. fiat decoct. in hydrelæo, de qua expressis spongiis veteribus foueatur crebro scirrhusus tumor, quo panno deterso admoveatur præsidium sequens.

℥. Facis prædicti decocti diligenter pistatæ & per cribrum medicum trāsfusæ lb. j. stercoris bubuli in aceto parum macerati  $\mathfrak{z}$ . iiij. adipis anserini & vrsini sing.  $\mathfrak{z}$ . iiij. facis olei de lilio  $\mathfrak{z}$ . v. misce, fiat cataplasma. Vel sic.

℥. Opopanacis, galbani in aceto forti dissol. sing.  $\mathfrak{z}$ . iiij. butyri recentis non saliti  $\mathfrak{z}$ . ij. æsopi q. s. mastich. & thuris sing.  $\mathfrak{z}$ . j. adipis bubuli & caprini sing.  $\mathfrak{z}$ . ij.  $\beta$ . lithargyri auri  $\mathfrak{z}$ . j. ceræ q. s. malaxentur manib. inunctis oleo de lilio, fiat ceratum. Vel sic.

℥. Caricarum pinguium elixarum triginta numero, pistentur diligenter

ligenter, ammoniaci thymiamatis,  
opopanacis recentis sing.  $\mathfrak{z}$ .ij. sty-  
racis liquidæ & mastiches sing.  $\mathfrak{z}$ .j.  
ß. muccag. sem. sænugræci & lini  
sing.  $\mathfrak{z}$ . ij. æsopi & butyri recentis  
sing.  $\mathfrak{z}$ . x. olei keirini & ex ricini  
semine sing.  $\mathfrak{z}$ . iij. ceræ q. s. ad ce-  
rati consistentiam reducantur. Vel  
sic.

℥. Rad.liliorum , altheæ probè  
elixarum & contusarum,ac per co-  
lum medicum transfusarum  $\mathfrak{z}$ . iij.  
adipis lupi,aquilæ,anseris,vulturis,  
sing.  $\mathfrak{z}$ .ij. adipis gallinæ  $\mathfrak{z}$ .iij.bdel-  
lij mollis & subalbidi q. s. olei se-  
samini , vulpini sing.  $\mathfrak{z}$ .iij. ß. ceræ  
citrinæ q. s. fiat magdaleon. Adde  
aceti parum. A balneis aluminosis,  
sulphureis prorsus abstinebit.

Quod si humor morbū faciens nō  
digeratur, sed in pus vertatur,cautè  
procedendum monet Gal. ne scir-  
rhus in cancerum propter medica-  
menti qualitatem degeneret, qua  
de re tunc medicamentis pus mo-  
uentibus vtendum erit,modicè ca-  
lidis,ne proritato humore ex scir-  
rho

522 *De Tumorib. præter naturam,*  
rho fiat cancer. Suppurati humo-  
ris notis apparentibus, aperien-  
dus erit in loco decliuore absces-  
sus, & emplastro diachylone mi-  
nore ireato vtendum suadeo, vt  
ea quæ remanet durities tollatur.  
In horum medicaminum vsu est  
perseuerandum, quippe quod re-  
bellis humor vice vnica digeri &  
euacuari non potest.

2. ad  
Glanc.

Suffitus aceti acris, præsertim  
quando scirrhus tendones infestat,  
ex candente pyrite lapide, aut mo-  
lari à Gal. plurimum commenda-  
tur, & vbi ammoniaco thymiamate  
emollitus facit tumor, quod  
acerrimo aceto eliquandum erit,  
hoc medicamento partem perfun-  
demus, à pice & bitumine absti-  
nendum erit, nam sunt iusto cali-  
diora.



*De Cancro.*

C A P. VI.

**C**ancer, quem *κάρκινον* Græci  
vocant, tumor est prædurus,  
inæqua

inæqualis, aspectu reter, venis exaltatis & turgentibus munitus, pungitiuo, molesto & graui dolori copulatus, qui tametti scirrho (de quo superiori capite fuit disceptatum) similis esse videatur, nihilominus symptomatis ab illo maximè differt, quia in cancro acutus & pulsatorius dolor percipitur, quo scirrhus, legitimus præsertim, est priuatus, cancer citò augetur, at scirrhus sensim, cancer fuscas & atras venas habet, scirrhus obscuras aut nullas, cancer magna ex parte ex se incipit, scirrhus alias ægritudines sequitur. Geminum constituit Hip. occultum solo tumore præditum, alium manifestum, vlceratum, tetræ olidam saniem eructantem. A cancro pisce nomen adeptus tum ratione figuræ, quia subniger ad cancri marini instar, tum quia illius animalis more pertinaciter hæret.

*De*

*De Cancris causis.*

## C A P. VII.

**C**ancrorum causa præcatartica ab his quæ scirrhus excitant, sola vehementia differunt, horum enim humor est mior. Corporeæ sunt humores atrabilarij à naturali melancholia, parum exusta progeniti, siccos cancos committentes, vel à maxime adassata, aut à flava bile retorrida acri & mordaci, quæ in terrâ projecta (aceti more) fermentat atque ebullit, quam fugientes muscæ & quæ insecta viuunt animalia plurimum oderunt, humidum & vlceratum ~~expulsum~~ gignit. Et quamuis huius materiam frigidam existimemus, quia terrea est, non tamen caloris expertem esse arbitrari debemus. Quippe quod sit vt cinis & acetum. Mariscarum aut mensum suppressio huic etiam magnam ansam suppeditat.

*De*



*De Cancro indicis.*

C A P. VIII.

**C**ancro tumor durissimus nigricans est, quamvis in illo tanta inflammatio non sit, quanta in phlegmone, & ob humoris crassici copiam venæ tum exaltatæ, turgidæ & varicosæ apparent. Dolores punctorij percipiuntur. Exulceratus erodit & carnem subiectam devastat, neque sisti & coerceri potest, saniem emittit quavis nequior, aspectu & copia ingratam, ipsoque odore abominandam. Cum incipit curari potest, sed cum iam altas radices egit, minime, quia crassus humor repelli ac digeri non potest. Mitioribus adhibitis præsidiiis non cedit, vehementioribus excandescit arque irritatur. Siccus & latens sæpe propter incautam victus rationem, vel acrium medicamentorum usum, in humidum degenerat: particularis est Elephas. Morbus



526 *De Tumorib. præter naturam,*  
Morbus hic pro variis quas occupat partibus, variis est appellationibus insignitus: nam si nares detineat, est polypus; si faciem, noli me tangere; si partem corporis mediam, cingulum; si totum corpus, Elephas dicitur. In omnibus corporis nostri partibus fieri potest, magis tamen in mulierum utero & mamillis, quæ sua priuantur purgatione.



*De Cancro curatione.*

## C A P. IX.

**H**uius morbi curatio periculosa ob causas à Gal. recensitas, tribus obseruatis scopis perficitur. Primus in præscribenda opportuna & proba victus ratione versatur. Danda in primis erit opera, ut aërem frigidum & humidum natura talem aut arte paratum deligamus, non crassum, sed purum. Abstinenti à bubula, agnina, camelina, hircina, asinina, vulpina,   
vete

veterum leporum , anserina carne  
erit. Lentibus, brassica, omnibus le-  
guminibus & salitis piscibus, eruca,  
linapi, cæpis, alliis, porris, pipere,  
aromatis, præterquàm croci mo-  
mento. Crasso & turbido vino,  
ira, mœrore, citato motu, inedia,  
sulphureis, bituminosis, atque alu-  
minosis balneis. Quæ frigida &  
humida sunt alimenta & euchy-  
ma vtilia, & quæ temperatum  
sanguinem gignunt. Probatur pti-  
sana, lactis serum, atriplex, bor-  
rago, beta, modo imbecillus non  
sit ventriculus, quia singultum mo-  
uet. Porcellorum iuuenum caro,  
agni iuuenis, lactantis vituli, per-  
dicum, gallinarum, pullorum, fis-  
cedularum & reliquorum carnem  
nigram minimè habentium com-  
mendatur. Oua sorbilia, hordei cre-  
mor, elixa pruna, vuæ passæ, pepo-  
nes, melopepones, cucurbitæ con-  
cedentur, quæ prima potius mensa  
quàm secunda mandi debent, tum  
quia aluum laxant, tum quia aliis  
cibis viam sternunt; postrema mēsa  
assumpta

528 *De Tumorib. prater naturam,*  
assumpta alia putrefaciunt. Furfu-  
raceus panis crassum humorem gi-  
gnens est plane inutilis, vinum sit  
album, tenue & oligophoron, aqua  
hordei dilutum, sit moderatus coi-  
tus, & ex longis interuallis factus,  
somnus suo tēpore vigiliis est vti-  
lior, vehemens & frequens corpor-  
is exercitatio noxia.

Secundus scopus noxiū humoris  
euacuationem estlagitat. In primis  
est diligenter considerandum, sit-  
ne corpus plethoricum & venæ  
sectioni assuetum, suppressas maris-  
cas aut menstruas purgationes ha-  
bens, tunc supposito prius clystere  
molli, tundenda erit axillaris, vel  
media cubiti dextri, vel tali vena  
interna, mittenda erit tanta fan-  
guinis copia, quantam ætas & tem-  
poris constitutio exposcūt. Deinde  
concoquendus & euacuandus in eū  
qui sequitur modum erit humor,

℞. Syr. de fumaris compos. &  
de succo endiuie sing. ℥. ij. syr. de  
pomis bene olentibus & viol. sing.  
℥. j. aquarum bugloss. cichor. sing.  
℔. ss.

*Liber IV. Cap. IX. § 29*

℞. β. santali moschatel. ℥. iiij. misce, fiat zulapium clar. & arom. capiat in 4. dosibus de mane. Vel sic

℞. Vtriusque buglossi. cum rae  
vtriusque cichorii, herb. capil. com.  
pimpinellæ, pilosellæ, fumarizæ,  
mercurialis, melissæ sing. M. j. quat.  
sem. frig. maio. contusorum sing. 3.  
j. passularum exacinarum, iuiubarum,  
sebesten & prunorum dulcium sing. pa. xij. sem. fœnic. anisi sing. ℥. ij. corticis citri sicci 3. iiij. glycirrhizæ recentis 3. j. foliorum sennæ, polypodij querni recentis sing. 3. ij. pulpæ tamarindorum 3. x. Epithymi 3. β. fiat decoct. & in col. ℞. j. β. diss. succi pomorum dulcium, syr. viol. sing. 3. iiij. syr. de succo endiviæ 3. ij. pulu. elect. diamarg. frig. & triasant. sing. ℥. ij. fiat apoz. clar. & arom. capiat in quatuor dosibus de mane.

℞. Præscripti apozematis 3. iiij. in quibus infunde rhabarb. optimi 3. j. β. cinamomi 3. vj. Expressione facta diss. confect. hamec 3. iiij. syr. viol. 3. j. β. misce, fiat potio, detur

Z fini

530 *De Tumorib. præter naturam,*  
finito apozemate cum decenti custodia. Vel sic pro delicatioribus.

℞. Folli. sennæ orientalis ʒ. iij.  
Epithymi & florum rorismarini  
cum seminib. quia medicament.  
humorem atrabilarium purgantibus  
robur addit, sing. ʒ. iij. infundantur  
in seri caprini ʒ. iij. per horas x.  
expressione diligenti facta, diss.  
diaprun. solut. ʒ. ij. rhabarbari  
optimi in aqua buglos. infusi & expressi  
ʒ. iij. manna granata ʒ. j. syr.  
de Epithymo ʒ. j. misce, fiat potio,  
detur ut dictum est.

℞. Theriacæ veteris, confer. borrag.  
sing. ʒ. j. β. sacch. parum, fiat bolus.  
capiat in crastinum horis quinque  
ante prandium.

℞. Conseruæ rosarum ʒ. j. confer.  
viol. borrag. sing. ʒ. vj. corticis citri  
sacch. conditi & myrobalanorum  
emblicarum sacch. etiam conditarum  
& vino albo lotarum sing. ʒ. iij.  
pulu. diamarg. frig. ʒ. 4. pulu. diarhod.  
ʒ. j. syr. de succo endiuia q. s. ad  
incorporandum, fiat in modum opiatae,  
de qua alternis diebus

bus horis antelucanis capiet ad quantitatem vnius castaneæ.

Si suppressæ sint mariscæ & perspicuæ non sint, has decocto emollientium herbarum fouebis, donec turgere incipiant, & ficus folio podicem fricabis, aut famelicas hiru-  
Apher.  
11.6.6  
 dines affiges. Nam melancholicis & maniacis harum fluxus saluber-  
 rimus existit. Si menstruæ purga-  
 tiones sint suppressæ, has venæ se-  
 ctione, vt superius ostensum fuit,  
 aduocabis, neque ab euacuationi-  
 bus cessandum est, donec totus ater  
 ille succus euacuetur. Alterandum  
 erit iecur, roborandum cor, exhi-  
 laranda anima sequentibus reme-  
 diis.

℞. Fragmentorum lapidum pre-  
 tiosorum sing. ʒ. ij. margaritarum  
 splendorum non perforatarum ʒ.  
 j. vtriusque corallij, rasuræ eboris  
 sing. ʒ. iij. sem. endiuia, portul. &  
 citri sing. ʒ. ʒ. corticis citri sacch. cō-  
 diti, myrobal. emblicarum sacch.  
 pariter conditarum sing. ʒ. iij. ʒ.  
 conser. rad. buglossi. & ros. sing. ʒ. j.

Z 2 con

532 *De Tumorib. præter naturam,*  
confer. viol. florū borrag. sing. ʒ. v.  
syr. de pomis bene olentib. q. s. ad  
incorporandum, fiat opiata, de qua  
alternis diebus duabus horis ante  
prandium capiet ad quantitatem  
vnius castaneæ, bibendo postea mo-  
dicum vini gilui vel albi aq. bugl.  
diluti. Vel sic.

℞. Manus Christi cum vnioni-  
bus ʒ. iiij. capiat interdium longè à  
suis partibus: hæmorrhoidum pro-  
uocatio non minùs in cancro quàm  
scirrho utilis.

℞. Cerati santal. aq. endiuidiæ  
loti ʒ. iiij. spicæ nardi, schænanthi  
sing. ʒ. j. olei viol. nenuph. sing. ʒ. j.  
ß. misce, illinatur hepatis regio bis  
aut ter in hebdomade hora introi-  
tus lecti.

Tertius scopus omnibus morbis  
ex fluxione genitis communis sua-  
det, vt humorem in partem fluen-  
tem reuellamus, & qui iam in affe-  
ctam procubuit digeramus. Pri-  
mum medicamentis modicè repel-  
lentibus tentandum, secundum  
Chirurgia, aut medicamentis sim-  
plici



plicibus à cæca qualitate, vel compositis nō minus idoneis exequendum. Pro simplicibus probantur lentes in aceto decoctæ, pistatæ & parti affectæ admotæ, coriandri succus, omnes intyborum species, metallica probè lota, & plumbum quouis modo administratum. Calitrici succus mirificè confert, quod pleriquē medici ab operationis præstantia herbam diuinam vocauere. Agrimonia cum radice, hypericum, iuglans rancida & contusa, oleum amygd. dulcium, oleum de Iunipero, cochlearum carnes elixæ & contusæ, cancri inflammationem extinguunt, superuacaneum humorem digerendi facultatem habentes, ranæ virides, humanum stercus cæca proprietate est admodum vtile, mustellæ in clibano assæ cinis salubris. Ex compositis sequentia.

℞. Succus solani, plantag. vermicularis depurati, vel succi consolida minoris, arnogloss. sing. ℥. ij. olei ros. omphacini ℥. iiij. ducantur optimè in mortario & pistillo plum-

Z 3 beo



534 *De Tumoria.præter naturam,*  
beo donec glutinis consistentiam  
acquirant. Conficiendum autem  
in radiis solaribus erit hoc medi-  
mentum.

Aliud.

℞. Cancrorum fluuiatiliū com-  
bustorum & aqua plantag. lotorum  
℥.j. plumbi vsti & aqua fontana lo-  
ti, tuthiæ præparatæ sing. ʒ. ij. ci-  
neris ranarum in clibano resicca-  
tarum ʒ. iij. cerusæ aqua rosarum  
lotæ ʒ. j. β. spumæ argenti ʒ. vj. suc-  
corum bursæ pastoris, arnogloss.  
sing. ʒ. ij. β. olei ros. omphacini, vel  
olei myrtini ʒ. v. vniantur in mor-  
tario & pistillo plumbeis tamdiu  
donec colorem nigrum acquirant.  
Vel sic.

℞. Terebinthinæ abietis aqua ro-  
sarum diligenter lotæ ʒ. j. corticis  
citri sicci ʒ. ij. olibani ʒ. iij. testudi-  
nis vstæ aqua fontana lotæ, atque  
in tenuissimum pollinem redactæ  
ʒ. β. solearū calceamétorum vstarū  
& pulueratarum ʒ. j. β. olei ros. om-  
phacini ʒ. v. Agitentur in mortario  
marmoreo & cum pauca cera alba,  
fiat

fiat vnguentum. Quidam aqua ex humano stercore vitreis organis destillata cancrum illinunt ab homine rufo excreto, huius etiam oleum quod post stillatitiã aquam ab organo emanat, conferre aiunt.


Si medicamentis præscriptis profligari non possit, ad Chirurgiam properandum erit, quem ferro rutilante cum omnibus suis appendicibus euellemus. Tentare id possumus cum cancrum carnosam aliquam partem & perspicuam detinere conspiciamus. Acribus non est medicamentis infestandus, ne sæuior & curatu contumacior reddatur. Quod si occultus sit, quemadmodum is qui nares & internam oris partem, muliebres locos, vel internam faucium sedem occupat, hunc non curare melius. At ea adhibenda erit diligentia quæ passioni sit idonea, nam curati citius iugulant; non curati diutius hominem vivere permittunt. Ulcerati cancri ( qui ex genere phagedenicorum ulcerum sunt ) simili-

536 *De Tumorib. præter naturam,*  
bus etiam præfidiis profligantur,  
quos candenti ferro aut pyrotico  
medicamento ex ipsa corporis in-  
superficie euellēs, nulla illius radice  
relieta, humoris atri colluuiem  
pressis diligenter vicinis partibus  
euacuabis, neque mitioribus vteis  
præfidiis, quippe quod illa contem-  
nant. De horum notis, causis &  
curatione nihil aliud dicemus, cum  
in hoc nostro libro de solis tumo-  
ribus præter naturam, & non de vl-  
ceribus agamus.

Cum hæc scriberem vocatus fui à  
Guilielmo Lauterio Chirurgo in  
artis operibus valde exercitato, vt  
senem octogenarium exsuccum, &  
ex montibus Sumeneis oriundum  
cum illo inuiserem, qui ob incau-  
tam victus rationem & metum à  
bellicis tumultibus obortum in vl-  
ceratum aspectuque horrendum  
cancrum totum penem obsidentem  
deciderat. Contemplata ætate &  
totius corporis constitutione, il-  
liusque viribus, deliberatum inter  
nos fuit de remediis quibus (non  
ad

ad extinguendum, sed potius leniendum morbum) vteretur. Metuebamus certè ne cauterio cancrum euellere tentantes simul & laborantis animum eriperemus. Vbi intellexit nos illum cum nostris præfidiis spreta Chirurgia ad suos relegare velle, ne bona præfidia infamaremus, cœpit detestari simul & deierare, se malle sectionem perpeti quàm diutius cum illo atroci summèque pernicioso morbo viuere. Tandem ne aliquam infamix notam nobis inurere malè feriat homines possent, cum sit omnibus luce meridiana clarius artem nostram omnium calumniis esse expositam, duos præstanti doctrina huius Urbis Chirurgos vocauimus, quo tutior esset de amputando membro deliberatio, qui importunis laborantis precibus victi, & atrocitate morbi, quo cruciabatur, vehementer commoti, deliberarunt annuentibus nobis de secanda vlcerata parte ferro rutilante. Adnotum fuit ad sistendam hæ-

538 *De Tumorib. præter naturam,*  
morrhagiam candens aliud ferrum  
post colis amputationem. Qui pro-  
fectò hanc operationem tam con-  
stanter macilentus, tremulus & ca-  
pularis senex cum orco iam certa-  
re paratus perpeſſus eſt, vt vultum  
magna mulierum & medicinæ can-  
didatorum qui me comitabantur  
admiratione, non mutarit. Tandem  
decisa eſchara, & adglutinando  
ulceri adhibitis præſidiis, præter  
omnium ſpem magnum hoc peri-  
culum euasit, & nunc optata ſani-  
tate fruitur.




*De Varicibus.*

C A P. X.

**V**arices, ἰζλαί, vel οἱ κίπροι ve-  
næ in quacumque partē di-  
latatæ dicuntur, ab imbe-  
cillitatis vitio progenitæ, quæ in  
testibus & cruribus frequentiùs, ac  
in omni parte prona venis muni-  
ta dilatari ſolent; nonnunquam in  
ventre, inguinibus, palpebris,  
ipſiſque

ipsisque temporibus, sed tardius; ab aliquibus vites nuncupantur, & variis orbibus & gyris instar capreolorum vitis, & hederæ implicatæ conspiciuntur. His Marium Romanum aliquando in ambo- bus cruribus laborasse Plutarchus Chæroneus scriptum reliquit: qui harum sectionem patienter in vno crure tolerans, curandum alterum Medico porrigere recusavit, noscens remedium tam magnis doloribus esse indignum. Est igitur varix folius venæ, & non arteriæ affectus, quod vena arteria sit mollior, tenuior, & minus robusta. Quare his de causis dilatationi præptior, sinistras corporis partes dextris magis distorquet, & baiulos magna onera ferentes aliis frequentius imperit.




*De Varicum causis & signis.*

**C A P. XI.**

**V**aricum prægressæ causæ sunt, alimenta omnia quæ atrabilarium, aut pituito-

540 *De Tumorib. præter naturam,*  
sum sanguinem gignunt, de quibus  
variis locis superius fuit facta men-  
tio : his addere desidem vitam , &  
prætermiffa exercitia moderata  
possumus. Signa quibus has depre-  
hendamus , sunt tam perspicua, vt  
maiori indagine non egeant; neque  
conspicientem fallere possint.



*De Varicum curatione.*

C A P. XII.

**I**nstituta prius victus ratio-  
ne euchyma , & generandis  
crassis succis aduersa, purga-  
tisque vere & autumno melancholico  
succo, aut secta eiusdem partis  
iecoraria, adstringentibus, digerentibus,  
atque exsiccantibus medica-  
mentis tentatis, lata fascia, ligaturis,  
quæ ad superiores partes sæculentū  
humorem detrudere possint, vtendum  
plerique suadent. Quæ si non  
conferant, ad Chirurgiā properan-  
dum erit, obsignata prius atramēto  
crassa vena propaginum radice, quæ  
incisa

incisa paulo supra poplitis regionē  
cute, acu & filo in superiore & in-  
feriore parte hamulis erit deprehē-  
denda, fortique nexu vincienda.  
Secta tandem parte media laxan-  
dus erit venæ inferioris nexus, vt  
digitis compressa melancholicum  
sanguinem in inferiorem defluen-  
tem partem, vlcusque aut alium  
affectum fouentem euomat. Expur-  
gato tandem sanguine ad collecti-  
ca medicamenta & epulotica dicta  
transeundum erit. De dracunculo,  
quem venam medem Auicennas  
vocauit, in India & superioribus  
Ægypto locis genito, cum priscis  
medicis vix fuerit cognitus, & à no-  
bis nunquā visus, hic agere nō de-  
creuimus. Sat erit huius curationē  
ex Sorano, Leonida, & Paulo intel-  
ligere. Varices si vlceribus proximę  
sint, illorum curationem remoran-  
tur. Quapropter prius sunt secan-  
dæ, vt humoris fæculenti in vlcus  
defluxus coërceatur, quàm vlcerum  
curationem aggrediaris.

*De*



*De Hæmorrhoidib.*

## C A P. XII

**H**æmorrhoides sunt  
midæ, exaltatæ, dilata-  
tissimi similes, in summi  
testini parte apparentes  
sanguine plenæ, varicibus  
sanguinis frequenti fluxu  
Harum quædam sunt tur-  
guinem non eructantes (quæ  
vocant) quædam aperta  
ora habent, & sanguinem  
quam serosum, frequenter  
vomitum. Cuius  
hæmorrhoids appellatur.  
hæmorrhoidibus dictus est  
rhous serpens, quod ex il-  
lis multa fiat sanguinis  
Alio nomine mariscæ  
quod fici, Iuuenali teste,  
repræsentent.



*De Hemorrhoidum causis.*

C A P. XIV.

**H**Arum causæ præcatarticae sunt, assiduus melancholicorum ciborum usus, diuturna sollicitudo, mœror, & quæcunque varices excitare sunt solitæ. Corporeæ sunt melancholici succi, quos iecur aut totum corpus ad ipsas deponit, vel cessans ex naribus aut locis in mulieribus sanguinis euacuatio, hæmorrhoidum fluxus, per quem sanguis melancholicus euacuatus à multis morbis illud vindicat, ut mania melancholia morbo, varicibus, cæcro, elephantiasi, lethargo, phrenitide, indurato liene renum vitiis, ut facile videre est apud Hip. aph. xj. lib. sexti, & sexto de morbis popularibus sect. 3. Qui omnino suppressus est, melancholiam, hydropem, tabem & innumeros morbos parit, à quibus cum parcè fluit  
nos

544 *De Tumorib. præter naturam,*  
nos liberat. Igitur quemadmodum  
ex toto suppressæ hæmorrhoides,  
ita nimium fluentes sunt periculo-  
sæ. Ex venæ portæ ramis hunc san-  
guinem melancholicum fluere ex  
humani corporis historia est per-  
spicuum.



*De Hæmorrhoidum notis.*

C A P. X V.

**M**ariscarum signa ita sunt  
perspicua vt neminem la-  
tere possint, dolor tumori  
copulatus, in podicis circulo perci-  
pitur, punctio cum sanguinis ma-  
natione, interdum sine ipsa ean-  
dem regionem infestat, vbi sanguis  
non manat, tunc arte prouocatur,  
morbumque leuat: immodicè ex-  
cretus, malum corporis habitum  
quem Græci cachexiam vocant, hy-  
dropem hepate perfrigerato, & fa-  
cultatis naturalis summam imbe-  
cillitatem; demum mortem asserre  
solet. Quod si fluentes importunè  
sistas

sistas non minores excitabis affectus.



*De Hemorrhoidum curatione.*

C A P. X V I.

**A**Ntequam huic morbo, qui (Aëtio teste) nonnunquam deformitatem propter coloris totius corporis vitium ex evacuatione succedēs parit, medeamur; est accuratè animaduertendum, an immodicè fluant, an omnino sint suppressæ & hominem doloribus defatigent, & ad multos morbos hoc deteriores pronos reddant. Quod si tumidæ sint & cruorem non vomentes, obseruandi tunc erunt tres scopi. Quorum primus ad victus rationis institutionem nos ducit. Minuendus itaque erit cibus, & ab alimentis corpus maximè alentibus & sanguinem adaugentibus abstinendum, à melle & aromatis, aceto, brassica, leguminibus, antiquo casco, oriza, hordei cremo

546 *De Tumorib. præter*  
cremore, elixo frumento,  
ctuca, borragine, oxalide  
dum, pane hordeaceo &  
confeclo vtendum, elix  
passulis aut mercurialis  
alius erit laxanda: qui  
aridum stercus podici do  
cutiens, has tumidiore  
Exercitatio & equitatio  
molesta. Probatur etiam  
cassiae fistulae paulo ante  
mannae siue roris aërei vi  
potio vini potioni præfer  
steres tametsi molles, qui  
recti intestini partem gra  
lestant, nisi magna vrgen  
tate non probantur, l  
glandes ex acribus præfer  
camentis paratae.

Secundus scopus in d  
tigatione versatur, qui  
sæuius est vt corporis rob  
mè deiiciat, febremque  
Quem præsidiis sequent  
sopiemus.

℥. Althææ cum rad. m  
sing. M. j. sem. lini, fenugra

ſing. ꝑ. ij. florum viol. ꝑ. ij. florum  
chamom. melilot. ſambuci an. ꝑ. j.  
fiat decoct. pro enchatismate, ut  
rur frequenter. Poſtea vnguento  
ſequenti inungatur.

℞. Olei de chriſomiti, de ſemi-  
ne lini ſing. ꝑ. ij. butyri recentis in-  
fulſi ꝑ. iiij. vitellorum ouorum re-  
centium num. ij. croci ꝑ. j. ceræ q. s.  
fiat linimentum, illinantur partes  
affectæ, addendo foliorum nym-  
pheæ reſiccatorum ꝑ. j. ſ. dolore  
perſeuerante, conſentientibus ætate  
& viribus tundenda erit iecoraria  
cubiti dextti. Quod ſi horum re-  
mediorum uſu dolor non con-  
quieſcat, ſed perſeueret, ex vitello  
oui, oleo roſaceo, croco & pauca  
opij quantitate parabitur vnguen-  
tum.

Tertius ſcopus hortatur ut pen-  
dulas & ſenſui manifeſtas mari-  
ſcas aperiamus phlebotomi cuſpi-  
de, vel hirudine famelica, quæ ſag.  
in vaſis contentum citra tædium  
educet. Illinendæ erunt hæmor-  
thoides pulli aut columbi cruore,

548 *De Tumorib. præter naturam,*  
ut promptius expeditiusque vasis  
affigantur, quas sanguine plenas &  
turgētes pauco sale capiti asperfo,  
aut pauco oleo decidere faciemus.  
Cæcas acribus balanis ex sapone  
gallico, colocynt. pulpa, Ciclamini  
succo, vel ficulnei folio, sollicitabi-  
mus: fluentibus autem immodicè  
mariscis, præscribenda erit ante  
omnia victus ratio infrig. & hu-  
mectans, sanguinemque crassiores  
reddens.

A laboriosis motibus abstinendū  
suademus, ab altis cogitatibus, &  
aliis animi pathematis, quæ ferui-  
dum sanguinem gignunt; & quam-  
uis astringentia medicamenta sang.  
sistere sunt nata, ea tamen non sunt  
vsurpanda, quod fæces duriores ef-  
ficient, quæ cum excernuntur sæ-  
uos cruciatus podici incutiunt.  
Quapropter non solum infrigidan-  
te, sed leniente facultate prædita  
sint oportet. Deinde reuulsio vti-  
lissima erit secta basilica cubiti dex-  
tri, missa parca sang. quantitate,  
aut admota lati oris cucurbitula.

Myro

Myrobalani emblicæ facch. conditæ sunt ex vsu , conserua rosarum vetus, & maioris consolidæ ( quam symphytum vocant.) A multis confectio de scoria ferri probatur. Cuius præscriptum à Mauritano Rhase est petendum , huius 3. j. aquæ calybeatæ, aut illi in quama- stiche chia deferbuerit, vel plantagininis, commodè miscebitur. Ad exsuccarum fæcum depulsionem ex vsu erunt pill. de bdellio , quarum duas deglutiendas propinabis, & in balneum ex sequentib. medic. paratum ægrotantem mittes.

℞. Foliorum plantag. verbasci, lentisci, rubi sing. M. j. rosarum rub. p. j. baccarum & foliorum myrti sing. p. j. β. nucum cupressi, acaciæ sing. 3. ij. fiat decoct. in duabus partibus aquæ calybeatæ, & vna vini rubri ad medias pro balneo. Idem præstare dicitur aloë, ferri squāma, plumbum vstum cum posca , acacia, plumbago, chalcitis, asininum stercus arefactum , vstum & in tenuissimum pollinem redactum.

Quod



Quod si lógo tépore flux  
morrhoides, non omnes i  
sententiam sunt supprim  
cam quam Gal. affert  
mento rationem, ne ex ea  
tione grauius suboriatu


Aëtius Gal. contrari  
Hip. interpretari conatus  
possibile esse incolumes e  
optimum curationis finem  
post hæmorrhoidum ext  
eos qui opportuno temp  
sectione, & conuenienti  
tione vtuntur: quemadmo  
placuit, qui ait; Hæmorr  
nanti antiquas si nō asseru  
periculum est tabem aut  
succedere. Non enim velu  
opinantur, dixit, si vna r  
seruata hæmorrhoids ad sa  
tionē. Sed sic scripsit, si n  
tur, hoc est conuenienti c  
tur. Est autē sanatio perfe  
bo liberatio & legitima c

Quo fit, vt iuxta Hip.  
nullā relinquere oporteat  
nes prorsus delere. Post q

tegram sanationē opportuna victus ratione ad naturalem habitū ægrū ducere oportet, adiecta iugiter venæ cubiti sectione, quoties in vniuerso corpore molem sang. collectā verebimur. Laboriosā hæmorrhoidum curationem scripsit Paulus, præsertim quando plura venarum ora in ano patefcunt. Quare vnam non suppressam purgationis ergo relinquere oportet.

Quo fit, vt Pauli & Galeni, Aëtij sententia sit melior & tutior. Nam tempestate nostra, corpora incauta victus ratione vtentia, non ita medicæ artis placitis parent, non ita remedium vsum se accommodāt, vt suppressis omnibus venarū oris, vitiosus sang. in corpore collectus & retentus morbos ab Hip. in aph. recensitos non excitet. Et quamuis purgatio illa sit homini molesta, nihilominus vbi assuevit, hanc tam facile vt menstruas purgationes mulier à prædictis periculis immunis perfert. Nonnunquam spretis remediis vbi contumaces sunt, ad  
Chirur

552 *De Tumorib. prate*  
Chirurgiam migrare c  
volsella eo quo ab Aëti  
modo deligatas amputa  
ex his sinuosa vlcera  
quæ ægrotanti maxim  
tium facescere solent.



*De Psora & Le*

C A P. XV

**A**ffines sunt isti aff  
giosi sub scabie co  
solam cutem occupant  
lepra elephantia dicta a  
soliis cutis sint vitia  
verò carnis, & vbi radic  
runt, figura, magnitudi  
tate inter se differunt  
vterque affectus sit cū  
dine, & pruritu, corpor  
tione & ab eodem hum  
riat. Psora tamen corp  
ciem variis figuris lædi  
cea quædam recrement  
Lepra cum perspicuis  
circulum cutem ipsam  
depascitur. Ab impeti

λεῖχλω Græci vocant differunt. Tamen si ex impetigine de qua superius egimus, psora & lepra nascantur.



*De Psoræ & Lepre causis.*

C A P. XVIII.

**P**Soræ, lepræ, & omnium scabiei specierum causæ procatarticae sunt nimia comestio, continuus salforum, acrium, linguam ferientium eduliorum usus, quos affectus etiam promouent dulcia, amara, generosa & meraciora vina, & ea quæ recrementa ad cutem protrudunt, ut ficus. Insuper prætermissa assueta balinea, sordidarum cōtinuus vestium usus, immoderatus labor iugibus vigiliis comitatus. Quibus malis senes sunt admodum obnoxij ob cutis imbecillitatem. Corporeæ causæ sunt exustus sang. bili feruida mixtus. Hepatis intemperies maximè calida melancholicum succum

A a                  cum

554 *De Tumorib. præter naturam,*  
cum gignens vel falsam pituitam:  
harum dispositionum pathema  
commune est, pruritus & post pru-  
ritum pro varia humoris natura  
punctorius dolor nonnunquam  
paruus, sæpe magnus. Pforæ & le-  
præ continens causa est melancho-  
licus succus, in pfora minus, in le-  
pra magis exustus. Fiunt cutis adsi-  
milatrice facultate labefactata.



*De Pforæ & Lepre notis.*


C A P. XIX.

**P**Sora & lepra tametsi per  
viam signi sint mali morbi,  
nihilominus per viam cau-  
sæ non admodum perniciosi cen-  
sentur, eo quod natura expultrice  
facultate duce recrementa ad cu-  
tem commune corporis emuncto-  
rium deponit. Pruritus ab utroque  
morbo inseparabilis existit, sed in  
lepra vehementior, ita ut æger sca-  
bendo non iuuetur, sed deterius  
habeat. In lepra terreus sæculen-  
tusque

tusque ille humor cutem vehementius quàm in pſora exasperat, in qua ſubiecta minus afficitur caro. Solius cutis vterque eſt affectus. Squamulas inſuper lepra habet, ſed furfuracea recrementa pſora, cum à minori intemperie, humore minus craſſo & terreſtri & maligno gignatur. Et quemadmodum pſora ad lepram prodromus veluti quidam dicitur, ita lepra ad elephantiaſin eſt præuia. Lepram igitur mediam inter elephantiaſin & pſoram conſtituemus.

Porro iſti affectus à λευκῇ, alba videlicet vitilagine (quam Albaras Auicennas vocat) ſunt varij: nam in illis cutis ſcabra eſt cruſtis & furfuraceis recrementis plena, cum eliquatione quadam ſine aſpredine & roſione, alba inſuper ſubiecta carne, ob pituitæ præſentiam. Eſt & alter affectus tibias & ſuras occupans, vlceroſus & nigris eſcharis obductus (quem malum mortuum medici qui in Arabum ſcholis educati fuere vocant) cuius cù-

356 *De Tumorib. præter naturam,*  
ratio potissimum quando vlcus ra-  
dices iam egit suspecta habetur.  
Quibus affectibus obnoxij sunt  
balnea negligentes, atque crudis  
humoribus præditi, sordidi, & præ-  
ua alimenta ingerentes.



*De Psora & Lepre curatione.*

C A P. XX.

**I**dem ferme remediis affe-  
ctus isti profligantur inten-  
sione sola & remissione dis-  
sidentibus. Curatio itaque horum  
tribus scopis perficitur. Primus ad  
utilis dietæ institutionem nos vo-  
cat. Secundus ad antecedentis cau-  
sæ euacuationem. Tertius ad topi-  
corum remediorum vsum quibus  
vlcuscula curemus, furfuracea re-  
crementa detergamus, cutem robo-  
remus, & calidam hepatis intempe-  
riem leniamus.

Vt primi scopi compotes efficia-  
mur alimentis melancholicum suc-  
cum generantibus agroto interdi-  
cemus,

cemus, de quibus 3. de loc. passis  
fussimè Gal. differuit, & cap. de  
Scirrho & Cancro à nobis facta est  
mentio. Quorum loco quæ infrigi-  
dant simul & humectant, admini-  
stranda erunt quæ in cibo medicinā  
esse dicuntur. Aquæ potus vīno est  
præferendus, Venus admodum no-  
xia, subuculæ; vestimentorum non  
sordidorum crebra mutatio salu-  
bris, labores immoderati fugiendi,  
altis cogitatibus, iræ, tristitiæ, vigi-  
liis iugibus parcendum.

Ad secundum scopum transeun-  
tes consultis prius viribus & con-  
templata corporis constitutione  
ipsiusque ætate, supposito prius  
alium emolliente clysmate, vel  
propinato copragogo medicamen-  
to, à venæ sectione exordienda erit  
curatio, tundenda iecoraria aut me-  
dia cubiti dextri, mittendæque tan-  
ta sang. copia, quantum ægrotantis  
robur & ætas permittent. Mox ag-  
gredienda erunt sequentia reme-  
dia, vt tertij scopi cōpos efficiaris.

℞. Rad. graminis, rusci, aspara-  
gi, acetosæ sing. ʒ. j. scabiosæ, sum-



558 *De Tumorib. præter naturam,*  
 mitatum lupuli, vtriusque bugloss.  
 vtriusque cichorij cū radicibus, la-  
 pati acuti, herbarum capill. com. fu-  
 marię, mercurialis sing. M. j. qu. sem.  
 frig. mai. contusorum sing. 3. j. pul-  
 pæ dactylorū acidorum 3. j. pruno-  
 rum acidorum, passularum exaci-  
 natarum sing. pa. xxx. rad. dulcis 3.  
 vj. sem. anisi 3. ij. foll. fennæ, poly-  
 podij querni recentis sing. 3. iij.  
 Epithymi 3. β. florum buglos. viol.  
 nymphææ sing. p. j. fiat decoct. in  
 aqua hordei perfectè cocti, & in  
 col. lb. j. β. diss. syr. de succo endiuia,  
 syr. viol. sing. 3. iij. sacch. albißimi  
 3. ij. pulu. triasant. 3. iij. fiat Apoz,  
 pro iij. dosib. mat. in vltima diss. ca-  
 thol. opt. & diasen. sing. 3. ij. β. fiat  
 potio danda post vsum præcedentis  
 apozematis cum decenti custodia,  
 & bono artis regimine.

℞. Conseruæ rosarum 3. j. con-  
 ser. viol. florum cichorij & rad. bu-  
 glos. sing. 3. vj. puluer. elect. triasant.  
 & diamarg. frig. sing. 3. j. sem. me-  
 lon. & cucurb. mundati, & in te-  
 nuissimum pollinem reducti sing.  
 3. ij.

℞. ij. syr. viol. aut de succo endiuivæ  
q.s. ad incorporandum, fiat in mo-  
dum opiata, de qua singulis diebus  
capiet ad quantitatem vnius casta-  
neæ horis duabus ante prandium,  
cuius loco horis antelucanis sor-  
bere poterit ℥. v. aut vj. feri caprini,  
in quo per noctem folia fumariæ  
maduerint, expressione facta, misce  
sacch. albiss. ℥. j.

Balnea non sulphurea, nitrosa, bi-  
tuminosaue commédantur: sed quæ  
lenientem, detergentem, roboran-  
tem cutem facultatem sunt adepta,  
qualia sequentia.

℞. Rad. serpentariæ maio. pedis  
vituli, cucum. agrestis, sing. M. ℞.  
acetosæ cum suis rad. vtriusque ci-  
chorij, rostri porcini, lapati acuti  
cum toto, parietariæ, lanariæ, siclæ,  
mercurialis, lenticulæ aquæ, fol.  
nymphææ sing. M. 4. cantabri bene  
macri p. iiij. qu. sem. frig. maio. cōtu-  
sorum sing. ℥. iiij. pisorum alborum  
fractorum p. ij. florū fabarum, viol.  
nymphææ, bugloss. sing. p. iiij. fiat  
decoctio in aqua pluuiæ aut fonta-

560 *De Tumorib. præter naturam,*  
na, sit cum ingredietur tepida decoctio. Hoc ieiuno vetriculo agendum, & lectum ingressus parcè sudet, 4. aut 5. dierum spatium continuabit. A balnei vsu cum corpus somno credere studebit, partes psora lepræue tentatas, demptis thorace imoque ventre sequenti vnguento illinet.

℥. Axungia suillæ insulsæ ℥. β. spumæ argenti ℥. x. hydrargyri cum suo liquore extinctæ q. s. staphisagria & farina lupinorum sing. ℥. iij. chalcitidis ℥. ij. sulphuris apyreti ℥. j. styracis liquidæ ℥. vj. tercbinth. ℥. j. olei ros. ℥. v. olei de vitell. ouorum ℥. ij. Agitentur in mortario marmoreo, fiat linimentum. Adde succi limonum ℥. j. β. Vel sic.

℥. Succi scabiosæ, anemonæ, fumarie sing. ℥. iij. olei ros. ℥. β. olei de vitell. ouorum ℥. ij. Decoquantur ad succorum consumptionem: misce postea confect. pomatæ recentis ℥. iiij. axungia porci sine sale ℥. β. sublimati ℥. j. β. lithargyri auri ℥. j. β. cerusæ aqua rosarum lotæ  
3. ij.

℥. ij. sulphuris ignem non experti  
℥. j. styracis liquidæ ʒ. x. rad. vitis al-  
bæ resiccatae & in pul. redactæ ʒ. vj.  
Agitentur fortiter in mortario  
marmoreo & pistillo buxæo, fiat li-  
nimentum. Hoc remedio inuetera-  
tam alicuius mercatoris lepram su-  
perioribus diebus curavi.



*De Elephantiasi.*


C A P. XXI.

**E**Lephas contagiosus & com-  
munis vniuerso corpori  
morbus, cuius cutem durio-  
rem, crassiorem & ferinam efficit;  
ab elephante maxima inter qua-  
drupedes bestia nomen est sortitus,  
quod laborantis artus sint defor-  
mes, tumidi & cutis elephantis co-  
lor similis, qui dum radices altas  
ēgit præsidia contemnit, quo fit vt  
ope medica profligari non possit:  
periculo plenus, hominem sanum  
inficit non secus quàm pestilentia,  
aut venerea lues, & hunc à morta-

A a 5 lium

562 *De Tumorib. præter naturam,*  
lium sodalitio exulare cogit, quod  
inquinetur aër quem inspirando  
attrahimus, ex corrupta inspiratio-  
ne. Estque corporis carcinoma vni-  
uersale. Et quemadmodum scriben-  
te Aretæo lib. 2. de diuturnis affect.  
elephas nulli alteri animali similis  
est: sic neque hic morbus alteri  
morbo; & ut vita longissima ali-  
quando est, ita hic morbus est  
maximè diuturnus. Aëtius ex Ar-  
chigenis sententia hunc foedum  
morbum leontiasin vocauit, eo  
quod frons ægrorum cum tumore  
quodam relaxatur, perinde ac flexi-  
lis cutis superciliorum leonis. Ab  
aliquibus satyriasis dictus est, à ge-  
narum rubore & facie satyris  
perfimili, ob inextinguibilem & impu-  
dentem coëundi libidinem. Hunc  
etiam morbum ex veteribus pleri-  
que *ἡράκλειον* appellarunt; hoc est,  
Herculeum, quod nullus sit maior  
& violentior. Morbi huius vete-  
rum lepra præcursor esse solet.

*De*



*De Elephantiasis causis.*

C A P. XXII.

**E**lephantiasis causæ præcætarcticæ sunt similes his quæ lepram & psoram pariunt, sola magnitudine differunt. Nam cum morbus, ut paulo superius fuit dictum, sit magnus, causarum magnitudinem promittat oportet. Omnia itaque humorem atrabilarium gignentia, hanc perniciosam ægritudinem commouent, ut magnus regionis æstus, asininæ, hircinæ, vulpinæ carnes, coclearum, brassicæ, leguminum, acrium, salforum eduliorum creber usus. Ob has causas Gal. hunc affectum Alexandriam incolentibus familiarem fuisse credidit. Concubitus cum muliere Elephantica, vel menstrua purgatione detenta, mensium & mariscarum intempestiua suppressio, quartana febris, inquinatum parentum semen, &

564 *De Tumorib. præter naturam,*  
meracioris vini potus assiduus.  
Quò fit, vt apud Scythas lactis po-  
tatores, hic morbus nunquam ap-  
paruerit.

Antecedentes causæ sunt, lie-  
nis à limoso humore sang. expur-  
gare nequeuntis magna imbecil-  
litas, aut hepatis calor immode-  
ratus melancholicum exustum san-  
guinem procreantis, qui vbi in  
vasis ipsis, aut extra computre-  
scit, assiduæ vel intermittentis fe-  
bris est causa. Vbi in aliqua par-  
te coaceruatus, propriæ naturæ  
limites non multum prætergres-  
sus scirrhum, adassatus modicè  
cancrum siccum, vberius verò  
vulneratum parit. In omnem cor-  
poris habitum protrusus Elephan-  
tiasin committit. Sæpe humor  
sincerus non est, sed sanguini,  
aut pituitæ mixtus, & pro va-  
rio misturæ modo, variæ elephan-  
tiasis differentiæ consurgunt, vt  
probè à Cornelio Celsò & Pau-  
lo est traditum. Quod ex fa-  
cici colore & symptomatis perspi-  
cuum

cum euadit. Omnium deterior est qui ex bile retorrida, aut exusta melancholia fit : qui cum altas radices egit, vniuersum corpus vlceribus scatere facit, & extrema decidere.

Continentes & maximè propinquæ causæ, error insignis adsimilatricis facultatis in ipsa carne. Nam cum tres sint nutritionis facultates, præcipuæ, quibus 4. ancillantes suppetias ferunt, læsa ea quæ anadosin alimenti facit corpori atrophiam inducit. Adglutinatrice labefacta hydropes tentatur corpus. Sed adsimilatrice postrema cæterisque perfectissimâ vitiata elephantiasin gigni tam verum est quàm quod verissimum, in qua non solum proprium carnis temperamentum ab exusto & venenato humore euersum est, sed ipsum tegentis cutis. Nam si sola isto exusto succo infestaretur, vitiligine corpus inolestari videremus.



*De Elephantiasis indicus.*

## C A P. XXIII.

**H** Vius scelestæ dispositionis  
 notæ sunt variæ, quædam  
 fientem elephantiasin, quæ-  
 dam verò factam ostendunt. Fienti  
 præcautio debetur ( quæ quodam  
 modo curatio est : ) sed factæ &  
 confirmatæ curatio, quam cum as-  
 sequi non potest medicus ( tum quia  
 in remotis à principibus extis ma-  
 teria continetur, & carni ita est im-  
 pacta ut illam in suam naturam  
 traxerit : tum quia crassitie sua ita  
 est pertinax, ut nullis medicamen-  
 tis digeri possit, neque squalida il-  
 la & arida intemperies domari, ut  
 à siccitate contractis morbis acci-  
 dit, ( quod fuit à Gal. in method.  
 curatiua demonstratum ) conatur  
 nihilominus curatione illa quam  
 fucatam plerique vocarunt, medi-  
 camenta præscribere, quæ morbi  
 furorem reprimant & illius incre-  
 mentum

1. de  
 feb. diff.

2. Met.

mentum remorentur.

Notæ itaque fientis petuntur à distemperatura calida & sicca hepatis, fœdo faciei colore, psora, lepra, vitiligine, vitiato parentum semine, carnosæ substantiæ tuberculis, partium stupore, melancholicis insomniis, deprauata victus ratione atrabilarium humorem procreante, dolosis & fraudulentis moribus. Cum enim harum aliquæ apparêt, dispositionem, non habitum pollicentur : quæ infidæ sunt, nisi sit harum syndrome siue concursus. Quæ hominem laborare declarant, à faciei parte totius corporis maxime rara, humida & multorum affectuum nuntia desumuntur. Apparent enim oculi consumpto humore propriorum muscutorum rotundi, tenebrosi nonnunquam, sæpe ophthalmici, cum intuitu toruo, glabris superciliis & ciliis, sparsi per faciem tumores duri, narium deformis compressio, eroso ipsarū septo, voce catulina & rauca, cum venarum quæ sub lingua sunt plenitudine,

568 *De Tumorib. præter naturam,*  
nitate, multisque tuberculis ac aurium rotunditate contractioni copulata, olida insuper anima, innumerisque vlceribus curationem respicientibus. Et cum hic morbus, docente Archigene, principio nos lateat, nulla medicina reprimi potest. Nam quando tumores in corporis partibus apparent, tunc morbum non inchoare, sed perfici existimemus oportet, qua de causa est curatu contumacissimus. Ob hoc rectè ab Auicenna scriptum est, hunc ab interioribus auspiciari, & se in exterioribus prodere, neque cessare donec rursus ad interiora peruenierit, ipsaque ita labe factarit, ut mors sit in præcinctu. Quando præ siccitate nimia extremæ corporis partes vlceribus scætant, & illarum soluitur continuum, tunc signa sunt ita aperta, ut etiam rudem agricolam non lateant.

Generosi, atque Hippocratica arte digni medici, officium est, quæ prædicta sunt signa ita obseruare;  
ita

ita horum vires examinare, vt cū ad ipsum de proferenda sententia iudicium spectet, qui à sanorum contubernio sint segregandi, qui illorum sodalitio frui debeant, rectè deliberare sciat: quippe quod maximè impium sit, & à Christiana pietate alienū, horrida hac colluie infectos cum sanis versari, & fanos egrotis misceri. Quare probè legibus sancitum est, vt hac contagione laborantes à sanorum sodalitio semoti, in tuguriolis miserabilem vitam ducant.



*De Elephantiasis curatione.*

C A P. XXIV.

**P**Ræcautio quæ ad hanc affectionem dispositis propria est, tribus perficietur scopis. Quorum primus nos admonet ne morbum faciens humor gignatur. Secundus, vt qui iam procreatus est euacuetur. Tertius, vt hepatis & lienis calida intemperies procul pellatur. Humoris noxij generatio-  
nem

570 *De Tumorib. præter naturam,*  
nem præpediemus administratis  
euchymis, vel modicè infrigidanti-  
bus & humectantibus alimentis, &  
aliis non naturalibus rebus, ad si-  
miles qualitates inclinantibus, qua-  
rum ex supradictis notitia haben-  
da est. Vino omnino interdicere  
oportet, & lacte copioso vti salu-  
bre. Secta vena concoquentibus &  
melanagogis medicaminibus ( de  
quibus superiùs habitus est sermo)  
hunc melancholicum succum edu-  
cemus, inter quæ veratrum nigrum  
bene præparatum, si suscipiendo  
tali medicamento dispositum sit  
corpus, iure optimo primas tenet.  
Quod cum sit ex perniciosorum  
medicamentorum classe, delibera-  
tione matura à perito medico erit  
administrandum. Danda tamen  
est opera, vt ea quæ à nobis aluum  
laxantia medicamina præscribun-  
tur, humidam consistentiam potiùs  
quàm duram & siccam sint adepta:  
cum talia corpora humida potiùs  
quàm sicca efflagitent. Quare ca-  
tapotia parum vtilia esse censemus:  
neque

neque vna purgatione sat est, sed pluribus vicibus repetita, hepati & lieni intemperie calida & obstructionibus laborantibus, sequentibus remediis prospiciendum suademus.

℞. Conseruæ florum cichorij, rad. bugloss. & florum borrag. sing. ʒ. j. conser. florum nymph. & viol. sing. ʒ. vj. pulu. diamarg. frig. ʒ. j. β. pulu. triasant. ʒ. j. sem. melon. & cucurb. mund. & in pollinem tenuiss. redact. sing. ʒ. iiij. syr. de pomis bene olentibus q. s. ad incorporandum, fiat adinstar opiatae, de qua singulis diebus horis duabus ante suos pastus capiet ad quantitatem vnus nucis comestibilis, bibendo postea cochlearia duo aquæ endiuiae & fumariae.

℞. Omnium santal. sing. ʒ. ij. coral. rub. ʒ. j. β. rosarum rub. florum viol. & nymphaeæ sing. ʒ. iiij. sem. endiuiae ʒ. j. aquarum endiuie, viol. sing. ʒ. viij. aceti ʒ. ij. misce, fiat epithema, applicetur ca. regioni hepatis mane & vesperti ter in hebdo

572 *De Tumorib. præter naturam,*  
hebdomade, illinatur postea se-  
quenti vnguento.

℥. Vnguenti rosati Mesuei d.  
diligenter cum aqua endiuixæ lo-  
ti ℥. iiij. ol. nymph. viol. sing. ℥.  
j. foliorum absynthij siccorum ℥.  
iiij. spicæ nardi & schoenanti sing.  
℥. ij. misce, vtere vt dictum est.

Curatio corpus iam obsidentis  
insequentem erit aggredienda mo-  
dum. In primis purgandus erit no-  
xius humor post huius apparatus.  
Præscripta prius ( vt dictum est )  
euchyma & corpus humectante vi-  
ctus ratione , à sectione venæ erit  
desistendum ex insignibus præfer-  
tim venis, quia humor in corporis  
habitu contentus sanguinis missio-  
ne euacuari nequit.

℥. Medullæ cass. fist. nuperri-  
mè è canna euulsæ ℥. vj. cathol.  
℥. β. syr. viol. ℥. j. aquarum viol.  
endiuixæ sing. ℥. ij. fiat potio  
danda ante omnium aliorum me-  
dicamentorum administrationem.

℥. Maluarum, viol. achant. al-  
theæ cum radicib. foliorum bu-  
gloss.

gloss. cichor. lactucæ, cucurb. nym-  
pheæ sing. M. j. qu. sem. frig. ma.  
læuigatorum sing. 3. iij. pruno-  
rum dulcium xx. num. folliculo-  
rum sennæ 3. j. anisi, fæniculi sing.  
3. j. sem. lini 3. j. florum bugloss.  
viol. nympheæ sing. p. ij. fiat de-  
coctio in aqua hordei perfectè co-  
cti, & in col. qu. v. diss. cassiæ à can-  
na extractæ recēter 3. vj. diapruni  
solutiui 3. β. olei viol. 3. iij. mell.  
viol. 3. j. β. succi mercurialis 3. j.  
misce, fiat clyster, supponatur vt  
dictum est.

℥. Rad. rusci, asparagi, grami-  
nis, acetosæ sing. 3. j. vtriusque bu-  
gloss. vtriusque cichorij cum rad.  
rostri porcini, scabiosæ, fumaris,  
mercurialis, herb. capil. co. bechij  
cum rad. sing. M. j. pomorum dulc.  
depilatorum, & per frusta dissecto-  
rum ij. num. sem. citri, melonum,  
cucurb. & endiuia sing. 3. j. β.  
glycirrhizæ recentis & contusæ 3.  
x. corticis mediani fraxini, tama-  
risc. rad. cappar. sing. 3. vj. follicul.  
sennæ orientalis mundatorum, po-  
lypodij



574 *De Tumorib. præter naturam,*  
lypodij querni recentis, medullæ  
carthami contusæ sing. ʒ. ij. Epi-  
thymi cretensis ʒ. β. sem. anisi,  
fænic. sing. ʒ. β. florum viol.  
borrag. & bugloss. sing. p. ij. fiat  
decoctio in aqua hordei opt. cocti.  
cape de col. qu. v. in quibus diss.  
syr. viol. de succo endiuivæ & de  
bugloss. sing. ʒ. ij. β. pulu. dia-  
marg. frig. & triasant. sing. ʒ. ij.  
fiat apozema clarif. & arom. ca-  
piat in quatuor dosibus in au-  
rora.

℞. Rhabarbari opt. ʒ. j. β. cina-  
momi ʒ. v. infundantur in ʒ. iiij.  
apozematis præscripti per horas  
xij. expressione facta, diss. confect.  
hamec & diapruni solut. sing. ʒ. j. β.  
syr. ros. ex nouem infusionibus, qu.  
β. fiat potio danda post apozema-  
tis vsum.

℞. Pulu. elect. triasant. dupl.  
rhab. & seminib. ʒ. j. β. pulu. dia-  
marg. frig. ʒ. iiij. pulu. diarrh. abb.  
ʒ. j. trochiscorum de vipera ʒ. ij.  
conseruæ florum borrag. acetosæ &  
nymphææ sing. ʒ. j. syr. viol. q. s. fiat  
in

in modum opiatae, de qua singulis matutinis capiet ad quantitatem castaneae horis tribus quatuorue ante prandium.

℞. Decocti praescripti apozematis lb. ij. quibus adde ellebori nigri ℥. iij. diss. syr. ros. solut. ℥. viij. sacch. albissimi ℥. iiij. fiat syrup. decoctionis perfectae, clarificatus, & inter clarificandum exprime vehementer rhabarbari optimi in panno lineo ligati ℥. vj. misce, & in sequentem vtere modum.

℞. Decocti fol. mercurialis, fumariae, rostri porcini, trium florum cord. com. ℥. iiij. diss. praescripti syr. ℥. ij. misce, fiat potio danda singulis decem diebus, addatur ℥. β. aut ℥. j. si praedicto pondere alius non bene subducatur.

Viperarum vsus ab antiquis est maximè commendatus, quarum cum caro calida sit & sicca, humores ad corporis superficiem detrudit. Sed deligendae sunt illae quae notis ab Aëtio conscriptis sunt insignitae, & amputata ad 4. digi-  
tos

576 *De Tumorib. prater naturam,*  
tos cāuda & capite; vniuersoque  
sanguine euacuato, & detracta se-  
necta, anguillarum more tamdiu  
decoqui debēt cum porro, anetho,  
sale, & aqua, donec à carne facile  
ossa disiungantur. Totius corporis  
recrementa per cutim euacuant, vt  
historiis quinque cap. de carne vi-  
peræ Gal. docet. Ex hac artifici the-  
riacales parantur, ineunte vere  
venari debent: nam cum æstate  
ob vehementem æstum sint furi-  
bundæ, harum administratio eo  
tempore periculo minimè vacat.  
Quando is qui vtitur scotoma in-  
currit, aut delirare incipit, tunc  
ab illarum esu est cessandum. Quod  
si harum penuria laboremus, de-  
ligendæ sunt cerastes, ij enim  
angues viperarum imaginem aliis  
magis æmulantur. Vinum in quod  
missæ sunt viuæ viperæ & ex-  
tinctæ, intrepide propinari Ele-  
phantico potest, & gallinæ qui-  
bus vescuntur, farina & vipera-  
rum carne sunt saginandæ. Ser-  
pentium decocto illinire corpus  
ex

10.  
simp.

ex usu esse censemus. Et cum horum corpora olida sint, scabie, tuberculis, & sordibus scateant, balineo sequenti vtendum erit.

℥. Rad. iarri serpent. maioris, cucum. asinini, brioniae, liliorum singulorum ℥b. j. vuæ tamineæ, oxilapathi, acetosæ, scab. struthij, pariet. fumar. rostri porc. vtriusque cichorij, vtriusque bugl. scolopendriæ, singulorum M. iij. furfuris macri p. 4. flor. fabarum, nymphaeæ, viol. singulorum p. iij. fl. chamæmeli p. ij. fiat decoctio pro balineo. Ingrediatur tepidum ieiunus, atque iis medicamentis corpus optimè fricet. Continuet triduum, aut quadriduum, postea cum lectum ingreditur sub noctem, corpus vnguento sequenti inungat.

℥. Vnguenti popul. ℥b. β. cerusæ aqua rosar. ablutæ ℥. j. vnguent. citrini recenter præparati ℥. viij. litharg. auri ℥. j. β. pinguedinis serpentis ℥. x. olei mirtillorum, & rosarum, singulorum ℥b. β. succi limonum ℥. ij. Ducantur fortiter in

B b

mor

578 *De Tumorib. præter naturam,*  
mortario marmoreo, & pistillo bu-  
xco, fiat linimentum.

Symptomatis huic morbo co-  
pulatis sequentibus præfidiis erit  
prospiciendum.

℥. Cantharid. ʒ. j. β. sublimati ʒ.  
j. carbonis salicis ʒ. ij. calcitidis vsta  
℥. iiij. aquarum de florib. fabarum  
& nymphae singulorum ʒ. iiij. bul-  
liant in amphora vitrea ad mediæ  
partis consumptionem, misce in fi-  
ne aquæ alchimistarum guttas vj.  
stilo cotone obuoluto illinantur  
faciei & reliquarum partium tu-  
mores, vel tubercula, donec sua  
sponte escara decidat, quæ vn-  
guibus nequaquam est attingenda.  
Illinatur postea facies sequenti re-  
medio.

℥. Vnguenti citrini ʒ. iiij. olei  
de tartaro ʒ. j. misce, vngatur, cum  
lectum ingreditur, facies, & de  
mane lauetur cum lacte virginali,  
vel decocto sequenti.

℥. Flor. nymphae, fabarum, pa-  
pau. rubri, singulorum p. ij. citran-  
gulorum per frusta dissectorum  
nume

numero 4. furfusis macri p. ij. bulliant simul, & facta subsidentia lauetur facies.

Ad erosum narium septum vsurpanda erunt sequentia præsidia.

℞. Decoctionis hordei integri lb. j. mel. ros. colati ℥. j. β. traiciat mane ieiunus per nares, depulsis prius è corpore recrementis. Vel sic.

℞. Succu helidonij maioris, maioranæ & agrimonianæ cum sindaleo extracti, singulorum ℥. viij. mannæ granatæ ℥. x. vini malorum granatorum, mellis rosati colati singulorum quart. β. fiat. errhinum, traiciat per nares, ieiuno ventriculo & ore aqua pleno.

℞. Malorum punic. dulcium & acidorum, singulorum vnum numero, terantur diligenter in mortario marmoreo, misce postea pontpholis optimè præparatæ ℥. iiij. lapidis calaminaris ℥. j. cerusæ aqua rosar. lotæ, plumbi vsti & aqua solani diligenter loti, singulorum ℥. j. β. testarum cancerorum marino-


580 *De Tumorib. præter naturam,*  
rum in tenuissimum pollinem re-  
dactorum  $\mathfrak{z}$ . iiij. olei rosati, om-  
phacini  $\mathfrak{z}$ . iiij. ducantur longo tem-  
pore in mortario & pistillo plum-  
beis, fiat linimentum. Illinatur  
turunda, quæ in alteram narem  
post vsum præcedentis medica-  
menti mittatur. adde succi plantag.  
& solani depurati an.  $\mathfrak{z}$ . j.

Ad depilationem palpebrarum  
& superciliorum sequens reme-  
dium aptum erit, quod recipit ci-  
neris vesparum, talpæ sing.  $\mathfrak{z}$ . ij.  
adianthi resiccati  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . alcionij  $\mathfrak{z}$ .  
iiij. succi ciclam.  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . mellis q.s.  
ad excipiendum, fiat linimentum.  
Illinantur partes dictæ in introitu  
lecti, & de mane lauentur cum  
aqua decoctionis furfuris.

$\mathcal{L}$ . Pomphol. diligenter præpa-  
ratæ  $\mathfrak{z}$ . j. sarcocollæ  $\mathfrak{z}$ . iiij. trochis.  
alborum Rasis  $\mathfrak{z}$ . ij. pulueriscentur  
supra cotem vt alcohol, & cum  
aquis rosar. plantag. fiat collyrium,  
mittantur frequenter aliquot gut-  
tæ in magnum oculorum cantum.

Prouocandæ sunt mariscæ sup-  
positis

positis acribus medicamentis , de quibus cap. de hæmorrhoidibus disseruimus , & ad sanguinis euacuationem affigendæ erunt hirudines, hæmorrhoidum enim euacuatione maniacis , melancholicis est ex usu, Hipp.teste.




*De Chiragra, quam Elephantiam Mauritanii Medici vocant.*

C A P. XXV.

**C**hiragra vna ex arthritidis speciebus à manibus defluxione infestatis nomen sumens ab Auicenna Elephantia vocatur , quod ob crassorum humorum decubitum manus solæ nonnunquam cum toto brachio ita tumeant, vt digitis pressæ œdematis more fossam retineant. Quò fit, vt qui tali morbo conflictantur , grauissimum in affecta parte pondus sentiant, & adaucta defluxione maximè distorqueantur. Is morbus



582 *De Tumorib. præter naturam,*  
ab Elephante immani bestia, cuius  
extremæ partes sunt maximè extu-  
berantes, nomen (asserente Mauri-  
tanorum turba) adeptus est: qui  
cùm organorum organa afficiat,  
horúmque functionem animanti  
apprimè necessariam lædat, præsen-  
taneis, opportunis, & ex arte exco-  
gitatis præsidiiis eget. Est enim  
manus aptissimum ad accipien-  
dum instrumentum, artibusque  
accommodatissimum. Nam si quis  
manus auferat, aut solos ma-  
nuum digitos ad omnes prope ar-  
tes capeffendas, facit inutilissimum  
hominem. Quare solus homo, quia  
rationalis est, & artium capax, ma-  
nus à suo creatore obtinuit. Solet  
hic morbus pituitosos, magnos co-  
medones, & bibulos frequenter  
distorquere.




*De Chiragra causis.*

C A P. XXVI.

**C**onstituunt nonnulli Medici  
Elephantiam duplicem, à du-  
plici

plici causa, externa scilicet & interna, profectam, hanc veram, aliam non veram vocantes. Non vera à partium vehementi motu in iis qui cacochymia laborant, ob vitiosorum humorum defluxum, vel à vehementi frigore dolorem excitante, partisque continuum solvente fit, quorum ratione in manus, brachia, pedes, ipsumque calcaneum humorum tumorem procreantium decubitus excitatur: vt facile videre est in pueris & mulieribus, molli & rara structura præditis, in quam vehemens se insinuans frigiditas, in prædictis membris tumorem inducit. Veram aiunt fieri ab interna causa, citra externæ appulsum, ab humoribus scilicet pituitosis, crassis, & melancholicis, qui cum copiosi sint, & non solum quantitate, sed qualitate noxij, per dilatatas venas in membrorum carnosam substantiam irruentes illam grauant, & humore ita perfundunt & opplent, vt partis naturalis quantitas & figura deprauetur. Quæ annotina est,

584 *De Tumorib. præter naturam,*  
vel vetustiores radices iam egit, remedia planè contemnit, & curari non potest. Quæ recens, & nondum confirmata, à perito medico (quavis ægrè) curatur. Accessionibus prædita hæc dispositio vere & autumno mortales magis laceffit, præsertim in ipso plenilunio.



*De Elephantia notis.*

C A P. XXVII.

**M**Anuum & pedum tumor ita perspicuus est, vt scrutinio exactiori hand egeat. Huius tamen causa ex membri qualitatibus est petenda. Nam si illius color sit subniger, ex rubro saturatus, ac manifestus percipiatur calor, & proximæ venæ sint plus solito exaltatæ ac turgidæ, indicium est sanguinem melancholicū ansam huic affectui suppeditare. Quod si locus non rubeat, sed albidus, tumidus, & flaccidus sit, & calor tactu non percipiatur, pituitosus humor huius origo esse censetur. Aliquādo à visci

viscida pituita bili permixta scat-  
rit, ad extimam membri partem de-  
lata, bili ruborem & calorem indu-  
cit. Subsicens pituita digestioni  
non ita obedit.



*De Elephantie curatione.*

C A P. XXVIII.

**S**I à sanguine crasso, aut pi-  
tuita oriatur, instituenda  
prius erit victus ratio pro-  
bum subtilémque sanguinem gi-  
gnens, cuiusmodi sunt pullorum,  
gallarum, turturum, perdicum,  
caponum, columborum iuuenum,  
paruarum auicularum, veruecis, vi-  
tuli, hœdi carnes, ova sorbilia tre-  
mulæ sunt ex usu. Ex oleribus  
borrago, endiuiæ; sed iusculorum  
pinguium & offarum rarus sit usus.  
Vinum vermiculum vitio carens, &  
vt decet dilutum, commendatur.  
Crebris & vehementibus motibus  
non est defatiganda manus, sed sa-  
na maximè exercenda: qua magna

B b 5 pon

586 *De Tumorib. præter naturam,*  
pondera attollere congruum erit.  
Secunda partis oppositæ iecoraria,  
suadentibus viribus & ætate. Secus  
scapulæ cum scarificatione, vel sine  
illa affigendæ erunt cucurbitulæ.  
Plerique ad causæ cōiunctæ eua-  
cuationem secandam esse eiusdem  
partis magis perspicuam venam sta-  
tuunt, ex qua vberem sanguinis co-  
piam euacuari iubent, & singulis  
hebdomadis sequens præsidium  
propinant.

℥. Epithymi cretensis ʒ. j. feri  
caprini ℥. j. Decoquantur ad con-  
sumptionem duarum partium. Ex-  
pressionem diligenter facta dissolue  
syrupi ros. sol. ʒ. j. β. misce, fiat potio.

℥. Conser. florum stœchados ʒ. j.  
conser. rad. buglossæ, & florum ci-  
chorei sing. ʒ. vj. conser. capillo. ven.  
& ceterac sing. ʒ. β. pul. diamarga.  
frig. ʒ. j. β. pul. triasā. ʒ. j. syrupi viol.  
q. suf. fiat in modum opiatae, de qua  
post purgationē factam capiat sin-  
gulis diebus ad quantitatem castaneæ.

Ante topicorum præsidiorū vsum  
conciliandus erit vomitus semel in  
hebdo

hebdomade, raphani cum aceto comestione, carniū diuersarum & pinguium repletionē immodica, hydrælei potu, & aliis huic operi dicatis. Fouendum postea sequenti decocto erit cum manu brachium.

℞. Rad. liliorum alborum, ebulo-  
rum & maluauiſci, ſingulorum qu.  
j. maluarum, violarum, acanthi, ſin-  
gulorum M. j. ſem. lini, ſanugræci  
ſing. ℥. ij. ſto. camomillæ, meliloti,  
ſambuci ſing. p. j. ſummitatum ab-  
ſynthij, n. iij. fiat decoct. in lixiuiō  
ex cineribus ſtipitum fabarum, rad.  
caulium, vitium parato. De qua fo-  
ueatur frequenter manus, & deinde  
faſcia lata arctè vinciatur, vt in al-  
tas partes fluens repellatur humor,  
ſuppoſito priùs ex plantagine trita  
cum radicibus cataplaſmate. Et  
cū lectū ingreditur, ſequens par-  
ti admouendum erit præſidium.

℞. Rad. ebifci mundatæ, elixæ &  
optimè pinſitæ lb. j. adipis ouilli lb.  
ſ. olei keirini ℥. iij. fiat catap. Vel ſic.

℞. Cineris rad. caulium ℥. iij. axun-  
giæ ſuillæ antiquæ q. s. ad concor-

588 *De Tumorib. prater naturam,*  
porandum, misceantur in mortario  
marmoreo, donec mellis parū cocti  
consistētiam adipiscantur, & vtere.

Quod si pituitosa materia huic  
affectui ansam suggerat, prius con-  
coquendus erit crassius & pituito-  
sus humor sequenti apozemate.

℞. Rad. enulæ campanæ, ciperi, ga-  
langæ crassioris, & acori vulgaris  
sing. ʒ. j. corticis citri sicci. ʒ. β. her-  
modactylo. ʒ. iij. bethon. melissæ,  
maioranæ, foliorum hyssopi, cha-  
mæpyt. chamædreos singulo. M. j.  
vtriusque bugl. vtriusque cichorij,  
fuma. herbarum capi. com. & merc.  
sing. M. j. β. sem. anisi, fænicu. sing. ʒ.  
ij. glycirrizæ rasæ ʒ. j. caricarū ping.  
p. xv. folliculo. sennæ, polypo. quer.  
recentis sing. ʒ. ij. turbith electi in  
sero caprino infusi ʒ. ij. flo. stœcha.  
rorisma. bugl. an. p. j. fiat decoct. ca-  
pe de cola. qua. quinque, in qui-  
bus dissol. mellis rosat. cola. oxime-  
lit. scillitici sing. ʒ. ij. sacch. q. s. fiat  
syrupus decoctionis mediæ clarifi-  
catus & aromatizatus cū pul. elect.  
diarhod. Ab. & diambra sing. ʒ. ij.  
pro

pro quat. dosibus de mane.

Præscribendæ postea erunt pill. de hermodactyl. maiores fœtidæ, vel pulvis ex ʒ. j. turbith, zingiberis ʒ. β. sacch. ʒ. ij. cum ʒ. iiij. decocti caulium : vel iuris galli gallinacei veteris modice saliti tantumdem. Affectus locus inungendus erit hircino felle superposito cotone, vel muniendus empl. sequenti.

℥. Gummi ammoniaci veteris in aceto dissoluti ʒ. iiij. opopana. ʒ. j. β. pulu. iridis flor. ʒ. j. axungia anatis, medullæ cruris vituli sing. ʒ. ij. flor. camomil. & anethi sing. ʒ. β. aristolo. rotundæ ʒ. j. ceræ & olei keirini sing. q. suff. fiat magdal. formetur empl. magnitudinis requisitæ. Suffitus ex acri aceto supra candentem pyritem, aut molarem lapidem misso ex usu erit subsequente mox empl. appositione, vt capite de scirrho fuit traditum.

*Quarti Libri finis.*

DE





DE  
AGNOSCENDIS  
CVRANDISQVE  
TVMORIBVS  
præter naturam.

*Auctore*

ANTONIO SAPORTA  
*Doctore Medico.*

LIBER QVINTVS.

C A P. I.



E abscessibus in hoc posteriore libro dicturus: docebo quid per abscessum Latini & ἀπύημα Græci intelligant. Quot sint abscessuum differentia: quæ hos excitantes causæ: & qualis horum debeat esse curatiua methodus. Quibus

Quibus traditis nostro operi colophonem imponam. Est apostema mutatio corporis ex inflammatione in pus, vel docēte Paulo, carniū, seu carnosarum partium, nempe musculorum, venarum, arteriarum, corruptio mutatioque. Hoc enim separationem & quandam vnus ab altero diuisionem significat, ab ἀφίσταται verbo Græco, quod est abscedere & segregari: hoc ipsum etiā abscessus, nempe partium quarundam quæ prius unitæ erant & coniunctæ, segregationem ab aliqua corpulenta materia scaturientē indicat. Arabes tumorem præter naturam ab humore progenitum, aut ab aliqua substantia humori congenerere, apostema perperam vocarunt: abscessum autem sua lingua dubellet, illorum interpretes exituram: vt huius operis primo cap. primi lib. fuit à nobis demonstratū. Fit autem Apostema vel abscessus tribus modis: vno ab inflammatione tumori præter naturam copulata, vt à phlegmone aut ab erysipelate

592 *De Tumorib. præter naturam,*  
 pelate phlegmonode. Cum enim  
 suppurantur partes eo tempore abs-  
 cedunt contento intus in cavitare  
 pure. Altero quando nullo eiusmodi  
 affectu præcedente, humor, ali-  
 quidue generis peregrini, ut lapi-  
 des, ossa, arenæ, testæ, ligna, carbo-  
 nes, intra cavitatem coaceruantur,  
 & coaceruata corrumpuntur. Ter-  
 tio ubi humores vel excrementa ab  
 alia parte decumbentia partem  
 aliâ abscedere faciunt, ut facile vi-  
 dere est in ea angina quæ in pleuri-  
 tidem mutatur, quæ dispositio ἀπο-  
 σήμα Græcis dicitur: & ut phle-  
 gmoni exquisitæ, vel non exquisi-  
 tæ apostema succedit, ita apostema-  
 ti sinus, κόλπος Græcis dictus: hu-  
 mor enim quandiu in carnosarum  
 partium spatio consistit, & pu-  
 trefcit, neque pars affecta hiat, ἀπο-  
 σάναι Græcis dicitur, hoc est absce-  
 dere, ipseque affectus ἀπόσχημα no-  
 minatur. Quod si aperiatur, & hu-  
 mor qui intus continetur exitum  
 habeat, hæc labes non amplius ἀπό-  
 σχημα, sed κόλπος dicitur.

*De*



*De Abscessuum differentiis.*

C A P. II.

**A** Postematū siue abscessuum alij tunica seu concludente membrana sunt priuati: alij tunicam habent, in qua corporum quorundam species & formæ continentur, instar lapidum, arenarum, & aliorum corporum ( vt superius fuit demonstratum.) Isti in tres di-  
 duci species possunt, in ἀθιρώματα, στατώματα & μελικριδαί, à simili-  
 tudine quam cum pulte, sebo & melle habent nomen sibi vendi-  
 carunt.



*De Abscessuum signis.*

C A P. III.

**A**bscessuum omnium commu-  
 nia signa sunt tumor emi-  
 nens, ruber, & magis solito durus,  
 cum punctorio, pulsatorio, & graui  
 dolore.

594 *De Tumorib. præter naturam,*  
dolore, igneus infuper loci feruor,  
febris hominem moleſtans , faſti-  
giatus tumor mollis , & ad albedi-  
nem decliuſ, præſertim dum in al-  
to non deliteſcit.



*De Apoſtematum cauſſis.*

C A P. IV.

**A**poſtematū cauſſæ duplices.  
Externæ ſcilicet , & inter-  
næ : externæ ſunt omnes il-  
læ quæ phlegmonas & alios tumo-  
res præter naturā excitare ſolent (vt  
ſuperius fuit traditum ) non quod  
ab externis immediatè abſceſſus  
oriantur, ſed à corporeis. Phlegmo-  
ne enim ipſa aut eryſipelas phle-  
gmonodes , aut ab humore frigido  
ſcaturiens alius tumor, niſi digera-  
tur vel lapideſcat, in abſceſſum mi-  
grat. Ex ſuppurata phlegmone,  
cauitate à putrente humore facta,  
potiſſimum ſi magna ſit , partem-  
que maximè oppleat ac diſtendat,  
nonnunquam gangræna quæ ad  
partis

partis morticinium est via ; nonnunquam sphacelus qui ipsius partis est interitus producit. Sape, pus malignum eructante vomica, vlcus syringodes , cauernosum, aut cuniculosum , curatu pertinax gignitur.



*De Apostematum curatione.*

C A P. V.



I apocroustico remedio phlegmones incrementum prohiberi non possit , neque digerente aboleri : præscripta prius ea victus ratione, cuius capite de phlegmones curatione meminimus, vlturpanda erunt chalastica quæ affectam partem relaxantia dolorem compescunt , qui circa puris generationem multis numeris minor est quàm iam genito pure. Præmissa itaque corporis euacuatione idonea , erit parti tetrapharmacum illud à Chirurgis molle vocatum apponendum,

596 *De Tumorib. præter naturam,*  
ponendum, quod ex triticea farina,  
oleo rosaceo, aqua, mediocriter co-  
ctis paratur, cui mellis parum mis-  
cere erit consentaneum. Quod si  
peruicax humor digestionem non  
pareat, iam in peregrinam naturam  
transiens, chirurgia aut pyrotico  
medicamento est euacuandus si  
maturus sit, & in pus plane con-  
uersus. Crudos tamen abscessus nõ-  
nunquam antequam ex toto in pus  
sint mutati incidimus, potissimũ si  
principibus partibus sint vicini, vel  
articulos, vel adenosas partes occu-  
pent, tunc ne assidua putredine af-  
fectæ partes contabescant sectio-  
nem molimur. Sed ante illius per-  
spiciuam euacuationem ad pus mo-  
uentium medicamentorum vsum  
te conferes : quæ calida & hu-  
mida cum sint & malacticis magis  
glutinosa, adauctæ caloris mem-  
bri substantia & retentis qui ex  
noxia materia confurgunt vaporibus,  
hanc computrescere faciunt.  
Hæc pro varia humoris abscessum  
excitantis dispositione aliquando  
dige

digerunt , aliquando suppurant: præstantior tamen est quæ per digestionē fit curatio. Ignauior ægrotumque magis molestant , quæ per suppurationem. Omnium enim tumorum præter naturam proba curatio fit desiccantium , & digeren- tium medicamentorum vsu quæ partis plenitudinem euacuant:hanc sequitur quæ adhibitis pus mo- uentibus medicamentis. Qualia sunt sequentia.

℞. Medullæ panis siliginei ℥. j. farinæ triticeæ ℥. β. decoquan. cum decocto caricarum ~~pinguium~~ moderatè , adipis suilli & vitulini singulorum ℥. iij. olei communis , vel amygdalarum , vel camomillæ ℥. iij. fiat cataplasma. Vel sic.

℞. Ebiscì cum rad. malu. viol. sing. M. j. decoquantur, pistentur diligenter & per cribrum medicum transfundantur , miscendo postea butyri recētis sine sale, & axungia gallinæ singul. ℥. iij. olei commu- nit ℥. iij. croci ℥. j. Misce, fiat ca- taplasma.

Id



598 *De Tumorib. præter naturam,*

Id ipsum præstare potest vng. balsylicon vocatū à Gal. tetrapharmacum. Si tumoris pars aliqua alba, & acuminata appareat, nisi sua sponte rumpatur scalpelli cuspidē erit aperienda inflicto myrtacei folij figuram referente vulnere. Nā circularis figura ad cicatricem suscipiendā minime est idonea. Loco decliviori adigendum scalpellum, vt iam genitum pus sua grauitate facilius exeat, & contemplato probe musculorum situ procul à venis & arteriis sectio molienda erit. Non affatim, sed sensim euacuandus erit humor ne vires conuellantur. Detergo probe pure, atque rhiptico medicamento euacuato, colleticorum vsus commodus erit. De quibus in nostris de vulneribus & vlceribus commentariis fiet sermo. Quippe quod aperta apostemata vlcerum naturam sibi vendicant. Est autem detergentium medicamentorum ordo varius. Nam quædam viribus imbecilliora aperta-  
rum phlegmonarum pus tantum  
euocant,

euocant, atque eluunt : his fortiora  
sordem detergunt , amara & dul-  
cia , sed valentissima corruptam  
carnem exedunt , vt calida & sic-  
ca ordine tertio quæ cathereticis  
sunt proxima.



*De aliis Abscessuum speciebus.*

C A P. V I.

**C**Um abscessuum non pro-  
priè dictorum tria sint fre-  
quentissima genera , & sin-  
gula propriam appellationem sint  
sortita , ea sunt ateroma , steato-  
ma , meliceris, à similitudine con-  
tentarum in tumoribus substantia-  
rum dicta, de his dicendum erit: est  
enim ateroma tumor præter natu-  
rã, qui cū scalpello est diuisus pro-  
prietatem quandam substantiæ in  
ipso contentæ obtinet , quæ pulti  
similis est, meliceris melli , & stea-  
toma seuo. Ab aliis abscessibus  
hoc discrimine euariant, quod ab-  
scessus proprie vocati dolorem in-  
flamma

600 *De Tumorib. præter naturam,*  
flamationemque testentur , acrem  
erodentemque humorem conti-  
neant, & nulla membrana peculiari  
concludantur : ij verò tunica com-  
prehensum humorem seruent.



*De horum Abscessuum causis.*

## C A P. VII.

**C**AUSÆ horum abscessuū pro-  
catarticæ sunt , quæ pitui-  
tolum humorem gignere solent, de  
quibus 2. lib. cap. de œdemate & de  
strumis factus est sermo. Corporeæ  
sunt , humores pituitosi sensim in  
particula coaceruati, qui pro varia  
illorum substantia & similitudine  
quam cum rebus extra corpus po-  
sitis habent, varias tumoribus for-  
tiri faciunt nomenclaturas, tametsi  
eodem quo strumæ modo curen-  
tur.

*De*



*De horum Abscessuum signis.*

C A P. VIII.

**I**N ceruice, alis, lateribus frequentius isti abscessus oriri solent. Per viam synatrismi cum fiunt, ex paruulo incipiunt & diu paulatimque increscunt, & propria tunica includuntur. Inter se hac ratione differunt: quod humor steatoma committens, seuo sit similis, hoc ipsum indicante appellatione: in Atheromate pulti frumentaceæ, in Meliceride humor mellis colorem & substantiam repræsentet. Horum quidam duri & renitentes, quidam molles cedentesque sunt: steatoma aliis durius est, tactui magis renitens, basim habens solidiorem. Meliceris figuram rotundam habens, laxi cuiusdam corporis modo subsidet, tardè funditur, cito rursus succrescit: Atheromati simul cum humore pultaceo lapidosa quædam duraque corpora & alia

602 *De Tumorib. præter naturam,*  
officulis, pilis similia insūt. Tumoris huius figura oblonga digitorum compressu ob humoris crassitudinem tardè retrocedit : Meliceris à fauo quem Græci *μήλον* vocant, differt, quia hic capiti peculiaris est affectus, cum tumido & foraminulento vlcere, eo quod in achore apparet maior : saniem melli similem eructat, nitrosæ pituitæ est soboles: Alter omni vlcere priuatus in nervosa membrana inclusum & melli similem humorem habet.



*De curatione horum Abscessuum.*

## C A P. IX.

**H**orum abscessuum procacitæticæ causæ calidam & exsiccantem diætam efflagitant, vt 2. lib. ostensum est, sed corporeæ omnino delendæ. Quæ res cum malacticorum & digerentium medicamentorum vsu quæ à nobis prius sunt tentanda, compleri non facile possit, ad Chirurgiam tanquam

quam ad facram anchoram confu-  
giendum erit. Hoc exacte obserua-  
to vt in manuum actione vnicam  
ob oculos propositam intentionem  
habeamus, vt tunicam humorem  
continentem siue is pultaceus, siue  
melleus, siue fœculentus, siue alte-  
rius substantiæ extiterit, aufera-  
mus. Reuocantes hoc in animum,  
horum tumorum quosdam suspen-  
sos esse, & ad quemlibet motum  
expositos curatuque minimè con-  
tumaces: Quosdam insertos & im-  
mobiles diligentem Chirurgi ma-  
num exposcentes ob hæmorrha-  
gias & neruorum puncturas immi-  
nentes, quæ conuulsiones sæpe ac-  
cerfere solēt. Purgato itaque phleg-  
magogis corpore ad manuum ope-  
rationem accedentes collocato in  
fella ægroto, si paruus sit tumor  
simplici sectione vtemur ea quæ à  
nobis in strumarum curatione ten-  
tatur, quibuscum tumores isti ma-  
gnam sympathiam habent: Maiore  
existente tumore ad folij oleæ aut  
myrtei figurā pro tumoris ratione

604 *De Tumorib. præter naturam,*  
adiacentem cutim abscindemus.  
Sed neque vno impetu sectio du-  
cenda est, neque dilaceranda in me-  
liceride & Atheromate humorem  
continens membrana, sed ea scal-  
pello à subiectis partibus est sepa-  
randa. Nam si euacuetur humor  
tunica discissa ea difficulter exco-  
riari curariue poterit. Quapropter  
morbus reuiuiscet remanente etiam  
parua tunicæ quantitate. Totus ita-  
que humor cum ipsum comple-  
ctente membrana erit auferendus.  
Quod si huius vel membranæ por-  
tiuncula quædam remanserit præ-  
cipitati puluere alumine cōbusto,  
aut alio pyrotico medicamento  
erit abigenda: Deinde futuris infl-  
cti vulneris labia connectemus &  
collecticis medicamētis agglutina-  
bimus. In steatomate in quo pin-  
guedo quædam præter naturam re-  
peritur, secanda est tunica vt effun-  
datur quidquid intus coit: eo quod  
non facile à cute & à subiecta car-  
nē separetur. In reliquis tumoribus  
tunica ipsa inuiolata seruanda est,  
qui

qui discuti dicatis ad id medicamentis & cathareticis exedi possunt. Quod steatomati non est datum, quippe quod sola manu curari debet. A Ganglio (quem nodum Mauritanorum turba vocat) tumores isti plurimum differunt, quod raro sponte prouenit. Fit enim à percussione vel impulsione præcedente, manuum radices pedumque plantas frequentius occupat: Chirurgus opere non est curandum, sed malacticis & emollientibus medicamentis ammoniaci ab igne eliquati illitu & lamina plumbea tumori superposita iniectis arctis membro vinctis. A Parotidibus etiam isti tumores maximè differunt, quod parotides quamuis à pituitoso magna ex parte succo procreentur, & repellentium medicamentorum illis sit aduersus vsus, ne fiat noxi humoris in cerebrum recursus, nihilominus digerentibus medicamentis, rarius suppurantibus curari debent, neque humorem in membrana conclusum habent, & cum



606 *De Tumorib. prater naturam.*  
frequentissimè chronicorum mor-  
borum sint iudicia, epicasticorum  
medicaminum aut cucurbitularum  
opera maximè curantur. Quibus  
suppuratis prudenter & magna  
cum solertia aperiendæ erunt, ne  
scalpelli cuspide insignes arterias  
aut venas in caput ascendentes  
vulneremus. Hactenus de tumori-  
bus externas & perspicuas corporis  
partes diuexantibus, quorum Chi-  
rurgia medela est, dictum sit.



IOAN



IOANNIS  
 S A P O R T Æ,  
 ANTONII FI-  
 LII, CONSILIA-  
 RII, MEDICI, ET  
 Professoris Regij, Vniuer-  
 sitatisque Medicæ Mon-  
 speliensis Cancellarij.

*Tractatus de lue venerea.*

---

C A P V T P R I M V M.

*De origine & nominibus Luis  
 venerea.*

**L** V I S venereæ affectus præ-  
 ter naturam imprimis vul-  
 gatissimi & fœdissimi cura-  
 tionem dogmaticam apud Autho-

C c 4 res

608 *Tractatus de lue venerea.*

res maximè controuersam traditurus methodo solita vtor, vt imprimis nomen, tum essentia innotescât, deinde causæ, quartò differentie, quintò signa, primò quidem diagnostica, tū prognostica, postea medicationes persequar, à quibus facilis est & secura ad curationē via.

Et quidem de eius origine variis varia placent, cū alij ad prauum syderum aspectum, alij ad alimentorum prauitatem & cacochymiam eam referant. Censeo ego ex India Calicut in Europam fuisse aduectam anno 1494. & primò quidem Neapolim, vbi Carolo V. imperante flagrantissimum bellum æstuabat, mox fœdo militum Gallorum & Italorum concubitu cum scortis ab Indis & Hispanis corruptis totam Galliam, & Italiam peruasisse, sed eo quidem modo, vt quæ apud Indos non minus frequens est, quàm apud nos scabies, nec maioris momenti, prioribus annis immitis apud nos & ferocissima fuerit, nunc posterioribus  
hisce

hisce facilior tolerantia & curatione euaserit.

Eius varia sunt nomina. Gallis enim dicitur morbus Neapolitanus, quod in obsidione illius ciuitatis primùm originem habuerit; Italis morbus Gallicus, & variola Gallica, quod in toto illo exercitu primùm Gallos cœperit malè habere hæc lues: quibusdam nuncupatur pudendagra, quod sit affectus pudendorum præcipuè, vel quod homines ea infecti pudore afficiantur. Dicitur per derisionem lues venerea, quod per actum venereum ut plurimum oriatur.

Quod autem aliud sit à lepra Arabum seu Elephantiasi, ab Aloti Auicennæ lib.4. fen 7. tract. 3. cap. 4. quæ eadem est cum Terminto Græcorum; Item ab Arthritide, à Psora, à variolis, satis constabit ex iis quæ in progressu de iis affectibus peculiariter à me dicentur.



## CAP. II.

*Quid sit lues venerea, & ad quod  
genus affectuum præternatu-  
ram reuocanda sit.*

**S**Ed vt commodius ad huius  
affectus naturam deuenia-  
mus, quis qualisue is sit ge-  
nericè & specificè, quæ eius in cor-  
pore sedes inquirendum. Hac enim  
methodo vsum fuisse Galenum  
scio, tum ad præfagiendum, 4. præ-  
sag. ex puls. cap. 2. cùm ait illum ad  
futura præfagienda esse peritissi-  
mum, cui status facultatis ad vn-  
guem perspectus sit, locusque affe-  
ctus, & eius affectus: tum ad curan-  
dum, 13. meth. & lib. 12. meth. cap.  
vlt. In vtriusque notitiam vos de-  
duco methodo simeiotica à Gal.  
proposita lib. 1. de locis affectis.

Sed prius quoad essentiam de-  
finitur lues venerea, excrementum  
contagiosum, putridum, aduersa-  
rium facultati naturali, vt natura-  
lis

lis est , à simili in quavis corporis parte genitum, omnium affectuum præter naturam in corpore principium.

Dico excrementum , cùm enim sit affectus præter naturam, isque Gal. 1. de symptomat. differentiis. 1. necessariò vel sit morbus , vel causa morbi, vel symptoma morbi, lues autem nõ possit dici morbus; non quidem intemperies , ea enim contrariis qualitatibus manifestè agentibus tolleretur , quod experientiæ repugnat, adde quod quamcunque intemperiem assignes , parent perpetuò effectus ei contrarij, non enim posset esse intemperies frigida humida , cùm vt plurimum excernantur excrementa biliosa, cùm appareant vlcera virulenta, serpentia , quæ non fiunt nisi à mineris erodentibus , præsertim à melancholia vsta, denique cum defœdentur ægri sæpe defluvio capillorum, seu Alopecia, item à mineris acrioribus. Non intemperies calida sicca, vt Ioanni Baptistæ Montano,

612 *Tractatus de lue venerea.*

Ioanni Scheckio , aliisque viris grauissimis placuit , qui per iecoris caliditatem & siccitatem hunc affectum definiunt ; sic enim non iungeretur cum hydrope , vt sæpe contingit , non lateret per totum aliquando decennium. Hipp. a. 6. epid. Dolores recentes calidi, antiqui verò frigidi. Curaretur frigidis, cum tamen Guaiaco, sarfa , sulfumigiis ex cinnabrio, exercitationibus , victu attenuante & siccante ipsam profligari constet.

Non intemperies calida humida, vt Ioanni Gallo visum fuit, & aliis, vnde enim tot tantique siccitatis effectus quot apparent? vnde macies? quomodo in instanti introducit passim qualitas sine materia? Quod si putredini maximè obnoxiam dixerint talem intemperiem, affectum autem hunc totum putredinosum esse. Respondeo , aliud esse intemperiem calidam siccam, aliud putredinem, hanc enim efficit non tam intēperies ex se, quàm humor putridus partem corrumpens.

Præ

Præterea hæc lues non est interperies simplex, eadē enim rationes contrarium manifestè docent, sicca difficilè tollitur, & si confirmata fuerit nunquam sanatur. Gal. 7. Meth. c. 5. cū tamen per Dei gratiā perfectissimè sanetur etia antiquissima lues. Calida difficultates propositas patitur; non itaque potest hæc lues ad intemperiem referri.

Ad morbos verò organicos nemo sanæ mentis reducet, cū sæpissime nec tumores, nec vitiatæ figuræ appareant, soloque defluvio capillorum & gonorrhæa tententur ægri. Quod si bubones veneri aliquando appareant, sunt potius symptomatici quam essentialis lui.

Ad solutionem continui retulit doctissimus Manardus, cū censuit hanc luem esse vlcus hepatis, sed *autoptia* nullum vnquam aut rarò ex dissectione cadauerum venercorum, animadvertere licuit vlcus in hepate ab hac sola causa; vlcera quæ superueniunt partibus cutaneis



614 *Tractatus de lue venerea.*

cutaneis perpetua non sunt. Non ergo ad vllum ex tribus morborum generibus à Gal. propositorum reuocari potest hic affectus.

Multo minus censendum est eum esse morbum vt de tribus suis differentiis prædicatur, vt existimant quidam, vnico enim præsidio non tolleretur, vt solo Guaia-co, vel solo hydrargyro, vt sæpe fit, quod enim indicat, per suam naturam & essentiam indicat. 9. meth. 12. si itaque plures essent eius nature, plura necessario indicaret pro sui ablatione. Fernel lib. 6. pathol. cap. vlt. lib. 2. de abditis rerum causis cap. 14. & lib. de lue venerea cap. 2. ad morbos suos totius substantiæ accommodat, non quidem epidemicos, non venenatos, sed contagiosos, nempe quod corporis & partium eius totam substantiam & formam primùm & per se afficiat, seu corpus, vel pars per hunc affectum de perfectione & integritate suæ substantiæ decedant, vnde tam varia non solum in  
exte

exterioribus, sed in penitioribus partibus exurgunt symptomata, cum tamen nullum in vrinis vitium appareat, quod satis venenatam illius naturam testetur. Fernelij opinionem amplexus est Fallopius tract. de morbo Gall. cap. 20. eiusdem rationibus adductus. Verum decipiuntur ambo, quod frustra multiplicet Entia sine necessitate, quod præter tria illa receptissima morborum genera, nulli dentur morbi totius substantiæ, etenim plura non sunt constituenda morborum genera partis quam sunt sanitatis species: sed sanitas consistit tantum in bona temperie partium, in conformatione, & vnione earundem, atque sub iis includitur materia & forma, quicquid etiam dixerit Fernel. Ergo morbi etiam tantum in iis constitui poterunt. Fateor quidem occultam causam, & tota substantia aduersariam naturalibus facultatibus, dari in lue, sed morbi si qui sint, statim ad sua genera Galenica reuocandi.

Si

Si itaque lues venerea ad nullum morborum genus possit reduci, experiendum est an ad aliud ex duobus reuocari possit, scilicet ad symptoma, aut causam morbi. Quod ad symptoma scribit Gal. 1. de sympto. differ. tria dari eius genera, actiones læsas, animales, vitales, naturales; qualitates mutatas, scilicet visibiles, odorabiles, gustabiles, &c. Excrementa mutata in substantia, quantitate & qualitate, ad quorum nullum sufficienter potest reuocari lues venerea; si enim actionem læsam dixeris animalem, puta statim non semper eam lædi, vt in gonorrhœa, defluuio capillorum, idem censendum de aliis actionibus; cum etiam pateat qualitates sæpissime mutari, & excrementa excerni, id talibus illucescet. Adde quod Gal. lib. c. symptoma sequitur morbum tanquam umbra corpus; si itaque lues sit symptoma, eius aliquis erit certus & determinatus morbus, quod tamen superior discursus negauit. Ergo si nec morbus sit,

nec

nec symptoma morbi , recensenda erit inter causas morbificas ; & reuera censeo luem venereā nihil esse aliud,quā causam non quidem vnius tantū morbi , sed causam antecedentem, imò & coniunctam aliquando plurium & diuersorum morborum , vnde varia sequantur symptomata omnis generis. Addo causam esse aliarum causarū morbificarum morbo magis vicinarum. Nec noua est hæc doctrina, præterquā quod enim fautorem habet Capiuaccium lib. de morbo Gall. licet ab eo pluribus dissentiat ; est etiam Gal. dogmatibus consentanea, cū ait morbum parere morbum, & lib.de sympt.diff.cap.1. sic scribit , potest ordo quidem causarum quæ crebro sese inuicem suscipiunt, institui, veluti pluribus calculis inter se ordine dispositis , si quis primum moueat, primus verò secundum, atque hic tertium,& sic deinceps quilibet sequetur.

Hæc causa vel accidens est , vel substantia Accidens purum nemo dixe

618 *Tractatus de lue venerea.*

dixerit, cum enim, ut in progressu declarabo, contagio communicate, non potest migrare de subiecto in subiectum, siue à corpore vno ad aliud, absque subiecto seu substantia. Cum itaque hic necessario constituenda sit substantia, hanc omnium illorum affectuum causam esse item necesse fuerit.

Porro substantia omnis quæ reperitur in corpore, Hipp. est vel continens, vel contentum, vel impetum faciens. Esse substantia continens viuentisque non potest, hæc enim potius morbi subiectum quam causa morbi statuenda, quod morborum sit immediatè actiones lædere: quarum verum subiectum non efficiens sunt partes, & quamuis carnes & ossa hac lue aliquando contabescant tota, & contiguas partes inficiant, id nihilominus non fit, nisi excrementitiam induerint naturam. Itaque hæc est substantia non continens, sed contenta, & quidem non alimentaris, hæc enim patitur à corpore nostro, & conuertitur

titur in ipsum, lues verò quam-  
 primùm agit in corpus. ergo sub-  
 stantia contenta excrementitia est.  
 Quare rectè definita fuit lues, ex-  
 crementum, quo nomine non so-  
 lùm intellige propriè dictum, sci-  
 licet mineras excrementitias, ve-  
 rum etiam vapores ab illis elatos,  
 per quos contagiorum in corpus  
 vicinum deriuat lues. Mineræ sunt  
 præcipuæ sanguis, pituita, bilis  
 vtraque, semen, serum, ichores, sa-  
 nis, lac.



### C A P. III.

*In quo exponitur natura excre-  
 menti venerei, & prior defini-  
 tionis pars examinatur.*

**H** Oc excrementū duplex ha-  
 bet esse absolutum & respec-  
 ctuum, quod utroque modo  
 considerandū est, quoad esse abso-  
 lutum, dictum est ipsum esse conta-  
 giosum, putridum, aduersarium fa-  
 cultati

620 *Tractatus de lue venerea*  
cultati naturali, vt naturalis  
quoad respectuum, dictum est  
sum esse principium & cau-  
saliarum causarum, morborum  
symptomatum, quæ corpori  
lue infecto contingunt, vel possunt  
contingere. Contagiosum est, quia  
ab vno in aliud deducitur medi-  
te contagio, vnde quamprimus  
contactus non infecti cum infecto  
ibi radices figit lues, vt in ore suc-  
culando, in pene & ab eo in in-  
terioribus partibus, si ei ex pube  
muliebri communicetur vapor  
sanies, in habitu corporis, si con-  
cumbat aliquis cum muliere, &  
mul incalescant sudéntque,  
etiam si in pannis infectorum  
cumbat..

In hoc contagio requiruntur  
agens contagiosum, scilicet hum-  
or aut vapor: 2. patiens dispositus  
debita distantia.

Quod ad agens vt sit contag-  
iosum, debet esse calidum, sicque  
facile transit, & mouetur in cor-  
pus sibi analogum, cum frigida in q-

te permaneant , vnde hydrops non est cōtagiosa. Debet etiam esse putridum, contagio enim omnis non sola alteratione , sed propria corruptione inficit , adeo vt id quod est in corpore patientis corrumpat, & in materiam virulentam mutet, à qua virulentia deinde fiunt morbi causæ,&c.

Requirat quoque visciditatem, qua corpori quod inficit melius hæreat,philosophorum namque est axioma, actiones quæ fiunt per cōtactum mora sufficiente & permanentia omnino indigere.

Vltimo debet esse aduersarium in lue venerea facultati naturali,vt naturalis est:quemadmodū enim in phthysi vapor phthysicus aduersatur facultatibus naturalibus & vitalibus pulmonū , vapor ophthalmicus facultatibus naturalibus oculorū, vapor elephāticus facultatibus naturalibus carnis & cutis,sic vapor vel humor venereus aduersatur facultatibus naturalibus,vt naturales sunt;in quo differt à cōtagio pestilenti



pestilēti quod aduersatur vitalibus.

Aduersatur autem venereus hic naturalibus sc. assimilatrici, concoctrici, nutritici, eisque inferuiētibus, retentrici, attractrici, cōcoctrici, & expultrici, vnde mirum non est si tot excrementis scateant hac lue infecti, sc. deprauatis omnibus coctionibus partiū aliquādo omniū; si etiam qui ad venerem promptissimus fuerat antequam ea afficeretur, his affectis languidior euadat.

Dico ( vt naturales sunt ) quia cum in pluribus partibus determinantur alię facultates ex animalium, vel vitalium genere, iis tamen aduersatur excrementum illud contagiosum, non vt facultatibus illis donantur, sed vt naturales sunt, & nutriuntur, attrahunt, retinent, expellunt, concoquunt.

Addo, dici aduersari facultatibus naturalibus, vt naturales sunt, quia principio naturalium facultatum, scil. iecori præcipue aduersatur.

Quod ad patiens ipsum dispositum  
tum

tum esse oportet, hæc dispositio  
vniuersaliter est vel in qualitatibus  
primis, scil. temperamento calido  
humido, vel in secundis, in habitu  
molli, raro, vt facile recipiatur va-  
por & introducatur in corpore ca-  
cochymico, in pathematis animi,  
præsertim amore herotico, quo cor-  
ripiatur patiens: dispositionem etiã  
eandem efficit labor improbus &  
conatus videlicet congregientiũ, ex  
quibus dispositionibus facilè com-  
municatur lues patienti, & hinc est  
quod vt plurimum afficitur hepar,  
quia siue osculo, siue coitu aut alio  
quouis modo quis inficiatur, com-  
municatur prius vapor cõtagiosus  
venis quàm arteriis, quia in super-  
ficie corporis plures reperiuntur  
eæque molles, quæ frictione, coitu  
aut alio modo rarescunt, vt facilis  
detur vapor aditus, qui à venis  
statim in iecur fertur; hinc etiam  
est quod coëuntibus tribus aut  
quatuor cum muliere infecta, vnus  
tantum vel duo inficiantur, non au-  
tem cæteri, quia scil. vapor non  
æqua

624 *Tractatus de lue venerea,*

æqualiter illis communicatur, atque istis, cui communicationi an-  
sam sæpissime præbet eorū pulchri-  
tudo, deinde quod mulier maiori  
peracta voluptate magis incalef-  
cat, & vapor à sanie virulenta ele-  
uetur; vel quod iidem rarioris vel  
mollioris sint texturæ, vel deni-  
que quod isti prudentiores statim  
à coitu omnem virulentiam me-  
dicamento detergant.

Quod ad distantiam, si omne  
agens agit in passum dispositum  
proximum, profecto nullum aut  
paucum censeo debere intercedere  
spatiū, inter infectū hac lue & non  
infectum; si debet fieri contagium.  
Rectè igitur in definitione dictum  
fuit, luem esse excrementum con-  
tagiosum, putridum, aduersarium  
facultatibus naturalibus, ut natu-  
rales sunt.

Cæterum cum in contagiosis  
morbis plurimi sint epidemici, in-  
quisitione dignum est an lues ve-  
nerea, quæ contagiosa est, inter af-  
fectus epidemicos & pestilentes sit  
recen

recensenda. Pro solutione supponenda est distinctio morborum epidemicorum de qua Gal. in præfat. in lib. epidem. & in sent. 20. §. 3. terrij epidemicorum. quod alij sint pestilentes, qui præterquam quod vulgares sunt, hoc etiam habent ut plurimos perimant. Alij pestilentes qui maiori ex parte non perimunt. 2. sciendum morborum epidemicorum quosdam tales esse simpliciter, quorum tres sunt conditiones. 1. ut plurimos homines, cuiusvis sexus, ætatis & temperamenti simul & semel corripiant (quod commune est ipsis ut species sunt pãdemiorum) & simul & semel desinant. 2. ut illis homines corripiantur in eadem regione, & eodem tempore, 3. ut causam habeant communem, qua omnes utuntur, ut sunt Aër, aqua, Gal. loc. cit. Alij vero sunt Epidemici secundum quid, qui longè deflectunt à verorum epidemicorum natura nempe tres omnes non habent conditiones, sed aliquas tantum. Ergo lues venerea est morbus epi-

demicus non simpliciter, nec enim fit à causa communi qua fruimur omnes ; sed epidemicus secundum quid: non pestilens, quatenus multos cuiusvis sexus, & ætatis afficit eodem tempore, quorum tamen vix vllum perimit.



*Quomodo excrementum venereum sit principium omnium affectuum præter naturam in corpore.*

#### C A P. I V.

**E**Xcrementum venereum in esse respectivo consideratum, causa est omnium affectuū quos producit ; scilicet causarum, morborum, & symptomatum, & quo maioris est actiuitatis passumque magis dispositum, eo plures producit affectus præter naturam.

Quo autem modo causam morbi, modò morbos multos vel paucos ; modò symptomata, modò omnia

omnia simul producat, causam refero in diuersum excrementi illius tanquam agentis, agendi modum, & variam patientis dispositionem. Quod ad agens etsi perpetuo contagiosum sit, calidum, putridum, aduersarium facultatibus naturalibus; nihilominus quo diuturnior est & vehementior eius actio, eo plures & grauiores affectus excitat. Quod ad patiens, prout modò est spiritus, modò humores, modò continentia, varij item nascuntur affectus. Si itaque leuis fuerit agentis actio & magis per caliditatē agat, faciet intemperiem calidam, vel in spiritibus, vel in solidis, &c. Vnde possunt fieri ephemeræ. Si diuturnior & fortior fuerit eiusmodi actio, non solum calefaciendo, sed etiam corrumpendo aget, sicque causa esset variorū morborum, modò enim magnitudinem imminutam, modò numerum diminutum, vt dentiū casus, vuulæ consumptiones, modò auctū, vt thymos, condylomata, sicut in ano; modò figuras

628 *Tractatus de lue venerea.*

vitiatas : aliàs solutiones continui efficit, vnde caries in pene.

Causa est causerum, quatenus humoribus putridis per metastasin, in aliquam partem decumbentibus fiunt tumores, aliquando frigidi, duri, vt gummata, verrucæ, &c. Alias calidi & inflammatorii, vt bubones; pro excrementi natura, vt calidum vel frigidum fuerit naturaliter, vt mordax vel acrimonie expers, quod idem in partes contiguas irrepens earum soluit unitatem.

Sæpe etiam causa est causerum quatenus partes corrumpens, sibi simile excrementum producit per epigenesin, à quo deinde plures morbi.

Est item symptomatum causa non tantum mediata quatenus morbum facit, vnde plura sequuntur symptomata; sed etiam immediata, vt habet rationem erroris externi; scribit enim Gal. 3. de sympt. caus. cap. 1. Actionem lædi non solum ob morbos partium, sed etiam ob errores externos, videlicet quos enumerat:

excre

excrementorum copiam improbat, in læsa chylicatione, sed addit, ab excrementis erroribúsq; externis, absque morbi concursu nec partes dici laborare, nec propriè actiones lædi, sed vitium tantum esse in illis excrementis. Sic itaque excrementum hoc venereum sua præsentia potest esse causa quo minùs non fiant, aut non bene fiant actiones, etiam non excusato morbo, sed hoc rarum est.

Ex symptomatis autem quibus maxime afficiuntur infecti hac lue, perpetuò quidem læduntur actiones naturales, vt dictum fuit, potissimum autem coitio, postea verò animales, minimum omniù vitales. Ex animalibus principes non ita frequenter, læduntur, maxime autem sensitiuæ, motrices. Ex principibus imaginatio deprauatur in vertigine venerea, abolentur vero omnes in Epilepsia venerea. Ex sensitiuis læditur visio in cæcitate venerea, deprauatur auditus in tinnitu. Tactus deprauatur in dolore



630 *Tractatus de lue venerea.*

vago, sæpissime autē ostocopo. Ex  
exeuntibus mutatis sunt Alo-  
pecia venerea, defluuium pilorum,  
catarrhus, gonorrhœa. Ex qualita-  
tibus mutatis visibilibus macies,  
fœdus color corporis; ex odorabili-  
bus fœtor, ex tangibilibus asperitas  
cutis, caliditas corporis, titillatio  
dēntium, &c. vnde iure dictum fuit  
in definitione excrementum vene-  
reum secundum suum esse respe-  
ctiuum esse principium omnium  
affectuum præter naturam.



*Quæ luis venerea in corpore sit  
assignanda sedes.*

C A P V T V.

**H**Actenus quis affectus præ-  
ter naturam sit lues vene-  
rea, nunc quæ eius maxime  
in corpore sedes sit inquirendum:  
ea certè non est caput, vt quibus-  
dam visum est, cum sæpissime de  
dolore capitis non conquerantur  
ægri,

ægri, neque eius affecti vlla prodeant signa; non pudenda, vt alij censuerunt: non cutis, vt placuit Leoniceno qui inter morbos cutaneos luē recensuit; sed quæuis pars corporis, vt postrema definitionis verba docent; cum enim aduersetur facultatibus naturalibus vt naturales sunt, & hæ sparsæ sint per singulas partes, erunt profecto omnes subiectum adæquatum huius luis, prout illis facultatibus donatæ sunt, quod patet ex febribus venereis; quæ etiam omne corpus occupant, & effectus sunt huius luis, siue sint ephemere, siue hecticæ aut alię; nec obstat quod omnes partes simul ac semel perpetuo non afficiat. Id enim in potentiam resistendi ipsarum ferendum est.

Dixi adæquatum subiectum esse partes quasuis, quia subiectum eius præcipuum & frequentissimum est iecur, tum quòd ratione venarum cutanearum, vt superius exposuimus, statim in consensum ducitur, delatâ ad ipsum aurâ venenatâ, tum

632 *Tractatus de lue venerea.*

quod fons est facultatis naturalis: & hinc color corporis mutatus ad liuidū, coctiones deprauatę & abolitę, macies, torpor vniuersi corporis, licet aliquando contingat ipso non affecto cerebrum principaliter affici, aut lienem aut ventriculum, quod propria earum partium symptomata indicant nullis apparentibus signis morboſi iecoris. Vnum excipitur cor, quod ob dignitatem, densitatem, robur principale luis venereę subiectum eſſe non poteſt, vnde omnes febres venereę, ſymptomaticę ſeu nō principales ſunt.

Cæterum cum in quauis parte reperiantur, ipſum continens, contenta & impetum facientia, poteſt modo vnum, modo aliud ex tribus illis primo auram venenatam recipere & ea infici.

Nec eſt cenſendum in ſpiritus prius ſortes cadere, tum in humores, poſtea in ſolida, quod illi ob ſubſtantiam tenuiſſimam facile recipiant auram venenatam, quod enim Gal. aliquando dixit de febribus,

bus, idem de hac lue intelligendum; ephemeram non semper prehendere spiritus, sed solida prius incandescere ob efficientis naturam & patientis dispositionem.

Obiicitur non posse infici spiritus venerea lue, tum quod ex se corruptionem non admittant, tum etiam quod ipsa cito dissolueretur & intra 24. horas vt ephemera. Resp. dato non putrescere spiritus vitales solos, quod respectu aliorum qui in corpore sunt, ignei sint; id tamen de naturalibus negandum est, quippe qui sint tantum tenues sanguinis exhalationes, vt notat Altimarus, & ideo nō minus quā sanguis corruptioni obnoxij. Patet autem quod spiritus qui lue inficiuntur sint naturales cum ipsis peculiariter illa aduersetur. Talis lues cito dissoluitur, vt aliquando vix sensibilis sit, alias per triduum perdurat, vt de quibusdam gonorrhœis constat.

Dices 2. non posse humores huius luis esse subiectum, quia sic ne-

# 634 *Tractatus de lue venerea.*

cellario phlebotomia vel cathartico medicamento curaretur. Resp. non iuuare aliquando phlebotomiam, quod excrementum illud putridum non euacuetur simul cum reliquo sanguine per venam sectam, item nec purgationem per pharmaca, quare hæc non aduersatur lue, quod si daretur quod à proprietate ageret in ipsam, profecto tolleretur cathartico, sed non datur.



## *De causis luis venerea.*

### C A P V T V I.

**C**ausarum morbificarum alię externę προκαταρκτικῆς, alię internę. Gal. de caus. puls. 1. cap. 1. lib. de causis morborum cap. 2. Externam causam luis venereę assignauimus in definitione cum diximus (à simili) extrinsecus enim accidens lues sibi similem efficit in corpore vicino cui suam virulentiam communicat. Hæc autem contingit vel foru existente in utero, seu

scu ante ortum, vel post ortum.

In vtero dupliciter fit, vel in 1. generatione dum generatur ex seminibus impuris parentū infectorum, præsertim si laborent gonorrhœa venerea, & hæc lues dicitur hæreditaria, vel dum nutritur sanguine materno impuro lue infecto.

Post ortū contingit potissimum concubitu cum muliere infecta, unde à pudendis contrahitur lues, sic ab ore osculo, effusione, vt loquitur Fernel. si saliuam acceperit, eandem contrahit ab ore infans, pollatum lac nutricis fugens, à cute summisque partibus dormiens cum inquinato. Primis temporibus cum malignior erat affectus, vsu cyathorum & poculorum in quibus infectus bibisset cōtrahebatur lues, vsu etiam vel minimo vestimentorum, sed nunc cum mitior euasit non ita facilè recipitur.

Porrò voce ( *à simili* ) intelligo similitudinē specificam, non autem actiuitatis & impuritatis, cum enim actio fiat à proportionē maioris

636 *Tractatus de lue venerea.*

inæqualitatis, non autem minoris, vel æqualis, hinc est quod impurus à minus impuro, luis venereæ gradus plures, & portionem non recipit, sic nec impurus ab æquè impuro afficitur, sed tantum purus ab impuro, vel minus impurus à magis impuro, ut notat Fernel. lib. de lue venerea cap. 4.

Internæ causæ sunt dispositiones illæ patientis, de quibus supra, scil. calidum humidum temperamentum, unde senes & qui sunt frigidioris habitus, etiam si frequentius coëant cum meretricibus minus tamen inficiuntur; præterea mollieties & raritas corporis: sic qui tardi sunt in eiaculario semine, facilius afficiuntur lue, non solum ob diuturniorem moram cum infecta: sed etiam quia magis incalescunt & rarefiunt in longa attritione pudendorum.


Sic etiam testatur Fallopius se non vidisse duos inter mille qui haberent detectam glâdem & præputiū decurtatum, infectos lue venerea;

nerea; quoniam detecta glande durior & callosior sit eius caro, & contra, quibus præputium oblongius glandem obducit, ij vel minimo concubitu inficiuntur ob molliem glandis, sic os, labia, vulva, podex, papillæ mammarum, facile lue contrahunt ob molliem, ipsa verò cutis ob raritatem, quam calefactio excitat, fuliginem veneream facile admittit.

Inter causas externas recensendus amor ille eroticus, de quo supra, & hinc est quod multi maritus lue venerea infecti, uxorem nisi longo tempore non inficiunt, quod aliunde non fit, nisi quod absque amore, sola cōsuetudine ducti concumbunt, cum etiam uxori odio sint: & contra infectus lue venerea uxorem recenter ducens, eam statim afficit, aut aliā, quod dum mutuis amoribus in complexus ruunt, misera vxor incalescens & rarefacta auram vel humorem venereum statim recipit.

*Luca*



*Lus venerea species & differentia.*

## CAPVT VII.



**D**ifferentiæ & species rerum colliguntur ex definitione Gal. 1 meth. cap. 3. Cum autem apud Medicos definitiones affectuum præter naturam, sint ex tribus causis (finalem enim in re præter naturam nullam admittunt) hinc est quod etiam ratione illarum trium causarum differentias & species affectuum venientur, à forma, à subiecto, denique à causa efficiente.

Quoad formam prout excrementum illud contagiosum putridum magis vel minus tale erit; sic leuiores vel intensiores erunt morbi & symptomata, & ideo lues alia grauis, alia leuis, sic quo viscidius fuerit excrementum, eo diuturniores erunt affectus, & sic lues breuis, alia diuturna.

**A** subiecto differentia sunt; quod  
alia

alia lues continentia tantum quædam afficiat, iecur, ventriculum, vel cerebrum aut lienem; alia totum corpus, vt febris venerea. Deinde alia est in contentis, alia in impetum facientibus, scilicet spiritibus naturalibus, ex quibus etiam tres exurgunt luis differentię. Prima, Ephemera, non quidem ratione temporis, sed leuitate affectus & subiecto, quæ aliquando insensilis est, alias sola lassitudine corporis & mœstitia; alias solo barbæ & pilorum defluuio citra aliam corporis noxam innotescit, affectis tamen spiritibus mala illa aura; iisdemque ad radices pilorum delatis, aut propulsis. Secunda dicitur putrida, quæ humores occupat, vnde dicitur lues venerea putrida, melancholica, pituitosa, biliosa, sanguinea, hæc si levis fuerit, carie benigna coronæ glandis penis, gonorrhœa diuturniori, tum bubone in inguine se ostentat; si grauior, rubræ & flauæ pustulæ, siccæ non purulentæ, circa frontem, tēpora, totumq; vultum, max

640 *Tractatus de lue venerea.*

mox & totum corpus apparent, quæ deinde in vlcera transeunt, eroduntque primò carnes molliores, faucium, narium, ani, &c. tum reliquum carnosum genus.

Tertia differentia febris hæcticæ responderet, cum in spermaticas partes, membranas, ligamenta, tendones, ossa, venereum excrementum defertur, in quibus arthriticos, tensiones, tractiuos, ostocopos dolores replendo excitat; tum etiam erodendo, acrimonia virulenta ingentes facit cruciatus.

Contingit sæpe actione luis venereæ & patientis dispositione à prima specie in alias progressum fieri, vt ideo illæ tunc rationes subeant non tam differentiarum quàm graduum; sæpe etiam tanta est luis immanitas vt primo insultu in partes solidas irruat, nulla aut leui spiritibus communicata offensione. Differentiæ etiam ex causa, satis ex dictis intelliguntur.



*Diagnostica luis venereæ generalia signa.*

C A P. VIII.

**S**igna luis venereæ alia diagnostica sunt, quæ ipsam præsentem demonstrant, alia prognostica; quæ eius euentum significant. Rursus diagnostica alia generalia sunt, quæ luem in genere demonstrât. Alia particularia, quibus eiusdem differentiæ & gradus innotescunt. Singula methodo simeiotica inuestigo, à concomitantibus, antecedentibus, consequentibus, iuuantibus. A concomitantibus, seu essentialiter inherantibus nulla luis signa habentur, quia cum agat per suas proprietates, & hæ nobis sint incognitæ, cum à tota substantia prodeant, signis etiam nullis, quæ illam essentiam concomitentur, se prodere potest.

Ab antecedentibus scilicet causis, suctione lactis nutricis infectæ, coitu cum

642 *Tractatus de lue venerea.*

cum muliere infecta, &c. ex quibus nec τεκμήριον & demonstratiuum elicitur indicium: non enim necessario colligitur lue affici eum qui concubuerit cum muliere infecta: sed probabiliter tantum, ob causas superius mihi allatas.

Itaque ad consequentia statim est confugiendum, & discurrendum per symptomata in actionibus læsis omnium generum, in qualitatibus mutatis, & in exeuntibus mutatis per morbos triplicis generis.

Quamprimum enim aliquis infectus est lue venerea, primò ex actionibus animalibus læsis cognoscitur, nempe grauatiuo dolore & lassitudine totius corporis, segnitie & torpore corripitur, partim à somno, idque 2. aut 3. à concubitu die, infectis scil. spiritibus tum animalibus, tum naturalibus, qui robur toti corpori præbêt; afficitur etiam dolore vago quarundam partium, nunc caput, nunc humerus dexter, mox sinister, alias crura afficientur, ac eius causa in vaporem è minera quadam

quadam elatum referenda est; sed is dolor potius noctu exacerbat; præterea ex mœsticiâ sine causâ in non affluctis, qui enim natura sua fuerit iucundus & hilaris, is correptus hac lue mœrore prosternitur, ob vapores venereos mentis aciem petentes, sanguinemque adurentes, vel perturbantes, vnde symptomata tenebricosa.

2. Ex qualitatibus mutatis, potissimum visibilibus, scilicet colore faciei, qui enim splendido & sereno fuerat vultu, is omnino mutatur, quin essentiale & pathognomonicum fere signum apparet, circulus liuidus in inferiori palpebra oculorum, qualis mulieribus cum menstruas purgationes patiuntur contingit: spiritibus enim naturalibus, quibus plurimum abundat vultus ea lue infectis, antiquus splendor langueat necesse est, quo languente, palpebrarum (quæ eo spiritu illustrantur) calor diminutus circulo illo liuido se prodit.

Tum ex tangibilibus. Persentitur insignis

644 *Tractatus de lue venerea.*

inlignis calor ad volas manuum & pedum plantas etiam hyeme, cum illæ partes plurimas venas & arterias suscipiāt, ad quas hepatis summus calor sese effūdit, adde proportionem naturalem longitudinis & crassitie manuum cum hepate.

Tertiò ex exeuntibus immutatis, ut gonorrhœa, est. a. hæc seminis continua & involuntaria profusio non erecto pene, pendens à frustrata retentrice partium spermaticarum ob vaporem vel humorem venereum, quæ in hoc distinguitur à nō venerea, quod illa semel coëundo contrahatur; quod satis fætida sit; quod sit cum tolerantia ægri, cum exeat materia acrimonia & malis qualitatibus molesta, tota substantia peccans; diu perdurat. Non venerea autem, ut plurimum à nimio fit coitu, cito desinit, nisi sit ex catarrho; est cum molestia, & aliquando consumptione ægri, cum excernatur materia alimentaris, utilis denique ex iuuantibus, venerea non cedit remediis per qualitates  
manf

manifestas agentibus, sed tantum alexipharmacis luis.

Inter exeuntia immutata est defluuium capillorum, aliquando etiā alopecia & ophiasis, quæ vitia non tam fiunt ex cutis aut agentis caloris vitio, vel materiæ defectu, quàm eiusdem corruptione à spiritu naturali infecto. Materia hæc corrupta est pituita salsa, bilis vtræque à pristina forma decedentes. Familiare est hoc symptoma nutricibus biliosis, hæc namque si lue corripiantur statim hoc defluuio laborant, quia facile iis ad cutem demittuntur excrementa fuliginosa, ob caliditatem & siccitatem morbi.

Quæ in principio negotium faciunt sunt caries, per quas intelligo vlcera quædam peni, aut sinui mulierum superuenientia, similia cariei ligna exedentis. Tres autem dantur cariei species, benigna vna est, scilicet pustulæ quædam parvæ & candidæ, quibus apertis remanet vlcusculum rotundum, puncto candido circa media donatum; ad maximam  
copiam



646 *Tractatus de lue venerea.*

copiam quandoque excreſcunt hæ  
puſtulæ , adeo vt totam coronam  
glandis cingant , vel ex duabus vel  
tribus vnum fit vlcus continuum.  
In hac ſpecie vlcus continuum &  
dolor levis eſt, pruritus moderatus,  
ad cuius curationem ſufficiunt le-  
uia medicamenta.

Secunda eſt ſæuior, ſcilicet ex vl-  
ceribus rotundis profundioribus,  
quorum media liueſcunt, labris le-  
uiter euerſis, purpureo colore.

Tertia omnino immitis eſt, ſcili-  
cet ex vlceribus malignis non ro-  
tundis, ſed variarum figurarum, va-  
riorumque colorum, partim liuidis,  
& purpureis: ſerpunt hæc & partes  
miſere depaſcunt, cum labiis callo-  
ſis; quibus hiſce cariei ſpeciebus  
generationem præbent primò con-  
tactus impuri & carioſi pudendi in  
coitu, deinde ſordes retentæ in pu-  
dendo affecti lue , licet in ipſo nec  
vlcus, nec caries appareant; dum  
enim per frictionem incaleſcunt,  
elato vapore fit caries.

Tertiò denique hepatis infecti  
vitium,

vitium, cuius robore cum transmittitur excrementum in partes superiores fiunt aphtæ in ore, cum in inferiores plerumque fiunt caries, qui posterior modus generationis grauissimus est, nec nisi multorum dierum scil. 30. vel 40. spatio fit.

Prior leuissimus est & intra semidiem contrahitur, & ob id vt in posteriori ad remedia generosiora deueniendum, cum interna viscera subierit lues; sic frustra in priori ea administrantur, in quo etiam ineptus est vsus Guaiaci.

Secundò in numero morborum venereorum sunt bubones in inguine, per quos intelligo frigidum vel calidum tumorem glandularum inguinum, seu emunctorij hepatis, vel intumescantium in propria substantia ( & in magnam molem excrescit talis tumor) vel in membrana inuestiente ipsam glandem; aut in ipsa cavitare inguinum ( & talis paruus est ) vtrisque generationem præbet, aut sola aura venenata per venas pudendorum immediatè in inguina

648 *Tractatus de lue venerea.*

inguina delata, hepate bene se habente, & talis 1. 2. aut 3. à concubitu die apparet; aut hepar infectum, sese in proprium emunctorium ab eiusmodi materia venenata expurgat.

Venericum autem bubonem à non venereo distinguunt ex antecedentibus, coitus cum aliqua muliere ante aliquos dies; prægressa gonorrhœa; absentia aliarum causarum, ob quas etiam tempore sanitatis contingunt bubones, ut sunt labor nimius, iter longum, &c. A concomitantibus, si adsint ulcera tibiarum, si caries in pene, quamvis absque eis bubones venerici superue-niant aliquando. Cognoscitur item ab eo, quod cum bubo venericus ut plurimum sit à frigida materia, cuius signum est carentia ruboris & doloris, incessus non impeditus, hinc est, quod ut plurimum non peruenit ad maturationem: quod si sit à calida materia (quod dolor, rubor, calorque significant) facile his eam assequetur.

Tertiò

Tertiò ex morbis luem sequitur febricula, quæ circa vesperam quandoque etiam tertianis & quartanis circuitibus exacerbatur: huius causam in humorem venereum putrescentem in foco luis refero.

Ultimò cognoscitur hæc lues ex iuuantibus; si enim affectus venereus qualiscumque sit non cedat nisi *ἰδίοις ἀλεξιφάρμακοις*, si non iuvent qualitibus manifestis agentia, indicium est eius certissimum.



*Prognostica luis venereæ signa.*

C A P. I X.

**H**Æc sunt quæ omnem luem partim verò nascentem significant in vniversum, nunc signa differentiarum persequor. A forma, grauis lues & maximæ actiuitatis significatur, si vnico coitu contrahitur, si cito lædit, si cito magnos habet dolores & labores, si difficilis in tolerantia, si plures partes afficiat; & contra levis est.

## 648 *Tractatus de lue venerea.*

Confirmatam luem demonstrant, quæ putridam luem grauiorem significare diximus cap.7. scilicet pustulæ illæ rubræ, liuidæ, vel flauæ, latæ, quæ frontem, mentum, totosque vultus fœdant, & mentagram efficiunt, earum causa est hæmatopoiiticæ frustratio in iecore infecto, vnde biliosus sanguis generatur & ad cutem defertur, vel *ἐμποιήσεως* in singulis partibus frustratio, vitio alimenti, quod ob qualitatem malam non adglutinatur partibus, sed totum in excrementa vertitur, vnde fiunt pustulæ, quarum color varius est pro humoris morbifici varietatē. Dūrities verò exustionem sequitur, & inueteratam iam à quatuor, quinque vel sex mensibus testatur; idem docet caries callosa, cæteraque vlcera callosa. 3. laxatur & pender multum vuula, vnde raucedo, cum scilicet communicatur pestis cerebro, cuius crudiora excrementa in illas partes delabuntur: sic tumoribus afficiuntur *αμυγδαλæ* seu amygdalæ ob eandē causam

causam; vltimis progressam, & omnino inueteratam, atque heeticam luem significant dentium & palati exesio, immo & ipsarum cartilaginum narium, quam efficit sanguis adustus, vel mucus pituitosus, qui acrimoniam sanguinis adustionemque sibi comparauerit; in quo casu non nisi ad potentissima adiuumenta atque remedia praesertim hydragryri vsus est deueniendum. Praeterea dolores stabiles intensissimi per totum fere corpus. Praesertim vero caput, humeri, periostia, &c. non quidem in articulis: sed in ipsis mediis artubus, vbi etiam tophi oboriuntur qui ad vesperam atrociter concitant vsque ad mediam noctem, quorum causa tum in humorum prauorum ab hepate, aut alio foco in illas partes metastasin, est reicienda; tum in epigenesi, quod tales in singulis partibus generentur & ibi detineantur. Auet nox cruciatuum magnitudinem, quod huic affectui peculiare est, quoniam calor tunc in intus coarctatus, va-

650 *Tractatus de lue venerea.*

pores virulentos in partes transmittit, & dolores auget, tum etiã quod coctioni, actioni naturali quæ notu felicius celebratur, aduersetur lues, tum etiam quod eo tempore maximè moueantur humores viti: ex doloribus vigiliæ nascuntur.

Tertiò, in hæctica lue gummata seu duri tumores, albi, atheromatice, concreſcunt, in capite, brachiis, tibiis, totòque habitu fiunt, à minera frigidiori & crassiori, quæ per metastasin, vel per epigenesin in illis partibus detinetur, qua tandem putrescente excitantur caries in ossibus.

Quartò, tinnitus aurium perpetuus Fallopio primum animaduertente negotium facit; causam habet vaporem venereum à cerebro in aurem internam delatum, qui cum nõ quiescat pellitur vel sponte mouetur, & dum impingit in membranam, per ossicula sonum edit: quum verò continuus est eius accessus, & causa continua, generatio quoque continua, hinc est quod  
cont

continuus est pariter tinnitus.

Quintò, vlcera cacoëthea & thelephialia, virulenta quæ vniuersum corpus aliquando occupant, his adde asthmata, conuulsiones, lipothymias, syncopes, quæ non nisi hæcticæ lui contingunt.

Signa loci particulariter affecti, & domicilij luis venereæ ex tribus fōtibz simeioticis propositis sunt desumenda, verbi gratia cerebri læsi principaliter signum est ex antecedentibus vsus pilei infecti, vel pannorum infectorum, ex consequentibus dolor capitis continuus gummata in capite, depilatio, tinnitus aurium, vuulæ relaxatio, dolores arthritici. Ex iuuantibus; si cephalica rite administrata non iuuent, nisi permixta alexipharmacis, denique si nullius visceris affecti signa appareant.

Quod si ventriculus principaliter fuerit læsus, ex antecedentibus, contracta fuit lues forte osculis effusioribus, partim si illico biberit vel comederit patiens, vt ideo salina



652 *Tractatus de lue venerea.*

infecta, ventriculum petierit, si-  
diturnior usus poculorum infe-  
ctorum, suctio lactis infecti. Ex  
consequentibus, aphthæ oris, nau-  
sea, sitis, chylificatio læsa. Ex iuuan-  
tibus gastrica conferunt, alexiphar-  
macis permixta.

Si iecur sit domicilium, ex ante-  
cedentibus, coitu cum infecta lues  
fuit contracta, ex consequentibus,  
bubo in inguine dextro, tensio hy-  
pochondrij dextri, pustulæ illæ ru-  
bræ, latæ, duræ, variolis similes per  
totum corpus, præsertim verò in  
dextris, icterus flauus, hæmatosis  
deprauata, iuuant hepatica, alexi-  
pharmacis mixta.

Si lien sit fomes, ex antecedenti-  
bus sunt bubo in inguine sinistro,  
tensio sinistri hypochondrij, hæ-  
morrhoides, condylomata in ano,  
ficus, vuæ, porri, verrucæ, pustulæ  
elephanticæ per totum corpus, vl-  
cera ad sinistrum crus, magisque  
sinistræ partes afficiuntur. Iuuant  
splenica, alexipharmacis permixta  
profuntque.

Si uterus, ex consequentibus  
sunt

sunt suppressi menses vel eorundem profluuium, gonorrhœa, caries pudendi muliebris, dolor ad regionem vteri & mammæ. Ex iuuantibus conferunt hysterica alexipharmacis permixta.

Cæterum post usum remediorum, cognoscendum an lues sit cuiusdam omnino, an verò adhuc lateat; si caries cum difficultate sit sublata, si sanatis vlceribus remaneat tumor, & dolor aliquis; si persistant adhuc symptomata aliqua & morbi, breuiori curatione fuerit usus æger, ut tantum per 12. vel 15. dies: sed hoc de lue secundi, vel tertij gradus, non de ephemera intelligendum est.



*De prasagiis luis venerea.*

C A P. X.

**M**Aior artis prædicendi pars posita est in præuidenda victoria ex parte vel morbi vel virtutis, tum etiam tarditate vel

breuitate iudicij, vtrumque assequi-  
mur collatione facta rerum præter  
naturam cum rebus secundū natu-  
ram, à quibus sperādus triumphus.

His autem affectus venereus ra-  
rò mortem infert, nisi aut omnino  
negligatur, aut graue aliquod pec-  
catum in eius curatione committa-  
tur à Medico, vel assistantibus, vel  
ægro ipso, causam securitatis refe-  
ro in robur cordis, quod ob id nun-  
quam præcipuum est luis domi-  
cilium.

Qui tamen lue sanata in mor-  
bum incidunt acutum, difficulter  
liberantur, rationem colligo ex de-  
cretis Hipp. 3. coac. sent. 25. ubi sic  
loquitur, *qui fractis viribus delirant,*  
*pestime habent*, id est, si prostratis vi-  
ribus naturali & vitali accedat de-  
lirium, vix vlla superest spes; sic si  
prostratis viribus, à lue venerea, &  
languescente iam calore natiuo  
partium, præsertim hepatis succe-  
dit acutus morbus, periculum im-  
minet mortis.

Qui semel sanitati ex lue resti-  
tutus

tutus fuit, quamvis integrè , tamen facilius inficitur contagio venereo, quàm alius , propter iam contractam dispositionem.

De magnitudine & contumacia huius luis diuersa ratione præsa- giendum est, pro variis differentiis, & gradibus eius, vt enim ephemera leuis est , etiamsi defluuio capillo- rum defœdetur æger , sic hæctica lues aliquando perducit ad febrem hæcticam & marasimum, quod alias in vsu decocti Guaiaci & siccan- tium animaduertere mihi licuit, & quæ ossium caries cartilaginum- que putredinem iunctam habent, & in internis visceribus vlcera & tubercula , ea difficillimè aut vix sanantur.

Sic si virtus sit robusta , corpus boni habitus, ætas iuuenilis , quæ facile ferat præsidia , melius spe- randum , quàm è contra , vnde est quod senibus ob virium imbecilli- tatem & excrementorum copiam lues venerea vt plurimum est le- thalis.

656 *Tractatus de lue venerea.*


Quo plures partes internæ afficiuntur, eo grauior est lues, & grauiſſima, ſi principes, cerebrum, cor, & hepar laborent, habet enim magnitudinem dignitatis, quæ non tanta eſt, vbi vnica tantùm pars ſit eius domicilium, minor quidem ſi lien, maior ſi ventriculus & vterus; adhuc intenſior, ſi iecur, & adhuc ſi cerebrum. Tunc tamen ad ſummum diſcrimen perducit, cùm iam refrigerato iecore cachecticus ſit habitus, imminetque hydrops aut atrophia, & patiens contabefcit.

Aſthma ſuperueniens lue, omnẽ ſalutis ſpem tollit: etenim naturalium & animalium partium, atque actionum motiuarum imbecillitatem ſummam teſtatur, & innati calidi cerebri imminentem extinctionem, vnde tanta excrementorum copia in pulmones decumbit.

Qui poſt uſum hydrargiri non ſanantur, grauius laborant, ob ſummam magnitudinem, ab uſu tamen iuuantium propterea non deſiſtendum, Hipp. enim ait 2. aphor. § 2.

*Omnia*

*Omnia secundum rationem facienti, si non succedat secundum rationem, non est transeundum ad aliud, stante eo quod à principio visum est.*



*Luis venerea indicationes  
curatoria.*

## C A P. XI.

**N**ualuit opinio apud quosdam, luem veneream absque methodo & indicationibus, sola experientia & empeiria tractandam esse; fauet fortassis eorum opinioni quod docet Gal. 3. meth. cap. 6. quæ tota substantia nobis sunt aduersaria, extra methodum esse: sed omnia per experientiam inueniri, talem autem esse hanc luem constat ex prædictis; verum erronea est hæc opinio, quamuis enim particularia alexipharmaca præsidia luis sola experientia nobis cognita fuerint, ipsum tamen quid agendum genericum & specificum, eiusque recta

658. *Tractatus de lue venerea.*  
administratio solis indicationibus  
comparatur.

Ergo cum hæ indicationes tantum desumantur à morbo, causa & virtute. 10. meth. cap. 11. per singula indicantia est discurrendum.

Excrementum venereum, toto genere præter naturam indicat eradicans, seu secundum totam substantiam auferens. Gal. 14. meth. 18. sed inutilis & inartificiofa est hæc indicatio. lib. de opt. sect. 14. vtilior erit specificando eradicans, vt scilicet cum excrementum aduersetur tota substantia facultatibus naturalibus, etiam indubiè eradiceretur medicamenti tota substantia in ipsum agentibus & facultates naturales roborantibus, qualia sunt quedam bezoardica seu alexipharmaca.

Quod si excrementum illud peccet non solum qualitate occulta, sed etiam manifestis qualitatibus iam corrigendum erit secundum hæc vitia particularia, & ideo quod calidum est, quia caliditatem  
potest

potest inurere corpori, refrigerandum.

Et quoniam est causa causarum, morborum, & symptomatum, illis consulendum est.

A causis quidem externis nullam indicationem desumit Gal. 4. meth. siue coitu, siue suctione lactis fuerit contracta lues, quia indicans debet esse necessario in corpore humano.

A causis antecedentibus vel continentibus luis, eedem sunt indicationes, quæ excrementi venerei in vniuersum, & vt peccant motu reprimenda apocrusticis, seu repellentibus, vt sunt in termino à quo, intercipiendæ in spatio per quod reuellendæ ad alium terminum ad quem, deriuandæ, ab eo loco, in quo iam quiescere incipiunt.

Morbi suas proprias habent indicationes curatorias, febris refrigerans, vlcera abstergens, exsiccans, sarcoenicum & collecticum, epuloticum, seu cicatrizans, &c. de quibus in singulorum curatione agetur.

Sympro



## 660 *Tractatus de lue venerea.*

Symptomata venerea etiam si per se nihil indicent, cum tollantur ad sublationem morbi, quem sequuntur, ut umbrā corpus. 12. meth. 10. tamen quia sæpe habent rationem causæ, vel augmentis morbum, vel minuendis vires, ideo per accidens indicant.

Maximè indicatio in lue sumitur à viribus, quæ sui custodiam indicant, scilicet singularum partium (quæ domicilia sunt luis) calidum innatum & temperamentum custodiendum, permixtis appropriatis medicamentis cum alexipharmacis, ut si iecur sit focus, hepatica; si ventriculus, gastrica; si cerebrum, cephalica, si uterus hysterica; si lien splenica, vsurpanda sunt.

Verum ex Gal. doctrina 2. meth. 3. excrementa quæ in primis viis continentur, habent rationem causæ sine qua non, propterea scribit idem luem particularem aliquam curationem suscipere, absque præiunctione vniuersali; ideo antequam ad indicata particularia deueniamus,

com

communi purgatione humorum  
toti corpori consulendum.



*Luis venerea therapia.*

C A P. XII.

**N** curando hoc affectu  
sermonem aggrediar ab  
iis praesidiis, quæ excre-  
mento illi, vniuersaliter  
aduersantur, tum quæ pro singulo-  
rum affectuum, scilicet morborum  
& symptomatum sublatione con-  
ueniant sigillatim proponam. Ma-  
teria praesidiorum indicatorum è  
tribus vulgaribus fontibus desumi-  
tur, chirurgico, pharmaceutico,  
diæterico.

Quod ad chirurgiam est in pri-  
mis venæ sectio, quæ, cum adest  
principalis scopus, magnitudo mor-  
bi à plethora, vel exquisita, vel ca-  
cochymica; vel lues generatur ex  
sanguine, omnino confert; tum ex  
se, tum quòd cum sanguine excer-  
natur aliqua portio excrementi ve-  
neri,

nerei, qualecumque illud sit, denique quod, ut cum Gal. loquar 11. meth. cap. 15. natura ex eo, quo veluti sarcina premitur concoquet quod concoqui est habile, & excernet quod debet excerni.

Citissimè autem administretur hoc præsidium, expurgatis primis viis, quia urget lues sua præsentia. Intellige, nisi virtus sua imbecillitate prohibeat, aut aliquando bubo in inguine, quo solo suppurato, aut natura aut suppurantibus medicamentis, expurgatoque sanatur lues quandoque omnino, quare cum Hipp. 1. aph. 20. quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque mouere, neque nouare liceat, sed sinere, ideo si aperto bubone, sufficiens sanies excernatur, vena non est secanda, quia prohibetur naturæ motus ad curationem susceptus, imo nec impediendus hic naturæ motus cum adhuc fluxio in emunctorium sit in ipso principio. Hipp. enim lib. cit. aph. 2. quæ ducere oportet, quo maxime natura vergit eo ducenda, per

per loca conferentia. Signum autem est non amplius fieri fluxionem, si cesset bubonis dolor, si rubedo vel cesset, vel non augeatur, denique si incrementum non suscipiat, etiam dum ambulat æger; ad quorum omnium certiorē notionem expectandus dies 3. quod si amplius non fiat fluxio, si etiam suppurato bubone sufficiens non sit excretio (sufficientem autem declarant symptomatum & aliorum morborum venereorum absentia, series affectus, copiosa excretio) audacter venam secare oportet, hic quidem quia diminutus motus indicat adiuuans, quod docuit Gal. 9. meth. cap. 5. exemplo fluoris mensium deficientis, tantumque detrahendum quo ex vtrisque communiū perficiatur quod postulat illic; ut exonerata natura melius concoquat, ut hepatis robur augeatur, validiusque propellat materiam virulentam seu veneream; Deinde ut accedente humore tenui & calido, vaporum calidorum, eiusque præsentia

664 *Tractatus de lue venerea.*

sentie beneficio, suppureret undent  
 bubo. Verum opus est distinctione  
 venarum, ex quibus sanguis edu-  
 cendus est, namque in posteriori  
 casu si amplius non fiat fluxio præ-  
 sente bubone, secanda est vena ac-  
 commodata domicilio luis, vt si sit  
 cerebrum, cephalica, si iecur, basili-  
 ca dextri: si lien, basilica sinistri, iti-  
 dem si ventriculus aut vterus, sa-  
 phena. In priori verò cum suppurat-  
 us bubo diminute expurgat, iu-  
 uandus naturæ conatus, secta sa-  
 phena malleoli recti κατ' ἰξιν. hæc  
 enim ab ischiatica bifurcatione ori-  
 ginem habet: ac ea quantitate du-  
 catur sanguis, quam suggerunt ætas,  
 temperamentum, aër, itemque se-  
 cundarij scopi. Inter ceteras chirur-  
 gicorum præsidiorum materias sunt  
 fonticuli, qui vbi contumax est lues  
 inurendi brachiis vel cruribus,  
 prout eius domicilium in vna vel  
 altera parte fuerit, & sic, si in cere-  
 bro, inuratur brachiis, si in vtero,  
 cruribus, &c. seruata rectitudine,  
 cæteræ materiæ in peculiari mor-  
 borum

borum & symptomatum curatione  
proponentur.

Ex pharmaceuticis remediis sunt  
lenientia, alterantia, purgantia &  
bezoardica: antequam leceatur vena,  
leniatur aluus pridie enemate com-  
muni, sequenti die exhibeatur per  
os leniens medicamentum, verbi  
gratia.

℞ decocti comm. med. ℥ iiij. ad-  
de fol. fenn. mundat. polypod.  
querni recentis. ana ℥ iij. anisi, co-  
riand. præparati ana ℥ j. β. in colat.  
diss. electar. lenit. & cathol. ana ℥ iij.  
syrup. ros. solut ℥ j. β. fiat potio de-  
tur mane.

In bolo autem ut sequitur.

℞ pulp. cass. recent. extract. hieræ  
picræ an. ℥ iij. sacch. q. s. misce fiat  
bolus.

In pilulis.

℞ mass. pilular. assaiereth. mastich.  
ana ℥ j. alephang. ℥ β. cum syrup.  
ros. solut. fiant pilulæ v. deauratæ,  
capiat post primum somnum.

Lenita aluo præparentur humo-  
res qui maximè negotium faciunt,  
& quo

666 *Tractatus de lue venerea.*

& quoniam vt plurimum calidiores, & vsti hi sunt, ideo antequam expurgentur, concoquantur hoc apozemate, ex Hipp. decreto, concocta medicari oportet, non cruda.

℞ rad. cichor. buglos. acetos. an. ʒ j. rafuræ ligni sancti ʒ β. fol. fumar. endiu. borrag. scabios, melissæ, acetosæ, agrimon. ceterach. absynth. pont. pentaphilli ana m. j. sem. citri, cucurbitæ an. ʒ ij. flor. cichor. borrag. violar. an. p. ij. si. omniū decoctio ad t̄b j. β. in colat. dissol. syrup. de cichor. simpl. de fumar. an. ʒ ij. de pomis compos. ʒ vj. M, fiat apozema pro 4. dos. clarific. & aromati. ʒ iiij. pulu. triasantali.

Expurgetur hac potione.

℞ prædicti apozem. q. s. addendo fol. sennæ mundat. polypod. querni an. ʒ β. anisi, coriandri an. ʒ j. β. in colat. diss. confect. hamech, cathol. an ʒ ij. β. syr. ros. solut. ʒ j. β. misce, fiat potio.

In pilulis.

℞ mass. pilular. aggreg. ʒ j. pilul. de lapide lazuli ʒ j. cum syrupo de fumar. maria,

maria, fiant pilulæ sex deauratæ.

In bolo.

℞ confect. hamech. ʒij. cathol. ʒ iij.  
sem. citri contusi ʒ j. sacch. q. l. fiat  
bolus.

Si humores pituitosi & visceri  
peccent, expurgentur post conue-  
nientem incisionem, deterfionem,  
quod fit hoc apozemate.

℞ rad. scillæ, sarsapar. liquir. an.  
ʒ j. ras. ligni sancti ʒ v. fol. meliss.  
chamæpit. absynt. beton. capill. ven.  
agrimon. mentastri, origani. an. m. j.  
sem. citri, fœniculi, baccar. iuniperi,  
ana ʒ ij. fol. salu. anthos, genistæ. an.  
p. ij. fiat omnium decoctio ad ℥ j. β.  
in colat. diss. syrupi de absynt. & de  
stœchade an. ʒ ij. oxymel. simpl. ʒ j.  
misc. fiat apozema pro iiij. dosibus,  
clarific. & aromatiz. ʒ iiij. puluer.  
diarrhod. abbatis.

Purgetur sic in potione.

℞ fol. meliss. beton. menth. ana  
m. β. hermodact. ʒ j. anisi ʒ ij. fiat  
decoctio ad ʒ iiij. infunde agaric.  
trochisc. ʒ iiij. gingiberis gr. v. in  
express. diss. diaphœnic. & diacarth.  
ana



668 *Tractatus de lue venerea.*

ana ʒ ij. hieræ picræ ʒ j. β. syrup.  
ros. solut. ʒ. ij. misce, fiat potio.

Empyrici foeliciter vtuntur solo  
puluere hermodactylorum.

Vel in pilulis.

℞ pilular. de hermodact. ʒ β.  
cocciar. foetid. an. ʒ j. cum aq. beton;  
fiat pilul. v.

In Bolo.

℞ hieræ picræ ʒ ij. diaphoenic.  
ʒ ij. sem. citri ʒ β. sacch. q. s. misce  
fiat bolus.

Si peccent minera biliosa, illis  
præparandis vtile est hoc apozema.

℞ rad. acetos. gram. cichor. ana  
ʒ j. rasur. guaiaci ʒ β. fol. endiu. ci-  
chor. bugl. portulac. agrimon. acetos.  
lactucæ an. m. j. sem. 4. frigid. maior.  
ana ʒ ij. flor. nymph. cichor. violar.  
ana p. ij. fiat omnium decoctio ad  
fb. j. β. in col. diss. syrup. de cindin. de  
cichor. ana ʒ ij. aceto. simpl. ʒ j.  
misce fiat apozema. p. b. 4. dosib.  
clarific. aromatiz. ʒ iij. puluer.  
triafantali. an. ʒ iij. ʒ iij. ʒ iij. ʒ iij.  
an. v. Iisdem expurgandis, sic  
℞ prædicti decocti q. s. bis infunde  
rhei

rhei electi ʒ iiij. fantali citrini ʒ ʒ.  
in express. diss. elect. de succo ros.  
ʒ ij. syrup. ros. solut. ʒ ij. misce, fiat  
potio.

In pilulis.

℞ mass. pilular. aurear. & de rheo  
an. ʒ j. aggreg. ʒ ʒ. malaxentur cum  
aq. cichor. & fiant pilulæ deauratæ,  
Vel in bolo.

℞ medull. cass. recent. extract. ʒ ʒ.  
diapruni solut. ʒ iiij. anisi ʒ ʒ. sacch.  
q. s. fiat bolus.

Licebit aliquando apozemate  
laxatiuo in naturis delicatioribus  
humores expurgare, qui modus vti-  
liter epicraticus est, verbi gratia.

℞ fol. endiu. cichor. bugloss. ce-  
lerach. fumariæ, scabios. beton. ana  
m. j. fol. fenn. mundat. ʒ j. ʒ. anisi, co-  
riand. præparati an. ʒ ij. flor. cordial.  
ana p. j. fiat omnium decoctio, ad  
t̄b j. ʒ. in colat. diss. syrup. ros. solut.  
ʒ iiij. sacch. ʒ iiij. misce pro iiij. dos.  
matutinis, quibus vtile fuerit tur-  
bith in panno raro ligatum cum  
suo zinzibere incoquere, aliaque  
cathartica ab humore indicata.

Purga

670 *Tractatus de lue venerea.*

Purgato vniuerso corpore sæpissime debellatur lues, si levis fuerit, aliter iteranda bis vel ter purgatio, si opus sit, tum deueniendum ad ea quæ luem respiciunt, quæsi non agat nisi caliditate, & leui putredine, hoc electario statim efficitur, quod recipit alterantia, siccantia, roborantia alteratricem singularum partium & bezoardica.

℞ conseru. bugloss. violar. cichor. ana ℥ iij. mithridat. electi ℥ iij. pulu. cortic. guaiaci ℥ β. hepatis lupi præparati ℥ ij. puluer. scord. sem. citri ana ℥ j. diarrhod. abbatis, triasant. ana ℥ β. cum syrupo de pomis, fiat opiata de qua vtatur singulis diebus mane, ad quantitatem vnius auelanæ, continuando per xxx. dies.

Quod si lues altiores infixit radices, tum puris vtendum est alexipharmacis; horum autem duo sunt genera; quædam ob similitudinem quam habent cum natura, adeo ipsam roborant, & facultatem expultricem partium, vt hæc statim insurgat in excrementum illud venereum,

venereum, & talia sunt Guaiacum, eius cortex, & sarsaparilla. 3. sassafras: vltimò china, quæ etiam qualitatibus manifestis non parum iuant, resoluendo, siccando, attenuando, detergendo, vellicando, &c. Alia summam dissimilitudinẽ cum natura humana; similitudinem verò cum lue venerea, adeo incitant expultricem, vt hæc insurgendo cum impetu expellat; & tale est hydragryon.

Quamuis autẽ quatuor prædictis variij vario modo vtatur, vt in decocto, puluere, pilulis, electuario, vinis artificiosis &c. mihi tamẽ placet hæc ratio, vt, vbi ephemera vel hæctica sit lues, sola exhibeantur absque cathartico, vbi verò humores seu contenta afficiuntur, illis etiam immisceantur cathartica, prioris modi exemplum hoc est.

℞ rasur. ligni sancti ℥ iij. cort. eiusdem, sarsaparillæ ana ℥ j. β. infundantur per diem naturalem in ℔vj. aq. font. deinde bulliant lento igne, ad consumptionem

672 *Tractatus de lue venerea.*

medietatis (plus vel minus) addendo sub finem coctionis fol. card. bened. bugloss. fumar. cichor. beton. lupul. capillor. vener. (vel alia quæ appropriata sint domicilio luis) ana m. i. colentur & seruetur colat: in vase vitreo.

℥ Residentiam prædicti decocti, antequam herbæ immittantur, aq. font. ℥ xij. vini albi generosi ℥ v. fiat levis decoctio ad cōsumpt. vnius tertiæ partis, colatura dulcoretur sacch. q. s. aromatizeturque pauco cinamomo, & seruetur pro potu ordinario.

Prius decoctum ℥ farsam cum Guaiaco, quod vt hoc suo amaro-  
re, calore, siccitate, acrimonia, tenuitate excrementum ipsum venereum attenuat, resoluit, extergit; sic farsa particulariter luis symptomata magis expugnat, atque quod caliditatis sit expers, Guaiaci calorem temperat, eiusque aliis incommodis medetur, quemadmodum Guaiacum vice versa eius noxiam ventriculo substantiam emendat.

Porro

Porro quod ad rectam administrationem huius decocti, quæ præsertim in quantitate, tempore & modo versatur, non omnes eodem calopodio, ut cum Galeno loquar, de tuenda sanis, sunt calceandi, quemadmodum nec decoctum eadem ratione perpetuo parandum, sed quantitas in viro, ventriculo robusto, frigidiori natura, anni tempore vernali, aut autumnali, maior sit quam in puero, imbecilli ventriculo, natura delicatiori, temperamento calido, æstatis tempore, ut cum tota dosis sit ab  $\text{ʒ} \text{iiij.}$  ad  $\text{ʒ} \text{x.}$  in pueris non excedat  $\text{ʒ} \text{vj.}$  in robustioribus  $\text{ʒ} \text{viij.}$  in robustissimis  $\text{ʒ} \text{x.}$  sumpta indicatione ab actione luis, & virium robore.

Tempus vniuersale exhibendi, sit tandiu quandiu lues vrget sua præsentia, nec cessant symptomata; ad xxx. xl. l. lx. dies, imo centum si tandiu obediat æger, ut minimum autem ad dies xv. particulare tempus est bis in die, 3. aut 4. horis ante pastum, licet matutina dosis debeat

674 *Tractatus de lue venerea.*

excedere vespertinam, quod plus intercedat temporis inter cœnam & decoctum matutinum, quàm inter hoc & cœnam: verum quemadmodum primis quatuor diebus non nisi semel exhibemus decoctum: quod ex consilio Hippoc. pedetentim ipsi sit assuefaciendus ventriculus; sic exactis diebus xxx. aut xl. exhibendum tantum semel, non quod calidum innatum eius vsu per se lagueat: sed quod sudoribus, vel aliis excretionibus nimis dissoluatur, vnde contracta siccitate sæpe habitus fit marasmodeis.

De modo item variè statuendum, sunt qui perpetuo ægros torrent excitatis sudoribus in hypocausto. Censeo ego hæc bezoardica robore expultricem omnium partium, vt ideo liberum sit naturæ per viam quamcumque ipsi accommodatiorem excrementum venereum expellere, & propterea expectandus eius motus, & attendendus primis diebus, itaque quo natura vergit, eoducendum.

Quod

Quod si à tenui Guaiaci substan-  
tia promota per cutaneas partes, ex-  
purgationes moliatur ( quod fre-  
quentissimum est) iuuanda diapho-  
reticis, & hydroticis , diligenter te-  
cto corpore, vesicis aqua calida ple-  
nis detentis sub axillis , lateribus  
candentibus, vino aspersis, & obuo-  
lutis panno lineo, admotis ad plan-  
tas pedum, &c. sin minus, istis omis-  
sis iuuandus naturæ conatus: opti-  
mum autem fuerit, perpetuo exhi-  
bere calidum decoctum, vt facilius  
penetret in venas & facultates na-  
turaliter roborando melius agat;  
tum verò diuretica, cathartica, vo-  
mitoria exhibenda , si per eas vias  
progrediatur natura, quod certè ra-  
tissimum est. Assumpto decocto  
dormiat æger, vt illud facilius ven-  
triculi actionem subeat , atque iam  
si nobis constet naturæ motus per  
viam sudorum , non statim iuuan-  
dus, tecto corpore: sed post horam,  
vt medicamentum diuturniori mo-  
ra in ventriculo de potentia in  
actum commodius reducatur.



## 676 *Tractatus de lue venerea.*

Cæterum, vſu Guaiaci, yt & omnium hydroticorum & diaphoreticorum omnino ſupprimitur aluus, Gal.com.vlt.ad aphor.vlt. ſect. 4. & lib. de atra bile. cap. 4. vnde excernuntur tenuiores excrementi venerei portiones, reliquæ craſſiores in partibus ſtabulantur, pro quo conueniunt enemata alternis diebus aut ſingulis iniicienda: octonis autem, aut duodenis diebus exhibetur catharticum, verbi gratia in pilulis.

℞ pilul.de lapid. lazuli aggreg. an. ʒ j. cocciarum & de hermodact. ana ʒ β. cum aq. fumar. fiant pilulæ vj. &c. In potione confert confectio hamech cum decocto accommodato, quod recipit fol. ſennæ; quo tamen copioſiores erunt ſudores, eo longius inter cathartica interponendum interuallum.

Præter hunc modum exhibendi Guaiacum & ſarſam, ſi æger delicatior fuerit, & emaciatus, parandum decoctum in iure carnis, addita rad. chinæ, quæ ob ſubſtantiam pingui

pinguiorē, qua donatur; macie confectis omnino confert. verbi gratia.

℞ ras. ligni sancti ℥ iij. rad. chinæ in talleolas incisę, sarsapar. ana ℥ j. aq. font. ℔ vj. fiat infusio per diem naturalem, deinde adiecta carnis veruecinæ, vel pulli aut caponis ℔ j. β. fiat decoct. ad cōsumptionem medietatis aquæ, & integram carnis decoctionem; facta colatura seruetur, vt supra. Ex residuo posset parari secundaria decoctio pro potu ordinario.

Vbi longior decocti vsus fastidium fecerit ægro, probantur pilulæ seq. cum opiata superiori, quibus per aliquot dies vtatur, tum redeat ad decoctum.

℞ puluer. sarsaparil. cort. Guaiaci an. ℥ iij. mithrid. electi ℥ ij. cum syrup. de cichor. malax. simul, fiant pilulæ xv. capiat v. singulis diebus, loco decocti.

Si lue venerea afficiantur tantum humores, in putrida lue confert cum catharticis Guaiacum & sarsam parillam immiscuisse, quod.

678 *Tractatus de lue venerea.*

pluribus modis fieri potest, in pilulis, vino, potionibus, &c.

Exemplum vini.

℞ rasur. ligni sancti ℥ iiij. fol. card. bened. endiu. cichor. borrag. ana m. iij. anisi, cumini an. ʒ j. fol. fennæ mundat. ℥ j. turbith. gummosi ʒ ij. rad. ellebor. nigri ʒ j. caryophil. ʒ iij. macis ʒ j. incidantur incidēda, contundantur contundēda, simulque omnia in sacculo ligentur & suspendantur in cado vinario mundo, eique vini albi feruentis ℥ lxxv. aq. xxv. superaffundantur, deinde bulliant. Post macerationem factam per triduum, clarū seruetur vinum, cap. æger ab ʒ iij. ad ʒ vj. alternis diebus semel tantum quinque horis ante prādium, cui superdormiat diligenter tecto corpore.

Exemplum pilularum.

℞ puluer. hellebor. nigri ʒ ij. turbith electi ʒ β. fol. fenn. mund. ʒ vj. corticis Guaiaci, sarsæparillæ ana ʒ j. sem. anisi. ʒ j. cum syrupo de pomis, fiat massa, detur à ʒ β. ad ʒ ij. pro dosi. Ex iisdem pulueribus cum syrupo

fyrupo multo fieri potest electuarium molle, vel opiata cum cōseru. cichor. bugloss. &c.

In horum omnium exhibitione sæpe contingit post xv. dies, vt dolores & symptomata quædã sæuissima insurgāt, velut arthritides, &c. quibus omnino deterrentur ægri; sed hæc nullius sunt momenti, cum ex dissolutione & attenuatione excrementi venerei in vapores oriantur distensiones periostiorum, &c.

Verum non rarò contingit luem tantæ esse actiuitatis, vt iis non superetur, quare experienciã comperitus fuit vsus hydragiri à Iacobo Carpenfi; cum enim scabiei antiquæ, malignæ, & pforæ omnino conferret, empirici analogismo in luem veneream, cum in principio vlceribus totũ corpus defœdabat, transtulerunt. Agit hoc imperfectum metallum in luem veneream, non similitudine qua donetur in corpore humano, vt Guaiacum, sed dissimilitudine cum partibus; similitudine verò substantiæ veneficæ

## 680 *Tractatus de lue venerea.*

cum mucō pituitoso, & excremento venereo, in quod eodem modo agit, quo rheum in bilem.

Licet autem quamplurimi gravissimi viri, præsertim Fernelius, lib. de lue venerea, & Montanus Veronensis eius usum omnino ode- rint, tamen animadverti in praxi, plurimos diuturniori tēpore Guaiaci decocto frustra fuisse usos, qui statim hydrargiro fuere sanati: quare ut gravia affert symptomata, præe administratum, sic post un- iversalis purgationes, & Guaiaci usum, quo viscera roborentur, ne ab eius substantia venefica læ- dantur, plurimum mihi commen- datur in lue venerea contumaci, nisi tamen virtus prohibeat, pueri enim ob nervorum imbecillitatem, senes ob virium lapsum, qui etiam antequam afficerentur lue, obnoxij- erant convulsionibus, paralyfi, an- ginae, item & febricitantes hydrar- giram non ferunt.

Tribus autem modis administra- tur, in vnctione, in suffumigio, in pilulis,

pilulis, verbi gratia.

℥ hydrarg. salua hominis ieiuni extincti ℥ iij. axung. suilla. ℥ ij. misc. per horam in mortario, deinde adde theriac. elect. antiq. ℥ vj. ol. laurini, iuniperi, mastich. an. ℥ j. iterum tanto tempore agitentur, tum adde pulueris tenuissimi baccarum lauri, Castorei, iuniperi, thuris an. ℥ j. β. quibus omnibus diligenter permixtis in mortario, adde ceræ nouæ ℥ iij. fiat linimētum secundum artem. In cuius recta administratione animaduertēdum ne in quantitate, vtendi modo, & tempore vllus cōmittatur error; quantitas seu dosis sit ab ℥ j. ad ℥ iij. indicatione sumpta à maiori vel minori luis actiuitate, & virtutis robore, vbi sero partes vngendæ sunt, artus omnes præsertim circa articulationes, inter caput & finem ossis, tum etiam spina dorsi, sed antequam vngantur aperiendi pori frictione ab infernis ad supernas; locus in quo molienda, est vnctio, esto calidus & prope ignem, vt

682 *Tractatus de lue venerea.*

facilius penetret linimentum. Modus est, vt actu calidum admoueat-  
tur fricando. item penetrationis  
gratia, tum imponantur partibus  
inunctis stupæ, ex lino vel cannabe,  
& cum petiis lineis fiant ligaturæ.  
Post vnctionem decumbat æger in  
lecto calido, & dormiat si fieri pos-  
sit per duas horas, vel saltem quies-  
cat; tum ita inunctus & obuolutus,  
cibetur. Quando autem & quandiu  
est agendum? cum lues summæ acti-  
uitatis sua præsentia vrget, adeo vt  
cœtera non profuerint, fiat tribus  
diebus continuis, semel in die ma-  
tutinis horis, tum interpositis aliis  
tribus diebus, repetatur denuo,  
quousque nouem vicibus inunga-  
tur æger non ultra, vt placet circu-  
latoribus & barbitonsoribus. Cum  
enim post secundam vel primam  
etiam inunctionem sæpe succedat  
euacuatio per os, quam saluatione-  
nem vocant, (quo tempore vnctio-  
ne non amplius indiget æger) si  
post nouem vices non sequatur spu-  
tum; signum est totum corpus mi-  
neris

neris excrementitiis repleti, vt hydrargiri vis permeare non possit, vnde in medullis ossium hærens non rarò reperitur; in quo casu indicium est iterum concoquendi & expurgandi humores, tum si opus sit, redeundum ad vnctionem, atque ne minerae facales saluationi ob sint, singulis diebus expurgandi enematis, vbi aluus non est libera.

Dum fit salinatio inunctionis tempore hydrargirum inficit partes oris, gingiuas corrodit, inflatur palatū & lingua, dentes vacillant, &c. quibus incommodis subuenit annulus, vel nummus aureus ore detentus, ei enim statim agglutinatur mercurius; eradicandus postea iniecto annulo super carbones, non multum ignitos, iterumque ore detinendus.

Inquisitione hic dignum est, cur, quomodo, & per quas vias oris, excrementum venereum transmittatur ab hydrargiro siue assumpto, siue admoto. Resp. id fieri tum ob spirituofam hydrargiri substantiam, quæ



#### 684 *Tractatus de lue venerea.*

quæ statim superiores petit partes, ubi incalefactum fuerit, secumque rapit excrementum venereum; tum quia principium neruorum (quibus potissimum aduersatur hydrargirus, ut docent plurimæ historiæ) scilicet cerebrum in consensum ductum; ipsum, humoresque lue infectos, dum ad caput accedunt, repellit per vias oris, tanquam cerebri canales.

Suffumigia sunt etiam empiricorum inuentum, quibus methodice aliquando uti licet, ubi Guaiaci decoctum non iuuerit; duorum autem sunt generum, alia particularia, ad quarundam partium affectus, tenefmos, rhagades, seu fissuras ani, pudendorum, manuum, aut depilatione, &c. Alia vniuersalia quæ totum corpus vacuant; rursumque hæc sunt duorum generum, alia componuntur ex benignis medicamentis, alia admittunt venenata pharmaca; ambo meatas corporis aperiunt, interiores partes subeunt, ipsasque detergunt, præsertim vero cerebrum per ipsas narium vias,

cor per bronchia pulmonum, iecur per venas exterius patentes, vnde ſequuntur euacuationes per ſudores, alias per aluum, ſæpiſſimè autem per ſputa, & ſudores ſimul.

Sed ad hæc nuſquam deueniendum niſi poſt vniuerſalem purgationem, & uſum Guaiaci, ſaltè per aliquot dies, inſuper etiam improbatuſ illorum uſus in temperaturis calidis ſiccis, gracilioribus, in diſtillationibus a capite, in anguſtiis pectoris, in homophthoſi præcipue dyſenteria, lienteria, quemadmodum omnino confert ophthalmicis venereis contumacibus, in depilatione (roborentur enim pori cutis capitis) in arthriticis doloribus.

Exemplum leuioris eſto.

Œolibani, aloës, myrrhæ ana ʒ j. caryophil. cinnam. nuc. moſc. ſpicæ nardi an ʒ ſ. ligni aloës, ſpyracis ſiccæ an. ʒ ij. moſchi gr. ij. fiat puluis craſſiuſculus inſpergendus ſuper prunas pro ſuffumigio.

Venenati ſuffitus recipiunt aſenicum, cinnabrium factitium, præcipitatum,

686 *Tractatus de lue venerea.*

cipitatum, pro basi compositionis, & ob id non nisi in prædictis casibus contumacioribus vsurpandi, cum suis tantum infestis qualitatibus luem debellent, exempli gratia.

℥ cinnab. ʒ ij. auripigm. ʒ iij. præcipitati ʒ ij. thuris, aloës, mastich. ladani, styracis siccæ, benioini an ʒ j. fiat omnium pulvis crassiusculus, inspergendus super prunas pro suffitu secundum artem, vel parentur pilulæ ex iisdem pulueribus permixtis cum therebinthina, & iniiciatur vna super prunas.

Pro recta administratione suffituum, quoniam plurimum vires prosternunt, vnde syncope; ob id primò exhibentur oua duo forbilia, tum ingrediatur æger cubiculum calefactum, & tentorium quod recipiat vas candentibus prunis refertum, nudusque sedeat non longè à vase & iniectis pulueribus fumum hauriat; tandiu autem moretur, quandiu per vires licebit, scil. ad summum per horam manè & vesperi, nisi virtus prohibeat, fiat tribus

tribus diebus continuis, & ubi tantundem cessauerit æger, iterum repetatur ad nonam usque suffumigationem.

Si tamen tertia die superueniat diarrhœa, vel aphthæ in ore persputa, desistendum plane; incumbendum autem ne omnino concidat æger, dum ibi moratur, egressus autem decumbat per horam in lecto calfacto, ubi diligenter tectus fuder.

Frequentissimus apud nostrates exhibendi hydrargirum modus est per os, in pilulis, quæ ipsum, vel præcipitatum recipiunt, quibus etiam aliqua purgantia miscentur, quod consilium si methodicè fiat plurimum mihi probatur, exempli gratia.

℞ præcipit. optimi, rhei electi ana  
 ʒ iiij. diagrid. ʒ β. farinæ hord. ʒ iiij.  
 theriac. antiq. electæ ʒ j. confect.  
 alcherm. ʒ ij. thereb. venet. q. s. fiat  
 massa, ex qua formentur pilulæ duæ  
 pro drachma, detur una singulis  
 diebus manè continuando prout  
 visum

visum fuerit, seruata congrua virtus ratione.



## C A P. XIII.

### *Symptomatum venereorum particularis therapia.*

**H**Æc quidem genericè omni  
hui expugnandæ conueniunt,  
verum quoniam excrementi  
illius venerei plures grauesque  
sunt effectus, & affectus; tam morbi  
quàm symptomata, quæ peculiarem  
Medici operam exposcunt, siue ei  
epiphænomena, siue *συνεπόμενα*  
fuerint, particulari therapia consu-  
lendum, quod cum in morbis nul-  
lam dubitationem faciat, sic nec in  
symptomatis; cum, vt habent ratio-  
nem causæ, ea indicare scripserit  
Gal. 12. meth. 1.

Caries quidem cum sit vlcus in-  
dicationes habet detergendi, sic-  
candi: si maligna sit, callo obducitur,  
sic cum habeat rationem causæ  
sine

sine qua non, primò sui eradicationem indicat, itaque in benigna sic procedendum.

℥ Vnguenti de tuthia ʒ iij. vngatur corona peius: vel,

℥ aq. plantag. & rosar. an. ʒ ij. alum. rochæ ʒ j. misc. in maligna si nullomodo adsit callus fiat decoctio pro lotionem, ex fol. plantag. ros. cum multo ligno guaiacino; vel vng. de tuthia cum puluere Guaiaci superponatur.

In maligna callosa, exedatur callus medicamento cathetico, vt ol. de calcantho (quod semper ab aqua pendente fiebat) aqua forti, præcipitato, puluere vitri combusti, squamma aris, vnguento ægyptiaco, quorum guttula aliqua, vel portiuncula, acumine specilli in vlcus immittatur, superposito deinde vnguento rosato, vel vnguento albo camphorato propulsandæ inflammationis gratiâ.

Quod si in tantam molem callus excreuerit, vt reductionem præputij etiam inflammati & callosi impediat,

690 *Tractatus de lue venerea.*

pediat, fistula plumbea dilatatur, primis quidem diebus parua, aut saltem immittatur in foramen vrinarium; tum maiori, donec omnino intra octo dies detegatur glans: interim verò inungitur ol. amygd. dulcium, pomata, aut pinguedine gallinæ.

Verrucæ, ficus, thymi, sæpe adnascuntur in præputio, vel corona glandis, aliquando post caries, loco cicatricis; alias absque iis à sanguine crasso & fæculento oriundæ, vel etiam per hyperfarcosin, quorum aliæ venereæ sunt, aliæ non venereæ. Indicant sui eradicationem, cum sint morbi in numero aucto, toto genere præter naturã; hoc fit vel filo serico, quo arctè ligentur, postquam ablutæ fuerint vino tepidiori, obuoluto deinde præputio, cum panno aq. ros. madefacto; sequenti enim die nigræ euadunt, & sponte decidunt; quod si radix remanserit, tolletur ol. de calchanto, vel aqua aluminosa, aut ol. de sulphure, ad guttas duas, alias eradicantur

cantur solo puluere fabinæ aut verrucariæ, præsertim si benignæ sint, si verò malignæ veneræ, probatur arsenicum præparatum, pauca aqua ardēti, præcipitarum ol. de guaiaco mixtu, cum alumine: pulvis vtriusque ellebori, & cætera cathartica. Verum ne horum catharteticorum usu inflammetur glans, vel penis, vnguento de cerussa camphorato foueantur: deletâ verrucâ locus affectus instar vlceris sanetur.

Condilomata vulgo cristæ non lôgè absunt à verrucis, siue in pene, siue in ano reperiantur, per quæ intelligo tuberculum carnosum induratum; sunt autem duorum generum, alia tenuia, & tolluntur medicamentis propositis, vel maiora & crassiora quæ ferro & igne indigent, quod si superueniat hæmorrhagia, compescatur ferro cādenti, vel ipso oleo de calcātho, vel quod melius est, puluere stegnotico, qui recipiat thus, pilos leporis, sang. draconis, bolum armenam, aloën cum oui albumine.

Rhaga



## 692 *Tractatus de lue venerea.*

Rhagades afficiunt volam manus, plantam pedis, & anum, suntq; rimæ & fissuræ callosæ quæ ad annos plurimos à confirmato scil. morbo perdurant; his generationem præbet pituita falsa, vel melancholia vsta partes distendens, & acrimonia continuum soluens.

Sunt autem duorum generum, aliæ venereæ, aliæ non, illas dignoscunt Fallopius & Zethius, quod vsu alliorum & ceparum augentur statim, imo duplo maiores fiunt; curandi indicationes sunt retundendi acrimoniam humoris per epicrastica, vniendi solutionem colleticis, tum cicatrizandi epuloticis. Itaque si guaiaci decocto non cedant, aut farsæ parillæ cum purgatione totius corporis, probatur hoc balneum.

℞ rad. malu. alth. an. ʒ j. fol. sca-  
bios. scordij, quinquefol. oxylap. an.  
m. ij. capit. verueciis num. i. bulliant  
omnia in aq. communi ad carniū  
consumptionem, paretur balneum  
particulare, in quo calidiori im-  
merantur

mergantur manus & pedes , manè  
& vesp̄ri, vel fiat incessus pro rha-  
gadibus an: tum exsiccata parte ,

℥ ol. amygdal. dulc. ros. axung.  
suillæ an. ʒ j. ceruss. hydrarg. saliuā  
hominis ieiuni extincti an. ʒ β. cereę  
albę ʒ x. misce fiat linimentu secun-  
dū artem, fissuris calidè admouen-  
dum: si contumaciores sint , deue-  
niendum ad inunctionem & suffi-  
tus ex cinnabrio , qui in hoc casu  
plurimum probantur.

Topica ad rhagades, durities tol-  
latur , tum si contumax fuerit affe-  
ctus, fiat superius suffumigium ex  
cinnabrio, quod recipiat per infun-  
dibulum rectè in ipsius partes , bis  
aut ter ; vel fricentur vnguento  
Mercuriato : si his resistant rhaga-  
des , scalpello vel ferro ignito, aut  
cauterio corrigenda durities , vt  
malignitas & vlcus rectificatum ad  
mandationem & cicatricem per-  
ducatur.

Bubones quid sint, & quæ eorum  
differentiæ expositum mihi supe-  
rius , quoniam autem eorum sedes  
sunt

# 694 *Tractatus de lue venerea.*

sunt glandulæ humorum expurgationi à natura dicatæ, ob id huius motus iuuandus, vt tandem, si fieri possit, ad suppurationem adducantur. Dolor est atrox; indicat ideo sui mitigationem, ergo quandiu est in fluxu minera venerea, retrahenda non est venæ sectione, nec purgatione: sed solo lenienti, quod recipiat electuar. lenitium cathol. & syrup. ros. solut. in decocto flor. & fructuum, expurgandæ primæ viæ. Dum autem consistit tumor, nec augetur, tunc catharticum & phlebotomia plurimum iuuant, vt autem melius educatur foras, admo-ueatur loco dolenti cucurbitula sine scarificatione cum multa flamma, & frictiones dolorificæ, coctionem verò promouentia, sunt.

℥ diachylon. cum gummis ℥ ij. pingued. gal. ℥ β. misce, fiat emplast. admo-ueatur buboni, vel fiat cataplasma.

℥ rad. alth. lilior. albor. an. ℥ β. far. com. ℥ ij. far. sem. lini & fœnugr. an. ℥ j. caricar. coctarum par. vij. pinguedi

pingued. gall. vet. adipis suilli. an.  
3 j.ß. cum decocto caricarū & rad.  
prædictarum fiat cataplasma de-  
tinendum per sex horas, tum verò  
immutandum; vbi ad suppuratio-  
nem accedit bubo, vt plurimum  
autem intra sex aut octo dies fit,  
aperiatur autem non apparente  
perfecta maturatione, vt quamprimum  
egrediatur excrementum ve-  
nereum virulentum, promoueatur  
autem apertio, admoto caustico, si  
verò dolor sæuiat mitigetur ano-  
dino, vt therebentina cum oui lu-  
teo, quæ immittatur in vulneris  
sinum cum turunda.

Extrinsècus autem admoueatur  
emplastrum pepticum residuæ ma-  
teriæ, vt emplastr. de mucilaginibus,  
foramen pateat per 40. vel 60. dies,  
facta deinde turunda ex linamentis  
siccis superponatur empl. roborans,  
putrefactionem inhibens, nouam-  
que fluxionem impediens, cuius-  
modi est diapalma.

Quod si nec pepticiis, nec alia  
suppuret arte, consulit Capiuacc.

G g vt

696 *Tractatus de lue venerea.*

vt causticum admoueat<sup>ur</sup>, eschara autem butyro tollatur, vt fit in fonticulis, qua sublata imponatur globulus ex cicere vel medulla sambuci, vel ex cera lota in decocto Guaiaci, cui permiscetur parum, vel colocynt. si lues sit pituitosa, aut scammonei, si biliosa, vel ellebori, si melancholica fuerit.

Gonorrhœa non est statim ineptè adstringenda, sed post præuisionem vniuersalem, & vsum decocti Guaiaci per xv. dies, conueniunt roborantia partes spermaticas, semen extinguentia, ex.gr. intrinsecus.

℞ conseru. flor. nymph. cichor. an. ʒ ij. pulu. sem. lactuc. agni casti, cânabis, mastich. an. ʒ j. sarsæparill. ʒ iiij. succini. ʒ β. cum syr. capill. ven. fiat opiata de qua cap. ad ʒ ij. manè superbibendo parum aq. plantag. Conuenit aliquando bolus ex cassia cum tamarindis: extrinsecus ad pubem fiat forus sic.

℞ nuc. cupress. cortic. granat. an. ʒ j. ligni sancti ʒ vj. fol. ruthæ, lactucæ, bursæ pastor. an. m. j. fiat  
omnium

omnium decoctio in vino crassiori,  
seu styptico pro fomento cum fil-  
tris ad pubem,tum

℞ vnguenti comitiss. ʒ ij. puluer.  
ligni sancti parum , misc. pro lini-  
mento pubis & renum, vel infrigi-  
dantis Gal. cum eodem Guaiaco.

Gummata quia dura, malacticis  
emollienda, materia autem inclusa  
attenuanda, & diaphoreticis resol-  
uenda; ad quod probatur decoctum  
sarsæ (hæc enim plurimum discutit)  
& cort. Guaiaci; extrinsecus conue-  
niunt fots ex spuma Guaiaci; aq.  
ardens, in qua macerata fuerit radix  
alth. diachylon cum gummi, vel  
℞ ol. chamæmel. laur. mastich. ol.  
veter. communis an. ʒ j. aq. vitæ  
℥ ij. misc. simul bulliant lento igne  
diligenter cocta, ad consumptio-  
nem aquæ, deinde adde ammon. in  
aceto generoso dissoluti ʒ j. β: myr-  
rhæ, bdellij, an. ʒ j. sagapeni ʒ β.  
thereb. ʒ ij. ceræ, decocto sarsæ par.  
lotæ. q. s. fiat linimentum.

Sic probatur hydrargirum salua  
extinctum, cum diachilone permix-

tum, his si non sanentur gummata, fiat incisio medicamento caustico, vel ipso ferro; tum immittatur parum præcipitati.

Ossium caries & corruptio magni momenti affectus est, & hecticam luem sequitur, à teterrimis luis venereæ seminariis. Vlcus quidem venereum simplex sanatur decocto Guaiaci, &c. tum ex topicis unguento rosato cum paucis præcipitato, vel emplastro de vigo parato cum mercurio.

Sed si os corruptum fuerit, indicat sui abradicationem, partes verò vicinæ roborandæ, ne erodantur. Aufertur os detectum scalpellis incisoriis, cum malleolo, vel scalpris rasoriis, vel denique medicamentis cathæreticis, metasyncriticis, ut ol. de sulphure, de calcantho, aq. alumin. Fallopio placet hoc præsidium.

℞ pulu. peucedan. aristol. rot. opopan. euphorb. an. ʒ β. thereb. ʒ β. ol. lilior. alb. ʒ vj. ceræ q. s. coquantur simul ad ignem, donec spissum fiat ceratum, his si non  
educatu

educatur os, deueniendum ad ferrum ignitum. In capite si sit caries, non ignitum ferrum, sed secans tantum est ex usu, metu inflammationis cerebri & membranarum; si in palato, vtendum aq. aluminos. ol. de sulphure vitrioli, per gossipium adhibitis, aqua fortis valet, sed si guttula in ventriculum eat, vlcera pessima & mortem sæpe affert; vt autem portiones vicinæ carie non afficiantur, tale sit remediũ.

℞ rad. aristot. rot. ʒ β. myrrhæ. ʒ ij. misc. fiat puluis inspergendus super os residuum. Vlcus deinde sanctur aliorum more.

Vnguentum de plumbo ad cicatrifandum est potens.

Post cariem sæpe os basilare excedit, cū naris interstitio, vnde vitæ periculũ ob aëris ingressum subitũ, tunc cum aliqua materia obturandum est forame, vt sorbere & loqui possit commodius & ad decetiam.

Pustulæ quæ oris partes afficiũt, tollũtur decocto Guaiaci. Pro topico fit gargaris. ex fol. scabiosæ, capri-



700 *Tractatus de lue venerea.*

fol. an. m. j. β. flor. ros. p. iij. cum Guaiaco, sic probatur aq. plantag. in qua Guaiacum fuerit decoctum, vel

℞ aq. plant. ℥β β. syrup. de ros. sic. ℥ iij. misce pro lotionē oris, pustulis aliarum partium, vt faciei, ani, confert spuma decocti Guaiaci, vel ol. viperin. quo inungantur pustulæ.

In titillatione dentium, cauendū ab inunctione hydrargiri facta, & à suffumigiis, abluantur autem dentes hac lotionē.

℞ Guaiaci ℥ j. cortic. granat. rad. bistort. an. ℥ v. fol. plantag. bursæ past. an. m. j. baccar. myrthi. ℥ ij. florum rosar. p. ij. alum. rup. ℥ ij. vini rubri styptici. ℥ iij. fiat decoctio ad consumptionem medietatis, seruetur pro lotionē oris & dentium.

Probatur etiam aq. fortis, ol. de sulph, &c. quibus inungantur & abluantur gingiua.

Tinnitus aurium, symptoma est in qualitatibus audibilibus, nihil per se indicans, cum tollatur ad sublationem ichoris, hic autem discutendus, resoluendus, quod non  
sine

sine negotio fit; purgato itaque vniuersali corpore, & capite apophlegmatismis & errhinis, probatur decoctum Guaiaci, tum infundatur in ollam ol. de Guaiaco per descensum paratum, cum pauco castoreo, vel opio, vel aq. imperiali, vel coelesti cum tertia parte succi cæpæ, ad discutiendum & roborandum, quod quoniã acrimonia sua deprauatum agit in tactum auris, permiscetur cum ol. amygd. dulcium, immittatur calidum in aurem diligenter mundatam ante partus, sic probatur ol. caryoph. cinnamomi, ol. ex baccis lauri, de nuce mæscata.

Dolor articulorum in mediis artubus, & cephalæa tollitur tribus illis modis propositis à Gal. 5. simpl. cap. 15. & 12. meth. cap. 1. anodynis, narcoticis; & causam tollentibus. Vltimus modus Gal. placet, itaque post vniuersales purgationes, & phlebotomiam, si in principio sit affectus; in inueterato caue; & decoctum paratum cum multa sarsaparilla addendo in fine

702 *Tractatus de lue venerea.*

coctionis fol. pa. malu. altheæ,  
flor. chamæmeli, anethi.

Extrinsecus conueniunt attenuantia digerentia, vt fomentum hoc siccum.

℞ fursur. macri. m. ij. milij. m. j. salis communis ℥ iij. flor. chamæmel. puluerat. p. iij. calefiant omnia in sartagine, tum sacculo excipiantur, & actu calida admoveantur articulis dolentibus, prius irroratis aq. vitæ, humidum verò fomentum sit.

℞ sarsapar. ℥ j. fol. malu. salu. calamit. an. m. j. flor. saluiæ, anthos, an. p. ij. sem. fcenugr. ℥ j. fiat decoctio in vino generoso, vel lixiuio acri pro fomento artuum, vel lotionè pedum, additur etiam fol. beton. & summit. ebuli an. m. j. tum post fomentum.

℞ ol. de Guaiac. Viperini an ℥ j. camphor. ʒ j. misc. pro linimento post fotum.

Sic probatur anodynum, quale est omentum veruecis, & vituli, calidè admotum, sic lac cum pane albiss. coctum. Ultimo ex narcoticis theriac

riaca recens parti dolenti adnota.

Si dolor sit contumax.

℞ mass. emplast. de vigo, de beton.  
& diuini an. ʒ ij. euphorbij ʒ ij.  
puluer. ireos florēt. puluer. rorismar.  
an. ʒ j. malaxētur cum oleo ruſſac.  
extēdantur super alutam, in formā  
pilei, applicetur capiti deraſis ca-  
pillis, tum per os, in bolis theriaca  
recens, philonium Romanum, pilu-  
læ de cynogloſſo, hora ſomni dan-  
tur; nec extrā narcoticis vtendum,  
ne calor natiuus magis labascat.

*Depilatio* ( non cadunt hi pili ob  
denſitatem cutis, aut eiufdem ari-  
ditatem, aut laxitatem, nec ob ali-  
menti penuriam, ſed ob corrupte-  
lam humorum radices erodentium)  
ſiue ſit alopecia, ſiue ciliorum &  
barbæ, indicationes habet vacuan-  
di materiā veneream, acrem,  
erodentem radices pilorum, robo-  
randi cutem & adſtringendi eius  
poros, vt pili qui nondum defluxe-  
runt detineantur: tertio incumben-  
dum nouæ generationi. Ad primam  
conueniunt purgantia totum cor-

G r s pus,

pus, & caput, apophlegmatifantia & errhina, tum vsus Guaiaci, quod est discutiens & euacuans insensibiliter, pro secunda etiam si cutis indicet roborantia & adstringentia, tamen prohibet materia virulenta ne his solis vtaris., perpetuo enim foras propulsanda. At tutissimę dantur præsidiorum materiae, quibus etiam adstringentia permiscere licet, ergo primo abluatur pars hocce lixiuio.

℥ rad. arund. ʒ ij. Guaiaci, & sarsapar. an. ʒ j. nucum cupressi contrus. numero iij. fol. beton. scabios. puleg. abrota. an. m. j. asari. m. ʒ. hordei integri ( si adsit pruritus ) . p. iij. aq. & cinerum vitis. q. s. fiat omniũ decoctio & post ebullitionem & expressionem seruetur pro lixiuio: sed antea abradendi capilli, aut multum abscindendi, lunâ crescente, si fieri possit, tum

℥ ol. amygdal. dulc. ʒ j. decocti Guaiaci ʒ ij. pulu. rad. arundinum, abrotan. an. ʒ ij. thapsiæ ʒ ʒ. bulliant ad decocti consumptionem:

in ex

in express. adde faui mellis  $\frac{3}{4}$   $\beta$ . ol. caryoph.  $\frac{3}{4}$  j. mel.  $\frac{3}{4}$  j. misc. pro linimento. Hic probatur adeps humanus, ol. ex vitellis ouorum, ex fauo mellis vel vrina stillat. aqua mellis stillatitia: quibus permiscenda sunt alexipharmaca; vltimo deueniendum ad suffumigia de quibus supra.

Maciem sanat decoctum cum iure carnis paratum, victus plenior, balneum aq. dulcis, post quod vngatur æger ol. amygdal. dulc. cum puluere Guaiaci permixto.

Febre præsentē, seu venerea ea fuerit, siue non, improbatur, vñctio ex hydrargiro, purgantia dacridiata vitanda, &c. calidiora: decoctum sit ex farfa, in cuius decoctionis sine, adde hordeum, acetosam, endiuia, &c. Extrinsecus ad iecur exæstuans refrigerandū, sit vnguet. ros. Mesuei, ceratum fantal. &c. victus sit frigidus & humidus, potus alteretur cum fol. acetos. endiu. lactucæ.



## CAP. XV.

*De congrua sex rerum non naturalium administratione in Lue venerea.*



X tribus fontibus vnde hauriuntur materiæ præsidiorum ad luem veneream, chirurgicum & pharmaceuticum exposuisse mihi videor satis, de diætetico nunc agendum, cuius materia sunt sex res non naturales.

Aërem quod attinet, dum æger sumit decoctum & sudat, inclusus sit in cubiculo calidiori & sicciori, nisi prohibeat febris, duabus tamen horis à pastu matutino, si serenus fuerit aër, ventique fileant, licet non solum fenestras aperire: sed etiam domo egredi.

Cibi tempore decocti sint indicationibus appropriati, vitandi δυσπαστοι, mali, crassi, paucique succi: ne autem fiat transitus repentinus à pleno victu ad tenuem, & contra  
sine

sine medio, ob id in principio exhibitionis decocti, victus sit mediocris, toto progressu tenuis, ut si fieri possit abstineat æger ab omnibus carnibus, sin non, hæ assatæ sint, ut siccitate putredini aduersentur, quales sunt veruecinæ, vitulinæ, aui-  
culæ montanæ, &c. ad  $\frac{3}{4}$  iij. vel  $\frac{3}{4}$  iij. ad summum; panis si ventriculus sit robustus, nec obstructionibus laboret corpus, vel macie; sit assatus, vel biscoctus, quo non tam ut alimento, quàm medicamēto utatur æger, quod iuuat, exsiccando, excrementa absumendo, &c. è contra, ventriculo imbecilli, vel emaciato ægro, panis sit mediocriter coctus, paratus cum focniculo, quantitas sit ab  $\frac{3}{4}$  iij. ad  $\frac{3}{4}$  v. pueris rusticis, gulosis maior quantitas quàm sedentariis, senibus & temperatis. Pisces petrosi conueniunt, amygdalæ rōstæ, vuæ passæ, pistachiæ, &c. nuclei pinei, &c.

*Pro potu*, abstinendū à vino generoso, sed eligatur oligophorū, tempore autē decocti, sit propria decoctio, quā proprio cap. descripsimus.

*Motus,*



708 *Tractatus de lue venerea.*

*Motus*, si arthritici dolores absint, vtilior longè est ipsa quiete, ob id non pauci hac lue affecti in principio, lusu parvæ pilæ, vel alia exercitatione sanitati restituti, excitato copioso sudore: sic dum æger decoctum sumit, potest ante assumptionem deambulare in cubiculo, vitandum tamen omne nimis.

*Somnus* caput replet, artus laxat, vaporum dissolutionem impedit, quare vt is probatur post assumptum decoctum, sic alio tempore vigiliæ sunt Lui accommodatiores.

*Pathemata* animi, mœror, ira, timor plurimum faciunt ad morbi longitudinem conciliandam, quare accessu amicorum, & rebus iucundis recreandus.

*In excretis*, nullus committatur error, alius lubrica sit, tum ne vapores fœculenti in caput deferantur, tum ne ipsæ fœces sua præsentia morbum augeant: enematis, supposito-riis, pilulis sollicitetur alius pigra.

*A venere* potissimum abstinendum, non solum dum administrantur remedia,

media, tūc enim (vt ait alter) duplatur morbus, ob insignem resolutionem virium, vnde natura debilitata non potest venereum excrementum expellere: sed 15. & 20. etiam diebus post curationem, propter eandem virium exolutionem. Non quod, si omnino sanata lues, posset ob nouū coitum cum non infecta reuerti; sed quod inde nascantur symptomata noua, non venerea, vt ventriculi imbecillitas, febres, tumores, &c. quæ virium lapsum sequuntur.



C A P. XV.

*De prophylaxi à lue venerea.*

**Q**uoniam Lues, vt plurimum fædo concubitu per contactum contrahitur, ob id prophylaxi vti licet, ne hominē inficiat vapor venereus è sinu mulieris infectæ elatus.

Tota autem præuisio consistit in detergendo pudendo, siccando, roborando, tum vt viscidus vapor malignus detergatur & educatur, tum  
vt

710 *Tractatus de lue venerea.*


vt partes vicinæ & ipsum pudendum adeò roborentur, vt virulentiam contemnant, quod fit, si lotio calēte illicò abluatur glans, & totus penis, & panno tenui albo diligenter exsicceretur, vel aqua cum vino calidiore permixtis; vel


℥ fol. myrrh. absynth. an. m. j. ros. rub. p. ij. aristot. rot. 3 j. fiat decoctio in lb ij. vini vsque ad consumptionem quartæ partis: colatura calente abluatur glās, & vniuersum pudendum, tenuique panniculo exsicceretur, vel paretur hic suffitus.

℥ ros. rub. absynth. myrrh. aloës, fantali rubri, an. ʒ ij. præcipit. opt. 3 ij. paretur puluis tenuissimus inspergendus super prunas, quo pudendum per infundibulum, vel chartam in modum cornu retortam suffumigetur post coitum, vbi primum immediatè glans lynteo mundo diligenter exsiccata fuerit.

*Atque ita Tractatui de Lue venerea  
finem imponimus.*

F I N I S.





B 97:

xxx  
A-24